

49438/B




36403.













ILLUSTRATIONES

THEOPHRASTI

IN USUM

BOTANICORUM

PRÆCIPUE PEREGRINANTIUM.

---

AUCTORE

JOH. STACKHOUSE, ARM.

SOC. LINN. LOND. HIST. NAT. MOSC.

(COLL. EXON. OXONII OLIM)


SOCIO.

---

OXONII,

E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO.

MDCCCXI.



ILLUSTRATIONS

THEOPHRASTUS

BOTANICORUM

LABORUM & CHEMICALIUM

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY

JOHN STANLEY





---

## PRÆFATIO.

---

**T**HEOPHRASTUS, omnium, si Salomonem excipias, antiquissimus rei herbariæ investigator, plantas circiter quadringentas, ut in variis peregrinationibus se forte ei obtulissent, enumeravit; paucas quidem obiter, utpote omnibus sui temporis notissimas, plurimas vero accuratissime: individuas illas fane, nulloque ordinis methodici vel Nomenclaturæ systematicæ respectu habito. Quotiescunque vel de habitu alicujus plantæ, vel de partibus ejus sermo erat, et præcipue quando vires medicæ quædam indagandæ erant, toties fasciculos, ut ita dicam, breves plantarum affinium in diversis operis sui libris collegit; quo fit ut eadem sæpius recurrat species. Hinc fastidium enatum Botanicis superioris sæculi, cui forsan addendæ sunt, cum ex lingua technica et insolita, tum ex textûs corruptione ortæ difficultates.

THEOPHRASTI nimirum ubique textus corruptissimus; et, si codices MSS. litteris confluentibus ex-



aratos, et vocum compendiis ubique scatentes, inspicias, minime mirum videbitur rem ita se habere; præsertim si scientiæ Botanicæ ignaros omnino fuisse eorum exscriptores memineris. Omnium quidem ακριβεστατος est HOMERI textus, metro quippe heroico, omnium auribus accommodato scriptus; adeo ut alienam vocem locum non suum occupare, salva soni concordia, vix possibile fuerit. At Botanico cuivis THEOPHRASTI descriptiones assidue volventi, et plantas ipsas in agris simul investiganti simile quoddam, ni fallor, eveniet: specimen ipsum sub oculis erit textûs commentarium, locisque corruptis, ut plurimum, medelam suppeditabit.

Inter errores innumeros libet exemplum depromere; ubi, speciminibus cum descriptione comparatis, ex meris tenebris vera elucebit lectio. Generis Ελατη Linn. duæ enumerantur species; Ε. αρρήνη: Ε. Ξηλεια, l. iii. c. 10. Prior describitur “foliis magis pungentibus και επεσρωμμενοις,” (ita scriptum in cod. Basil. in aliis επεσρωμμενοις, quod nullo modo convenit foliis Pinûs:) quæ descriptio apte convenit P. Abieti Linn. (“Spruce Fir” nobis,) cujus folia *coacervantur*. Vid. Tab. fig. A. Ελατη Ξηλεια, e contra, folium habet ὡς πτερυγας (pinnae alæ) και επ’ ελαττον (sensim sese diminuens) ὡς τε την ὁλην μορφην Σολοειδη ειναι, και παρομοιον μαλιστα ταις Βοιωταις κυνεαις. (in marg. ed. Budæi legitur κυναθαις.) Locum hunc ita vertit THEODORUS: “folium pinnatum, et “ in angustias tendens, ut tota facies concamerata vi-



## PRÆFATIO.

“ deatur, fimilisque potiffimum galeis Bœotorum ap-  
 “ pareat.” THEOPHRASTUM haud ita fcripiffè facile  
 quivis, ne dicam Botanicus, affirmabit; THEODORUM  
 vero ignotum per ignotius Latine interpretari. Vox  
 Tholus (Gr. Θολος) occurrit apud VARRONEM in de-  
 fcribendo Ornithonē Turdis fervandis et faginandis  
 conftructo. VARR. l. iii. c. 5. “ Tholus camera in-  
 “ terior *denfè* columnata; exterioribus lapideis, inte-  
 “ rioribus ex Abiete tenuibus,” fc. denfis adeo, ut par-  
 vulæ hæ aves minime transire queant. Ex ftructura  
 Tholi clathrato-columnata, conjicere licet Θολον quod-  
 dam clathratum fignificare. Θολος, ceu Cella penaria,  
 HOMERI Od. xxii. lignis crebris parallelis construc-  
 tus videtur, quo aer facilius permeet; ficut et Θολος,  
 five vaporarium in balneis. Hinc fi ramulus, vel fur-  
 culus extremus aliquis P. *Piceæ* L. cum foliis den-  
 fiffime ex oppofito infpiciatur, fimilitudo apta της  
 μορφης Θολοειδους occurret. (vid. Tab. fig. B.) Quod fi  
 vocem κυνειας confideremus, nihil omnino cum ramo  
 abietino commune habet. Subftituo levi immutatione  
 unius literæ vocem κτανειας. Vox κτανεια quidem ipfa  
 non reperitur, fed κτενος gen. a κτεις, pecten, eft notif-  
 fima, Dorice κτανος; et ex infpectione ramuli Ελατης  
 Σηλειας, ceu Pinūs Piceæ, cujus iconem exhibui, Tab.  
 fig. B. licet conjicere κτανεαν Βοιωτιαν dentibus utrinque  
 ex adverfo inftrectam fuiſſe, ut in buxeis et eburneis  
 noſtris, Angl. “ a double-toothed comb.” Notandum  
 etiam eſt vocem πτερυγα pinnam alæ, æque ac alam

significare; (vid. Hesych.) unde folium *alatum* superioris ævi Botanicorum, est folium *pinnatum* Linnei. Voces ἀρρην, Θηλεία, quæ in describendis plantis frequenter apud THEOPHRASTUM occurrunt, fertilitatem vel sterilitatem, habitumve plus vel minus robustum, indicare videntur, ut et vox ἵππος plantæ nomini in compositione præfixus; et hîc loci notatu dignum est, Ελατην ἀρρένα raro ante provec̃tiores ætatis annum femina maturare. In aliis vero ejusdem auctoris locis distinctio hæc in Mares et Fœmineas v. g. in Palmis et Ficubus, clare indicatur. Methodum Palmas fœmineas polline masculo fœcundandi libet hîc subjicere. Γίνεται δε τουδε τον τροπον· όταν ανδη το Αρρέν, αποτεμνοντες την σπαθην, αφ' ἧς το ανθος, ευθυσ ὡσπερ εχει, τον τε χνουν, και το ανθος (fors. legend. του ανθους. v. χνους) και τον κουιορτον, ΚΑΤΑΣΕΙΟΥΣΙ κατα του καρπου της Θηλειας, κ'αν τουτο παθη, διατηρει, και ουκ αποβαλλει. l. ii. ad finem.

In Tabula Systematica secundum Linnei methodum ordinanda mendas plurimas occursuras fatis scio: veniam tamen mihi dabit Lector, utpote qui opus tantæ molis aggredi primus ausus sim; observationibus autem illorum qui plantas loco natali crescentes investigaverint, et progressu operis celeberrimi, Flor. Græcæ, ita auspicato apud nos inchoatæ, Plantarum THEOPHRASTI Catalogus, indies, ut spero, accuratior evadet.

Nuperrime mihi in manus venit opusculum, cujus



titulus “ Tentamen in historiam plantarum THEO-  
“ PHRASTI, Auct. I. I. P. Moldenhawer, Hamburgi,  
“ 1791. Occasionem hujus Auctoris libello, ut ipse  
“ ait, præbuit exemplar editionis Aldinæ primæ, His-  
“ toriæ Plantarum Theophrasti, et de Causis Plan-  
“ tarum, variis lectionibus auctum, in Bibliotheca  
“ Regia Havniæ, una cum manuscriptis Alberti Fa-  
“ bricii. In eo nempe cum occupatus fuerit, ut  
“ utrumque opus commentario, notisque criticis il-  
“ lustratum ederet, *summo Theophrasti acumine per-*  
“ *culsus, et plura illum, quam vulgo opinantur, vidisse*  
“ *perspiciens*, Tentamen hoc, ut specimen hujus insti-  
“ tuti peritis tradit, ut illorum suffultus iudicio ratio-  
“ nem operis moderaretur.” Quatuor tantummodo  
primi libri *περι φυτων* capitula ibi prelo mandantur; ad-  
ditis emendationibus textûs, investigationibus planta-  
rum quæ in his continentur, et quæ de partibus  
plantarum, et de earum interna structura perspecta  
habuit THEOPHRASTUS. Apud nos etiam miscellaneo  
opere tractatûs varios Historiæ Naturalis continente  
cel. vir GUL. FALCONER, M. D. plantas Theo-  
phraستي et Dioscoridis, aliorumque scriptorum apud  
Græcos, additis Bauhini et Linnei synonymis, edi-  
dit, Cantabrigiæ, A. D. 1793. Ob variam sane Cl.  
scriptoris doctrinam, et inprimis summam Græcæ lin-  
guæ peritiam, “ Tabulam Plantarum in priscis Scrip-  
“ toribus Græcis maxime repertarum,” cuius Naturæ  
inquisitori operæ pretium erit studiose perpendere;

non tamen hujus instituti est discrepantia nomina plantarum Theophrasti et Dioscoridis, aliorumque in concordiam redigere, sed tantummodo ex descriptionibus suis in unum collatis Tabulam systematicam Plantarum THEOPHRASTI Lectori exhibere.

Non autem tanquam Auctor systematicus, uti recte admonet LINNEUS, contemplandus est THEOPHRASTUS, etsi inter Physicos vix magistro ejus Aristoteli sit posthabendus. Comparatione scilicet (l. i. c. i. *περι φυτων*) instituta inter animalia et vegetabilia, *τα μερη, τα παθη, τους βιους, τας γενεσεις*, amborum sedulo definit. Vires medicas etiam, et varias culturæ methodos incredibili fide ac cura persequitur, ut magis rem quotidiani usûs legere videamur quam longinqua vetustate abditam. Cujus rei exempla pauca liceat hoc loco proferre: 1. Methodum uvas sine acinis producendi. 2. Infita ex duobus Vitis, *Viniferæ* L. varietatibus in unum jungendi, ut albæ et nigræ in eodem racemo inveniantur uvæ. 3. Luxuriam nimiam, fissò stipite, *calculo interposito* reprimendi. 4. Amygdalorum sterilitatem, ope fistulæ ferreæ in truncum circumactæ, quo succus nimius effluat, corrigendi. 5. In quamplurimis fructiferis arboribus corticem auferendo, vel circumscindendo: optime enim noverat vir acutissimus, quod quidem sæpius diserte monuit, fertilitatem ex debilitate, sterilitatem ex robore provenire.



CATALOGUS ALPHABETICUS  
PLANTARUM THEOPHRASTI,  
DESCRIPTIONIBUS SINGULARUM  
IN UNUM COLLECTIS,  
ET  
IN GENERA ET SPECIES,  
JUXTA  
SYSTEMA LINNEI,  
QUOAD FIERI POTUIT, DISPOSITIS.





---

# CATALOGUS ALPHABETICUS

## PLANTARUM THEOPHRASTI.

---

### A.

#### ABPOTONON. *Syngen*<sup>a</sup>.

Unā cum Ruta, Origano, &c. ut sempervirens, i. 15. caulis lignosus, foliis parvis, vi. 1. ex radice vel furculis propagatur, rarius ex femine; planta frigoris impatiens; radices lignosæ, profunde in terram agentes, vi. 7.

#### ΑΓΝΟΣ. *Didynam*.

Cultura et tempore ad arboris magnitudinem accedit, i. 5. cum Paliuro et Hedera enumeratur, ibid. flores superi, *Bot.* ut Pyri, Punicæ, i. 22. fructificatio in summitatibus, i. 23.

#### ΑΓΡΩΣΤΙΣ. *Triandr*.

Culmus nodosus, i. 10, radix nodosa, repens; ad nodos radículas et stolones emittens; cum Cypero enumeratur inter paludosos, iv. 11. Sæpius non occurrit.

#### ΑΓΧΟΥΣΑ. *Pentandr*.

Genus herbaceum, (πωδης,) vii. 9. foliis radicalibus, caule nudo; cum Plantagine et Anthemio enumeratur; radix rubra, ib.

#### ΑΔΙΑΝΤΟΝ. *Cryptog*.

Folia hyemem durant, nullo certo germinandi tempore, vii. 10.

<sup>a</sup> Vide Tabulam Systematicam.

folia humorem repellunt, unde nomen, vii. 13. duæ species numerantur, 1. A. λευκον, 2. A. μελαν, cujus usus ad capillos nutriendos, fucco oleo mixto, ib.

### AEIZΩON.

*Dodecand.*

Foliis carnosus, (σαρκοφυλλον,) i. 16. folium viride et succulentum, etiam in locis aridis; folia succulenta, lævia, oblonga, vii. 14. Habitat in arvis, in summis murorum, et super figulas.

### AIGEIPOΣ.

*Polygam.*

Cortex carnosus, i. 8. species peculiaris ex insula Creta memoratur, ii. 3. in pratis abundat, iii. 4. antiquitus arbor sterilis vocata; in Creta fructifera, iii. 5. arbor præcox, iii. 6. juxta aquas crescit, και ευαυξης εστι, "is of quick growth," iii. 7. species unica datur, arbor procera, iii. 14. βραχυβιος, "short lived," iv. 14.

### 1. AIGIAΩΨ—δρυς.

*Monæc.*

Species hæc glandem maxime amaram fert; habitat in M. Ida; arbor omnium procerrima, cortice maxime omnium lævi, ligno solidissimo; raro in agris cultis, iii. 9.

### 2. AIGIAΩΨ—gramen.

*Polygam.*

Semina annis successivis proveniunt, vii. 12. folia pubescentia et nitentia vere, viii. 7. inter segetes hordei frequentissime, viii. 8. terram maxime exhaurit. Radicibus et caulibus numerosissimis, viii. 9. semen non germinat, nisi cito satum; nec occultari terra amat, sed inter gramina germinat; arena amat et culta, viii. 11.

### AIMAΔΩPON.

*Didyn.*

Spec. parasitica; nasc. ex radice Cumini, caule unico simpliciter; capite amplo, obtuso; radice orbiculari, viii. 8. semel occurrit.

### AIPA,

*Triandr.*

Caulis tegumen simplex sine tunicis, (μονολοπος,) i. 8. semen noxium, capitis dolorem inducens, viii. 5. sterilitatem inducit agris, viii. 9. folia angusta, pubescentia, Bot. (δασεα) nitentia præcipue tempore verno, viii. 7. Triticum et Hordeum dicuntur degenerare in αιραν cultus negligentia.



1. AKANΘA. *Syngen.*

Gummifera; gummi Illyrico, odore et colore, fimilis. Hab. reg. Aria dict. iv. 5.

2. AKANΘA—ΑΦΥΛΛΟΣ. *Syngen.*

Μία ακανθα εφ' ἑκάστῳ τῶν οἰζῶν, spec. ignota, cujus succus expressus oculis perniciosus, iv. 5.

3. AKANΘA ΔΙΨΑΣ. *Syngen.*

Desc. nulla. Hab. in arenosis Arabiæ prope mare Rubrum, iv. 8.

4. AKANΘH INΔIKH. *Syngen.*

(Id. q. Ακανθη gummifera, iv. 5.) quæ vocatur Ατρακτυλις. (vid. vi. 3, 4.) ix. 1, cujus gummi, coloris sanguinei.

5. AKANΘA KEANΩΘΟΣ. *Syngen.*

Vid. Κεανωθος.

6. AKANΘA ΛΕΤΚΗ ΤΡΙΟΖΟΣ. *Syngen.*7. AKANΘA 'ΗΡΑΚΛΕΙΑ. *Syngen.*

Ex hujus caule baculi fiunt; caulis succo plenus, spec. ignota, iv. 5.

8. AKANΘA ΧΑΛΚΕΙΟΣ. *Syngen.*

Ita dicta ex colore floris; semel occurrit, vi. 3.

AKANΘΟΣ. *Polygam.*

Hab. in arvis, non in montibus, Macedoniæ, iii. 4. spinosa per totum; magn. ampla, lignum utile. Species duæ; 1. A. albus; 2. A. ater. 1<sup>ma</sup>. ligno molli, ευσηπτῳ, “quickly decaying.” 2<sup>da</sup>. lig. duro, ασηπτῳ; loti ligno simili; fructu lobato, coriariis utili; flore specioso in fertis usitato, arbor gummosa, sylvam cæduam formans. Hab. Thebaide, iv. 3.

AKAPNA.	}	<i>Syngen.</i>
AKOPNA.		

Foliis spinosis, i. 16. pl. herbosa, et inter spinosas cum carduis

enumeratur, vi. 3. Cnico affinis fativo? (ἡμερω) colore subflavo, et foliis nitentibus, (λιπαροῖς.)

**AKONITON.** *Polyand.*

Folio Cichorii, radice tuberculata, bulbis nuciformibus, venosis; ceteræ partes innoxiae: habitat in Ακοναῖς, pago quodam Mariandunorum, unde nomen, ix. 16. N. B. Textus forsan corruptus; ακονη enim cos; εν ακοναῖς (locis faxosis) pagi, &c.

**AKOPOS.** *Hexandr.*

Flos infidet femini, semel occurrit sine descriptione, cum Cnico, i. 22.

**AKTH.** }  
**AKTEOS.** } *Pentand.*

Lignum tortuosum, (λοξον) i. 8. sine medulla secundum quosdam, i. 9. secundum alios medulla carnosæ, ib. lignum enode, i. 13. in udis crescit, et in umbra; lignum laxum, leve, medulla tenera in junioribus, parte interna cava in adultis; unde ex levitate baculi fiunt, radices superficiales paucæ, folia περι ένα μισχον, (pinnata,) παχυ, ινωδες, (pedunculo crasso, strigoso,) τα μεν ενθεν, τα δ' ενθεν, (opposita,) κατα γονυ και συζυγίαν, (ad nodos et juncturas,) εχοντα δ' εν, (φυλλον) επ' ακρον, (terminata folio impari Bot.) ανθος λευκον εκ μικρων λευκων πολλων, (umbella alba, ex flosculis albis numerosis,) επι μισχου σχισει, κηριωδες, (ad divisuram pedunculi formam exhibens favi, sc. cavitatibus florum in plano, vid. Κηριωδης Lex. Theophr.) odor liliaceus; bacca lentis magnitudine, immatura, purpureo-rubra, (ομφακωδης) matura, nigra, iii. 13. Sambuci desc. accuratissima. Lign. solidum album, iv. 4.

**ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΑ ΔΑΦΝΗ.** *Diœcia.*

Fructum fert super folium, ex rachi, vel vena intermedia; eodem modo ac Κεντρομυρρίνη, (Ruscus aculeatus,) ambo enim Rusci L. species, iii. 17.

**ΑΛΘΑΙΑ.** *Monadelp.*

Ab aliis Malva sylvestris; hab. Arcadia, Macedonia; planta medicinalis, ix. 15. foliis Malvæ, sed majoribus, et magis pubescen-



tibus; caules etiam pubescentes; flore luteo; fructu Malvæ; radice fibrosa alba: succus gustu similis caulis Malvæ; usus adv. hernias, et morbos pulmonum, et ulcera externa, oleo mixtus, ix. 19.

## ΑΛΙΜΟΝ το.

*Polygam.*

Sp. Salicorniæ, ex qua fal Kali, "Barilla" dict. ex Europa Australi; plantas alias necat ex abundantia falis muriæ in succo, iv. 20. de C. Pl. v. ἐν ἀλμυρῶσι φρεται. de Caus. Pl. vi.

ἈΛΙΦΛΟΙΟΣ. Vid. Δρυς. *Monæc.*

## ΑΛΩΠΕΚΟΥΡΟΣ.

*Triandr.*

Spec. σαχυωδης, μαλακος, χυνώδεσενος (vid. Χνως) ὁμοίος των Αλωπεκων θραις. Descriptio hæc satis convenit graminei Alopecuro Linn. item ἡ ἀνθησις χυνώδης (flores apetalæ Bot.) καδαπερ τὸ Σιτς, vii. 10. N. B. Textus hic corruptus valde: nec satis liquet quare Αλωπεκούρος cum Στελεθερω (Plantagine L.) et Θρυαλλιδι (Verbasci L.) ut planta affinis et Σταχυωδης enumeratur. De significatione voc. στελεθερος, vid. Lex. Theoph. Σταχυς Θρυαλλιδος (Thyrus Botanicorum) οὐκ ὄξυς, οὐδὲ ἀδερωδης (barbatus Bot. vid. Lex.) ἀλλ' ἀπλα καὶ μονοειδης, quibus satis distinguitur Verbasci Thyrus a Spica graminea. N. B. In Fasc. 2<sup>do</sup>. Flor. Græc. extat Spec. Phleum crinitum dict. t. 62. spica caudam vulpinam referente.

## 1. ΑΜΑΡΑΚΟΣ.

*Didynam.*

Pl. herbacea, sempervirens, i. 15. ramulis lignosis, foliis parvis, vi. 1. πολυσπερμος, fragrans, foliis mollioribus Abrotano; radice fibrosa, superficiali, vi. 7. vires aromaticæ, ix. 7.

## 2. ΑΜΑΡΑΚΟΣ.

*Hexand.*

Spec. duæ; 1. Α. φρυγιος; 2. Α. ποδος; quorum prior flore Hyacinthis simili, alter αχρους, λευκος (an οχρο-λευκος, albidus,) cujus usus ad funera ornanda, vi. 7.

## 1. ΑΜΠΕΛΟΣ.

*Pentand.*

Cortex laceratus, i. 8. medulla carnosæ, i. 9. folia ampla, i. 16. succus aquosus, i. 19. flores staminei, i. 21. flor. inferi, Bot. i. 22. furculi recentes fructum ferunt. i. 23. Varietates occur-

runt plurimæ, i. 24. propagatur ex ramis junioribus, ii. 1. ferendo degenerat, ii. 3. var. A. καπνιος dicta, cujus racemi variegantur albo et nigro, (εκ μελανος βοτρυος λευκον, και εκ λευκου μελαν φερει) ii. 4. Hab. in Tmolo monte, et Olympo. A. μανομενα. de C. Pl. i.

## 2. ΑΜΠΕΛΟΣ ΑΓΡΙΑ.

Radix Vitis sylvestr. caustica, depilatoria.

## 3. ΑΜΠΕΛΟΣ ΙΔΑΙΑ. *Pentandr.*

Fruticosa spec. ramulis parvis; racemis lateralibus; uvis Pifi magn. gustu suavi; acinis mollibus; foliis parvis, rotundis, indivisis, iii. 17.

## 4. ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΟΝΤΙΑ. *Cryptog.*

Species 2. littoralis et pelagica, sed fructus pelagici major; vesiculæ rotundæ, F. bacciferi et natantis L. pro fructu accipiebantur, cujus forma haud inepte uvam refert.

## ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ. *Icosandr.*

Nux cum putamine statim enascitur, i. 18. semina oleosa, i. 19. flos petalis instructus, amplus, i. 21. fructum fert in furculis biennibus, i. 23. mos succum extrahendi ope paxilli in lignum inducti, quo fructifera evadat, ii. 3. flores prodeunt ante folia, vii. 12. arbor gummosa, ix. 1.

## ΑΜΩΜΟΝ. *Monandr.*

Ex Media transfertur, item ex India; cum Cardamomo enumeratur: sed unguentum solum memoratur, ix. 6, 7.

## ΑΝΑΔΕΝΔΡΑΣ. *Class. incert.*

Spec. Epidendri peculiaris. de Cauf. Pl. v.

## ΑΝΔΡΑΧΝΗ. *Decandr.*

Sempervirens, i. 15. montana sp. hab. Macedonia, iii. 4. duæ species enumerantur, quæ simul germinant, iii. 6. ευαυξης, (cito crescit,) iii. 7. foliis Κομαρου (Arbuti), cortice lacero, et sese abjiciente; (ὡς ε' αποπιπτειν,) i. 8. albido, fructu Arbuti, iii. 16. lignum tornatile, et ad fusos usitatum, v. 8.



ΑΝΔΡΑΦΑΞΙΣ. }  
 ΑΤΡΑΦΑΞΙΣ. } *Polygam.*

Satio post solstitium autumnale, vii. 1. semen post octo dies emergit, ib. semen latum, membrana cinctum, (φυλλωδες) vii. 3. radix fusiformis, vii. 2. Species una saltem: femina non durant, vii. 6.

ΑΝΔΡΥΑΛΙΑ. *Syngen.*

Semel inter λαχανα occurrit, quæ usibus culinariis inferviunt; inter κηχωριωδη cum Αφακη, Ὑποχοιριδι, Ηριγεροντι enumeratur, vii. 7.

1. ΑΝΕΜΩΝΗ. *Polyandr.*

Floret post primum tempus pluviale, vii. 8. Desc. nullæ

2. ΑΝΕΜΩΝΗ ΛΕΙΜΩΝΙΑ. *Hexandr.*

Spec. Narcissi sylvestris, quæ floret cum Ελειοχρυσω, Ξιφιω, Ὑακινθω; vi. 7. ανθη εαρινα. ib.

ΑΝΗΘΟΝ. }  
 ΑΝΗΣΟΣ. } *Pentandr.*

Species gymnosperma, (vid. Γυμνοσπερμος Lex. Theophr.) cum Cumino, Coriandro, Fæniculo. (N. B. Non Gymnosf. Linn.) i. 18. planta fragrans, i. 19. αμαυροκαρπος, (fructus parvus latens?) ex axillaribus ramis fructum fert, ut ferula, vi. 2. feminatur bis in anno, vii. 1. Κοριαννον, Μαραθρον, Ανηθον, γυμνοσπερματα: vid. divisionem in γυμνοσπ. εμφλοιοσπ. et παπποσπερματα, vii. 3. femina inter unguentaria, ix. 7.

ΑΝΘΕΜΟΣ. }  
 ΑΝΘΕΜΟΝ. } *Syngen.*  
 ΑΝΘΕΜΙΟΝ. }

Flos femini infidet, i. 22. foliis radicalibus, radicem cingentibus, vii. 9. flores ad apicem primo florent: forma floris, το εν κυκλω ανθος λευκον, (radii circulares floris, albi,) το δ' εν μεσω χρυσος, (discus floris luteus, vel aureus,) vii. 13.

## ANΘEPIKON.

*Hexandr.*

Planta herbacea, quæ vel in aridis vel in uliginosis et paludibus marinis provenit, ut Scylla, i. 7. planta fistulosa, cum Conio, Fæniculo, &c. enumeratur. N. B. Distinctio fumitur illarum quæ caule sunt lævi, ut Mandragoras, Conium, Helleborus, Anthericum; et quæ caule nervoso et striato, ut Fæniculum, &c. vi. 2.

## ANTIPPINON. }

## ANTIPPIZON. }

*Class. incert.*

Dicitur esse simile Aparines, ix. 21.

## ΑΠΑΡΙΝΗ.

*Tetrandr.*

Caulis scandens, vii. 8. adhæret vestibus δια την τραχυτητα, nec facile abstrahitur; flos dicitur innasce in aspero pericarpio, inconspicuus, Bot. et in seipso fructificans, ut ovum, vii. 14. Ervi fegetes infestat, viii. 8.

## ΑΠΑΘΗ.

*Class. incert.*

Επιγειοφυλλος cum Αρνογλωσσω, vii. 9.

## ΑΠΙΟΣ.

*Icosandr.*

Arbor mediæ magn. i. 4. folium περιφερές, in medio turgidum, P. mali L. folio rotundius, i. 16. succus, (χυλος) "the sap," aquosus, i. 19. flores πεταλωδεις, (petalis distinctis) i. 21. ex furculis biennibus vel annuis floret, i. 23. Varietates cultæ maxime differunt a sylvestribus, i. 24. ferendo degenerat, ii. 3. propagatur infitione, ii. 7. sylvestres spec. validiores, sed minus fructiferæ, iii. 3. fructum fert ex furculis extremis, et ex lateralibus, Ang. "spurs," iii. 7. optimi circa Pantacapæum, in Ponto, iv. 6. Distinctio inter Απιον et Αχραν, sylvestrem sc. et cultam, iv. 11. Sylvestris spec. minus obnoxia vermibus, iv. 16.

## ΑΡΑΚΟΣ.

*Diadelph.*

Planta infestans fegetes Ervi; herba aspera, fragilis, (σκληρος) viii. 8. N. B. Hinc forsan vox Latina cracca, nomen triviale Viciæ spec. Linn.

ΑΡΑΚΟΥ ΟΜΟΙΟΣ. *Diadelph.*

Cum Αραχιδνα enumeratur, i. 11. vid. Αραχιδνα.



## ΑΡΑΧΙΔΑΝΑ.

*Diadelph.*

Fructu vel tuberculo sub terra : cum Ουιτω enumeratur, i. 1. radix simplex carnosā ; ceteris fibrosis, super quibus fructûs, vel tubercula, i. 11.

## ΑΡΙΑ.

*Icosandr.*

Fructus maturatur hyeme ineunte, iii. 6. Dorica spec. Αρια vocata, Πρινω affinis, cujus lignum intermedium inter Πρινον et Δρυν λευκοτερον του Πρινου, οινωποτερον της Δρυος, “ lighter coloured than the first, darker than the last,” iii. 16. folia Πρινου : fructus vocatur Ακυλον, ib. lignum hyeme cæditur, v. 1. durum, fragile, v. 4. incorruptum, v. 5. δυσεργον, ut quercûs lignum, v. 6.

## ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΙΑ.

*Gynandr.*

Fructus fragrans odore, etsi gustu amarus ; foliis Alfines, sed angustioribus ; radice nigra : planta medicinalis valde, ix. 13. Hab. in Arcadiæ et Laconia montibus : in Pelio, Clitoria, Tegea, &c. ix. 15. radix magna, atra, amara, sed fragrans ; foliis rotundis, radicalibus, ib.

## ΑΡΚΕΤΘΟΣ.

*Diœcia.*

Sempervirens, i. 15. spec. montana, iii. 4. ενιαυτοφορος (fructus maturatur anno 2<sup>do</sup>.) iii. 6. cito crescit, iii. 7. habitat cum Ελατη in montium lateribus, non in fummis, iv. 1. lignum usitatum in ædificando cum Ελατη et Κεδρω, vi. 8.

## ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΟΝ.

*Tetran.*

Foliis coronam radice cingentibus : επιγειοφυλλον, vii. 9. spica floret κατα μέρος, (successive) vii. 10.

## ΑΡΟΝ.

*Gynandr.*

Radix magna, carnosā, i. 9. simul cum Cypero, i. 10. radix lævis, mollis, sine cortice, vii. 9. radix edulis cum aceto : quo radix crescat magnitudine, circumvertunt radicem ne foliis luxurietur, et alios generet radiculos, vii. 11. folia subtus cava, et lata, vii. 12. plant. ακαυλος, vii. 12.

## ΑΣΙΝΗ.

*Class. incert.*

Cum Ερπυλω enumeratur semel. de C. Pl. ii.

**ΑΣΚΙΟΝ.***Cryptog.*

Tuberis spec. cum subterraneis Ὕδνω, Ουιπω, vel Ουιγγω enumeratur, ὧν οὐδενὶ ἐστὶ ῥίζα, i. 10.

**ΑΣΚΛΗΠΙΑΣ.***Pentandr.*

Panaceæ species, sic dicta ab Æsculapio; radix σπιθαμιαίος, alba, crassa, cortice valde crasso; ἀλικωδεῖ? (i. e. fucco salino) caulis nodosus, foliis θαψίας, sed crassioribus, ix. 12. Vid. Πανακες.

**ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ.***Class. incert.*

Inter odoriferas, ix. 8.

**ΑΣΠΑΡΑΓΟΣ.***Hexandr.*

Planta aphylla, spinosa, i. 16. spinis solum, ut Σκορπιος, vi. 1. floret autumnō, vi. 3. producit aliquod clavæforme, (κορυνώδες,) parvum, ex quo prodit flos parvus, ib. radices profundæ et numerosæ; stolones ἐκ τῆς Ασφαραγίας, ("the Asparagus bed,") edules; unde liquet antiquis usum plantæ notum esse, ib.

**ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ.***Hexandr.*

Foliis radicalibus, i. 16. radix glandiformis, (βαλανωδῆς) vii. 9. radix edulis, vii. 11. foliis longis, angustis, nitentibus, ib. πολυκαρπος; semine lignoso, triquetro, in pericarpio rotundo, infero, Bot. dehiscente per maturitatem; floret fuccæffive; caulis supra ramosus? (ἀποφύσσει ἀνωθεν ἐχών,) vii. 12 Vid. ἀποφύσσεις.

**ΑΤΡΑΓΕΝΗ.***Polyandr.*

Semel cum Corylo *Avellana* occurrit: lignum ad πυρείας εσχάραν utile: (vide πυρεία,) v. 10.

**ΑΤΡΑΚΤΥΛΙΣ.***Syngen.*

Spinis in caule et foliis, ἀκανοίς etiam (perianthiis vel capitulis spinosis) cum Κνίκῳ, Ογισπορδῳ, aliisque Carduis enumeratur, vi. 3. λευκοτέρα πασών, (foliis magis canis,) fuccus sanguineus: vocatur Ακανθα φονός: odor gravis; fero floret, vii. 4. fuccus sanguineus, ix. 1.

**1. ΑΦΑΚΗ.***Diadelph.*

Οψισπερμός, viii. 1. legumen latum, viii. 5. cito germinat, viii. 10.



2. ΑΦΑΚΗ. }  
ΑΠΑΘΗ. }

*Syngen.*

Planta *κίχωριωδης*; floret successive, vii. 10. spec. amara et inedulis; cito senescit et in pappum abit; flos pallide luteus, vii. 11. germinat *πρωτοις υετοις*, vii. 8. floret per totam æstatem, vii. 11.

ΑΦΑΡΚΗ.

*Pentandr.*

Sempervirens, i. 15. hab. in montibus Macedoniae, iii. 4. spec. sylvestris et culta germinant simul, iii. 6. lignum utile ad vallos et fudes, v. 8.

ΑΦΙΑ.

*Class. incert.*

Planta *κίχωριωδης*, quæ semel memoratur, vii. 8. floret statim cum prima germinatione. N. B. Forſan error textûs pro *Αρια*.

ΑΧΡΑΣ.

*Ifocandr.*

*Καλλικαρποτερος Απιου*, i. 7. differt max. a culta spec. i. 24. hab. in planis, iii. 4. floret post cultam, iii. 6. *ευανξης*, (cito crescit,) iii. 7. maxima inter *Αχραν* et *Απιον* differentia, iv. 14.

ΑΧΥΝΩΨ.

*Incertum.*

(Bas. *χυνωψ*), cum *Αρνογλωσσω*, *Στελεφουρω* floribus spicatis, cylindricis, vii. 10. N. B. Censeo legendum *Εχινωψ*, vel forſan *Κυνωψ*, spec. flore ringenti. Bot. Vid. vii. 8.

ΑΨΙΝΘΙΟΝ.

*Syngen.*

Succus amarus ut Centaurium, i. 9. inter odoriferas quæ frigora amant, iv. 6. folia amara, sed utilia, vii. 9.

## B.

ΒΑΛΑΝΟΣ ἡ.

*Class. incert.*

Nux in cortice coriaceo, i. 17. gustu dulci, melleo, i. 19. arbor ita vocata ex fructu glandiformi, iv. 2. Hab. Ægypto; folio Myrti vel angustiore; arbor satis ampla, ramis tortuosis. Unguentarii nucibus et pericarpis simul utuntur, ambo enim odoriferæ: nux forma et magnitudine similis *Καππαριος*, lignum navibus fruendis utile, iv. 2.

**ΒΑΛΣΑΜΟΝ.** *Class. incert.*

Gummi sponte fluit ut lachryma, ix. 1. excisione apud Syros colligitur, ix. 2. Habit. εν αυλωνι της Συριας, (inter Libanon et Antilibanon,) arbor magnitudine Punicæ L. ramosissima, foliis rutaceis, sed magis incanis; sempervirens; fructu simili Τερεβινθου. Gummi hujus arboris omnium pretiosissimum abraditur a cortice ονυξι σιδηροις, (instrumentis unguiformibus) sæpe adulteratur, ix. 6. inter aromatica recensetur, ix. 7.

**ΒΑΤΟΣ ἥ.** *Ifocandr.*

Cum Paliuro, ut frutex, i. 4. cum eodem ut frutex spinosus, i. 8. caules spinosi, i. 16. sempervirens, cum Paliuro, iii. 17. genera plura: 1. erecta; 2. repens, cujus ramuli όταν συναπτωσι τη γη ριζονται παλιν. (N. B. Species hæc vocatur optime, Χαμαιβατος.) 3. Κυνοσβατος fructu rubro simili rosæ, sc. Rosa canina L. folio Viticis, agni casti L. iii. 18. spec. λοχμωδης vocatur ἡ Βατος, cum Παλιουρω, ut in paludibus et aquosis crescens, iv. 9. ib. iv. 13. πτορθακανθος, ramis spinosis, vi. 1. N. B. Βατος ὁ an sp. diversa, de Cauf. Pl. 1.?

**ΒΛΗΚΩΣ.** *Didynam.*

Id. q. Γληχων, Mentha pulegium Linn. ? semel occurrit, ix. 16. ubi Dictamni folia τη Βληχοι comparatur.

**ΒΑΙΤΟΝ.** *Polygam.*

Ακροκαρπον, και πλαγιοκαρπον, una cum Ανδραφαξει et Ψαφανω, i. 23. feritur mense Martio, vii. 1. radices agit fibrosas, vii. 2. radices lignescunt, vii. 3. semina membrana obvoluta (εμφλοιοσπερματα) vel cortice tecta? ib. Genus simplex, vii. 4.

**ΒΟΛΒΟΚΩΔΙΟΝ.** *Hexandr.*

Vocatur βολβου κωδιον duobus verbis: florens post Narcissum; nec sæpius memoratur, vi. 7.

**1. ΒΟΛΒΟΣ.** *Class. incert.*

Radix cortice tecta et tunicata; cum Scylla, et Allio cœpa L. i. 10. folia fine pediculo, (αμισχα) i. 16. propagatur ex bulbis, vii. 2. radix tunicata, (λεπυρωδης) vii. 9. folia linearia, παντελως σενα, (per totum angusta.) Spec. hæc εχει καυλον του ανθους μωρον, (i. e. scapum Bot.) vii. 12.



**2. ΒΟΛΒΟΣ ΕΡΙΟΦΟΡΟΣ.** *Class. incert.*

Γενος ιδιωτατον, (maxime peculiare,) hab. in arenosis maris; pars lanosa sub primis tunicis; pars interior edulis, in Taurico Chersoneso, vii. 13. lana, gossipina, non sericea, ib. N. B. Hyacinthi Peruviani mentio fit sub nomine Bulbi eriophori. Act. Soc. Horticult. Lond. v. 1. p. 47.

**ΒΟΛΒΙΝΗ.** *Hexandr.*

Simul occurrit cap. eodem, vii. 13. dicitur infestare fegetes; an bulbus Hyacinthi *Botryoidis* L.?

**ΒΟΥΚΕΡΑΣ.** *Gynandr.*

Nihil æque aridum, recenti statu, viii. 8.

**ΒΟΥΜΕΛΙΑ.** *Diandr.*

Arbor excelsa, cortice lævi; hab. Macedonia in planis, iii. 11. in Ægypto abundant Μελια et Βουμελια, iv. 9. in aquosis, ib. non occurrit in Græcia. Vid. Fl. Græc. Fasc. 1<sup>mum</sup>.

**ΒΟΥΠΗΣΤΙΣ.** *Class. incert.*

Planta cichoracea, cum Aphaca et Κυνωπι, germinans cum pluviis primis, vii. 8.

**ΒΟΥΤΟΜΟΣ.** *Monæc.*

Caulis εχων ὀμαλωτητα ιδιαν, (lævitatem singularem,) vid. Ὀμαλος. Nervo acuto folium transcurrente, γωνιοφυλλος, vid. γωνια, i. 16. inter fluviatiles, iv. 9. fructus ater, similis fructui Σιδης pl. masculina inutilis; pl. fæmina πλοκαμοις utilis, iv. 11.

**ΒΡΟΜΟΣ.** *Triandr.*

Fructus, i. e. spica, omnium maxime paleacea, (πολυλοπος,) viii. 4. ὁμοιοφυρος, (i. e. tritici affinis habitu) terram exhaurit maxime post Ζειαν, πολυκαλαμος ων, και πολυρριζος.

**Γ.****ΓΑΛΒΑΝΟΝ.** *Pentandr.*

Aliis Χαλζανον: gummi solum occurrit, ix, 1. Planta forsitan γαλζανος?

ΓΗΘΥΟΝ.

ΓΗΤΕΙΟΝ.

ΚΡΟΜΜΥΟΓΗΤΕΙΟΝ.

} *Hexandr.*

Κοιλοφυλλον, (folio cavo intus,) i. 16. anno secundo maturat fructum, vii. 1. 2<sup>da</sup>. fatio menf. Munychione. κεφαλον, και ὡσπερ αυχενι μακρω? sæpius fecatur, (Porrum *sestile* L.) propagatur ex radice, vii. 4. amat loca irrigua, vii. 5. ου μεταφυεται, ib. fermen minime durat, vii. 6.

ΓΛΕΙΝΟΣ. Syn. Ζυγιας. Vid. iii. 4.

ΓΛΗΚΩΝ.

*Didynam.*

Inter λαχανα fine descr. utpote notissima enumeratur; Φιλονοπρα vocatur, et multo melius transplantatione provenit. N. B. Semel occurrit, et ibi apud Aldum Γλισχος legitur, sed male. vii. 5. Vid. Βληχως.

ΓΛΥΚΥΣΙΔΗ.

*Polyandr.*

Παιωνια ab aliis vocata, ix. 9. Vid. Παιωνια.

ΓΟΓΓΥΛΙΣ.

*Tetradyn.*

Radix carnosæ, i. 9. corticata, i. 10. feritur cum primis pluviis, vii. 1. radix magna, bulbosa; cortex avulso facilis, vii. 2. πλαγιοκαρπος, (opp. ακροκαρπω, cujus fructus in apicibus,) vii. 3. duæ sp. masc. et fœm. vii. 4. non transplantatur, vii. 5. bulbosus corticatus, vii. 9.

## Δ.

ΔΑΥΚΟΝ ΔΑΦΝΟΕΙΔΕΣ. *Class. incert.*

Pl. pharmaceutica, succus solum describitur, crocei coloris, xi. 15. Δαυκον an spec. eadem? Hab. Arcadia juxta Laconiam, singularis species radicem habens nigram, succo Δερμαντικῷ διαφεροντως, (omnium calidissimo) ix. 22. cum Πευκεδανῷ jungitur.

1. ΔΑΦΝΗ.

*Enneandr.*

Αεπτοφλοιος, i. 8. radice ανωμαλει, (an scabra, an inæqualis



magnitudine? vid. ὄμαλος) i. 9. Arbor ἀνοζος, (enodis,) cum Συκη, Ἀκτη, i. 13. fempervirens, i. 15. iii. 4. baccæ oleosæ, i. 19. species plurimæ, i. 24. pullulat cum zephyris, iii. 6. baccæ in racemo, iii. 8. Hab. in Olympo M. iv. 6. Inimica Viti, iv. 20. Baculi senibus ex illa fiebant ob levitatem, v. 8. usus ad τρυπανον πυρρείας, (vid. Lex. Theoph.) v. 10.

## 2. ΔΑΦΝΗ ΑΓΡΙΑ. *Enneandr.*?

Semel occurrit inter fempervirentes. An spec. peculiaris? i. 15.

## 3. ΔΑΦΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. *Diæcia.*

(Vid. Κεντρομυρρίνη) ἐπιφυλλοκαρπος; fructificatio super folium, i. 16. Hab. M. Ida, iii. 17.

## 4. ΔΑΦΝΗ ΠΟΝΤΙΑ. *Corallina.*

iv. 8.

## 1. ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. *Didyn.*

Foliis Βληχχου, (vid. supra) ramulis gracilioribus? succus gustu Menth. *Pulegii* L. similis? Vires ad partus utilissimæ; folia solummodo in usu, succus sc. expressus et aqua mixtus. Hab. Creta, ix. 16.

2 ΨΕΤΔΟΔΙΚΤΑΜΝΟΣ foliis similibus, ramis minoribus. Vires inferiores, ib.

## ΔΙΟΣ ΑΝΘΟΣ. *Decandr.*

Planta ποωδης, (herbacea,) sed caulis lignescens, μικροφυλλος, vi. 1. in fertis usitata, ib. ἀνοσμις, vi. 6. fero æstate floret, vii. 7.

## ΔΙΟΣ ΒΑΛΑΝΟΣ. *Monæc.*

Non eget cultura respectu fructûs, iii. 3. Hab. in montibus Macedoniæ, iii. 4. Ambigebatur olim de flore masculo, vel ισυλω, (amento, Bot.) iii. 6. germinat initio veris, ib. καχρυωδης, Juliferus, Bot. (καχρυς id. quod ισυλος,) iii. 7. Hab. M. Tmolus et Olympo, iv. 6.

## ΔΟΛΙΧΟΣ. *Diadelph.*

Arbores scandit, viii. 3. semina cito germinant, viii. 10.

## ΔΟΝΑΞ.

## Triandr.

Spec. omnium maxime communis : λοχμωδης, i. e. fruticosus, (vid. Λοχμος,) iv. 12.

## ΔΡΥΣ.

## Monæc.

Τραχυφλοιος, (cortice scabro,) i. 8. ακρορρίζα, (radice superficiali,) βαθυρρίζα, (unica profunda fusiformi,) i. 9. οζωδης, (nodosa arbor,) item κραδαις obnoxia, (vid. Κραδη,) i. 13. foliis εντομας εχουσι, (lobatis Bot.) i. 16. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. Amentum βρυον vocatur, iii. 6. item καχρυσ, iii. 7. primo vere apparens, ib. Species variæ, iii. 9.

1. δ. ήμερις.

4. δ. φηγος.

2. δ. αιγιλωψ.

5. δ. άλιφλοιος.

3. δ. πλατυφυλλος.

6. δ. φελλος. vid. φελλος.

1. Sp. parva, humilis, ramosissima, fine trunco ; ramis inflexis, iii. 9.

2. Sp. maxime procera et recta, cortice lævi, ligno ισχυρω, (solido,) in incultis crescens, ib.

3. Sp. inter primam et secundam proceritate et magnitudine ; ligno ad usus architectonicos minus utili ; ad carbonēs et igniaria prorsus inutili, utpote laxo et poroso, ib.

4. Sp. ουκ ορθοφυης, (fruticosa species,) ligno firmissimo, incorrupto, ramis numerosis ; ή φυτεια περικομος, (capite rotundo, vel valde folioso,) ib.

5. Sp. trunco crasso, brevi, sæpius intus cavo ; ligno minus utili ; fine corde.

6. Sp. trunco erecto ; cortice duplici. *Quercus Suber* L.

N. B. Gallæ 1mæ. spec. solum εις δερματα (ad usus coriarios) utiles. Spec. 2<sup>da</sup>. fert Lichenem Φασκον dictum. (vid. Φασκος.) Species hæc hab. in Ponto, iv. 6. lignum σκληρον και βαρυ, v. 5. sub aqua dulci durat ; falsa tamen σηπεται, ib. Carbones optimi ad usum argentariorum. Divisiones Quercûs alibi, iii. 9, 10. sic notantur :

1. ετυμοδρυσ, gl. dulci.

2. πλατυφυλλος gl. amara.

3. φηγος gl. rotunda.

4. οσπρις gl. rara, ineduli.



**ΔΡΑΚΟΝΤΙΟΝ.** *Gynandr.*

Caule variegato, ut serpentis maculæ; radix bona ad βήχας, (tusses,) ix. 22.

**E.****ΕΒΕΝΟΣ ἡ.** *Diadelph.*

Lignum ponderosum; enumeratur cum ligno Buxeo, i. 8. durities extrema, ut Loti, i. 10. Hab. India. Spec. duæ: prima; arbor speciosa, ligno utili, quæ rara est: secunda fruticosa, inutilis, iv. 5. lignum solidissimum, in aqua subfidens: gravitatis lignorum hi notantur gradus. 1. Εἶβενος, πυξος. 2. Λωτος. 3. Μελανδρουν (Heart of Oak.) 4. Κυτισος (Cyt. Laburnum.) 5. Τερμινδος, v. 4. Lignum ασάπες, (sine fucco,) v. 5. Usus ad morbos oculorum statu arido, ακονη τριβομενον, (ope cotis attritum,) ix. 22.

**ΕΛΑΙΑ.** *Diandr.*

Lign. αἰθαυσον, (tenax, Angl. "tough,") i. 8. sine corde; fecundum alios, totum cor, i. 9. radicibus scabris? nodosis et δυσανωδεσι, (fasciculis fibrarum ad nodos, vid. δυσανοι,) ib. arbor nodosa, spec. sylvestris tamen (Κοτινος dicta) nodosior Ελαια, in trunco innascitur γογγρος, (vid. γογγρος,) i. 13. sempervirens, i. 15. σρεφονται τα ὑπτια (partes superiores foliorum) μετα τροπας σερινας, (i. e. "the upper parts of the leaves turn up;") folia incana, angusta, pediculo brevi, i. 16. fructus carnosus, i. 17. oleosus, i. 19. flos πεταλωδης, (petalis distinctis Bot.) i. 21. fructus ex furculis anni prioris; differentia maxima inter sylvestrem et cultam, (Κοτινον et Ελαιαν,) i. 23. infusione propagatur, ii. 7. Κοτινος validior Ελαια, iii. 3. maxime abundat in Libya, Cyrenæa, iv. 3. spec. intermedia, sterilis in India, iv. 5. Arbor celebris Athenis, iv. 14. maxime vivax, iv. 15. Cultura fit καλλιω, iv. 19. lignum solidum album, v. 4. optimum juxta radices, v. 5. amat maris littus, vi. 2.

**ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ.** *Diæcia.*

Fruticosa sp. Αγνω vel Vitici agno casto L. similis, foliis Μηλεας,

fed mollibus; floribus apetalis, ut Populi; καρπῶ οὐδενί. Hab. in palude juxta Lacum Orchomenis, iv. 11.

## 1. ΕΛΑΤΗ.

*Monœcia.*

Nunquam culta, i. 6. Procera spec. cortex πολυλοπος, (vid. λοπος,) i. 8. cor, vel medulla lignea, ολιγορρίζα vel μονορρίζα· απα-  
ραβλαστος, (non emittens furculos,) i. 9. mares nodosiores fœmi-  
nis; πενταρζος, (ramulis horizontalibus 4. uno erecto.) N. B. οζοι  
tumores ad basin ramorum, qui apte dicuntur εμπεπηγοτες, i. 13.  
μονοσελεχης, (trunco simplici,) i. 14. sempervirens, i. 15. foliis  
ακανθωδесιν εξ ακρου, (apice pungentibus,) i. 16. arbor picea,  
i. 19. ανθει κόκκινῳ, vel forsan legendum κροκινῳ, ut apud quos-  
dam, (amento croceo Bot.) i. 21. propagatur femine solum, ii. 2.  
iii. 1. Hab. in M. Macedoniæ, iii. 4. floret vere, iii. 6. germi-  
natio conspicua δια το σπριχειν τα γονατα, και εξ ισου τους οζους  
εχειν; (de modo crescendi regulari; angulos enim rectos cum  
trunco faciunt, nodis 4 invicem oppositis, pari intervallo,) iii.  
6, 7. καχρουας εχει, (Iulum fert,) βαθυρρίζος, iii. 7. nunquam  
pullulat post cæsuram, iii. 8. Genera 2: 1. E. αρρήν. 2. E. Θε-  
λεια. 1. Pin. *Abies* L. 2. P. *Picea*, (vid. Præfat.) εν κωνῳ του αρρέ-  
νος, καρυα (femina) ολιγα επ' ακρον· ξυλον ινωδες κουφον· οζοι  
σκληροτατοι, iii. 10. amant umbrosa, iv. 1. decacuminatione mo-  
riuntur, iv. 19. decorticandæ vere, ut lignum diutius duret, v. 1.  
lignum fibrosum, ασαρκον, βαρυ, αδαδον (non inflammabile;  
opp. ligno πευκης,) οζοι κερατωδεις, (duri instar cornu;) trunci ju-  
niorum ad κεραιας (antennas) navium, v. 2. lignum proprium ad  
onera sustentanda vi elastica, v. 7. etiam ad usus navales ex levi-  
tate; et ad ædificandum, v. 8. refina δακρυωδης (in guttis) ex  
vulnere fillat, ix. 1.

2. ΕΛΑΤΗ ΠΟΝΤΙΑ. *Cryptog.*

Spec. προσγειος, (in æstuariis, aut prope littus,) φυεται επι λιθοις  
και οσρακοις· ὅλη μορφη ορθη, (habitus totus erectus,) summita-  
tibus etiam erectis, iv. 7.

ΕΛΕΒΟΡΟΣ. }  
ΕΛΛΕΒΟΡΟΣ. }

*Polyandr.*

Amat loca frigida, iv. 6. pl. ναρθηκωδης, (caule fistuloso,) cum



Conio, Fœniculo, &c. vi. 2. odor radicis gravis stomacho etiam in effodiendo, qua de causa Cepam prius comedunt, ix. 9. Spec. duæ: 1. E. μελας. 2. E. λευκος, quæ vel colore radicum vel foliorum differunt. Sp. prioris fol. δαφνωδη, “dark green;” posterioris πρασωδη, “light or grass green?” foliis *profunde incisis*; caule ανθερικωδει, (vid. ανθερικος,) brevissimo, ex corona radicis: επιγειοφυλλος, (fol. radicalibus,) radicibus plurimis λεπταις; in quibus vis narcotica. Sp. 1. E. μελας, communis. 2. E. λευκος, rara: maxime in M. Oeta, Ponto, Elea, Massalia; in vineis. Crescit item in M. Parnasso et in Ætolia, sed vires deteriores, ix. 11, 15.

**ΕΛΕΒΟΡΙΝΗ.***Gynandr.*

Ποαριον, (parvula species, herbofa,) foliis minimis; semen una cum succo Hellebori in usu ὅπως ευεμεση, (ut vomitum sine dolore ciat,) vii. 6. Nulla defer.

**ἙΛΕΙΟΣΕΛΙΝΟΝ.***Pentandr.*

Tres Σελινου species apud Theophr. l. vii. 6. Ἑλειοσελινον, Ἰπποσελινον, Ορεοσελινον, (vid.) Spec. hæc hab. in rivulis, vel ductibus aquæ, μανοφυλλος, (foliis raris,) Σελινου similis odore, succo, habitu, vii. 6. Semel occurrit.

**ἙΛΕΙΟΧΡΥΣΟΣ.***Class. incert.*

Pl. coronaria, cum Œnanthe, Anemone, &c. æstate media florens, vi. 7. foliis tenuibus albidis; flore aureo; semine tenui, duro, (σκληρω,) radicibus horizontalibus. Planta boni ominis apud antiquos, ix. 21.

**ΕΛΕΛΙΣΦΑΚΟΣ.***Diandr.*

Πωδης, (pl. herbacea,) inter non spinosas, quas difficile est distinguere, cum Origano, Thymbro, Cisto, &c. ponuntur Σφακος, Ελελίσφακος, vi. 1. Σφακος vel Σφακελος species culta; Ελελίσφακος spec. sylvestris, foliis magis scabris; odore graviori. (vid. Σφακος, Σφακελος,) vi. 2.

**ἙΛΕΝΙΟΝ.***Class. incert.*

Φρυγανον ξυλωδης, caule lignescente, foliis parvis, cum Sifym-

brio, Abrotano, et multis aliis, vi. 1. flore et foliis fragrantibus, ἄπλος τοις ειδεσιν, (nullæ occurrunt varietates?) vi. 6. Semina aiunt nunquam maturari Ελενίου, Ἐρπυλλοῦ, Σισυμβρίου, Μινθου, sed furculis plantas propagari, falso tamen, quia semen parvitate sua latet, vi. 7. radicibus multis, divaricatis, ταρρώδεσι, (implicatis corbis modo, vid. ταρρός) lignosis, ib.

## 1. ἘΛΙΞ.

*Pentandr.*

Περίαλλοκαυλος, (planta scandens,) θάμνωδης, cum Smilace occurrit, sine descriptione; videtur Hederæ varietas, vii. 8.

## 2. ἘΛΙΞ.

*Pentandr.*

Κίττου (Hederæ) tertia species; varietates maximæ occurrunt respectu magn. foliorum et formæ angulosæ: ἑλικος folia magis angulosa, et foliis τοῦ Κίττου familia; fructus rarus. Var. tres: 1. foliis læte viridibus. 2. foliis albis vel canis. 3. foliis variegatis. N. B. Hedera dicitur ἀποκίττουσθαι, quando per ætatem folia minus angulosa fiunt, iii. 18.

## ΕΛΥΜΟΣ.

*Triandr.*

Ελυμος, Κεγχρος, Σησαμον παρ' αὐτὰ, (divisio separata et habitu diversa a frumentaceis et leguminosis, σιτωδεσι καὶ χεδροποις,) viii. 1. grana Ελυμοῦ et Κεγχροῦ maxime durant, viii. 10.

## ΕΝΘΟΥΣΙΚΟΝ.

*Incertum.*

Semel occurrit in loco corrupto cum Caucalide et Ἡδυοσμῷ inter λαχανὰ inedulìa, vii. 7.

## ΕΠΙΜΕΝΙΑΔΕΙΟΣ. Vid. Σκυλλὰ.

## ΕΠΙΠΙΕΤΡΟΝ.

*Claff. incert.*

Ὅλως ἀνανθεις! Flores inconspicui Bot. Semel occurrit, vii. 8.

## ΕΡΕΒΙΝΘΟΣ.

*Diadelph.*

Leguminosus, viii. 1. οψισπορος, ib. πλαγιοκαυλος, (caule ramoso,) viii. 3. legumen rotundum, viii. 5. prominens hilum Bot. ex femine, ut in Vicia, Faba L. ib. Spec. tres: 1. Ε. μελας. 2. Ε. λευκος. 3. Ε. πυρρός, quorum posterior fero ferendus; in udis lo-



cis, viii. 6. omnium leguminosorum citissime fructum perficit, viii. 7. amat terram mollem, levem, (ψαφαρην) viii. 9. illæsus ver-  
mibus ob amaritudinem, viii. 10. N. B. Species occurrit sub no-  
mine Κερασβολον, ita dict. ob duritiem feminis. De Caul.  
Pl. iv.

**EPEIKH.***Octandr.*

Ακροκαρπος, (flores et femina in apicibus ramorum,) femel oc-  
currit, i. 23.

**EPINEOΣ.***Polygam.*

Sylvestris spec. της Συκης, i. 24. fed plane diversa, nec cultura  
mutans: accuratissime, Ficus enim genus Trioecium. Mutatio  
Ερινεου in Συκην dicitur portentofum esse, i. 4. Ερινεα προαπ-  
τωτα, (fructus sc. mas Ερινεου) comparantur amento Quercûs,  
Pinûs, &c. pullulat primo vere, iii. 6. Sexus Ερινεου et Συκης  
distinguitur, iv. 14. Lignum excellens ad εργα πολυτελη, v. 7.

**EPIOΦΟΡΑ.***Monadelph.*

Foliis vitis; Pericarpium εν ᾧ το εριον, (in quo goffypium con-  
tinetur,) ἡλικον μηλον εαρινον, (magnitudine mali verni,) συμμε-  
μυκος, (apice connivens,) ὅταν δε ωραιον η, (quando maturatur,)  
εκπεταννυται, (expanditur,) και εξαιρεται το εριον, (et aufertur  
goffypium.) N. B. Descriptio accurata admodum. Hab. India,  
Arabia, iv. 9.

**ΕΡΙΤΑΛΟΣ.***Didyn.*

Sempervirens, i. 15. φρυγανικος; caule lignoso, foliis parvis,  
vi. 1. Pl. coronaria, cum Ἐλενιω enumerata, ὡς ἅπλος τοις ειδεσιν  
etiam ὡς αγρια φυσις αυτου: floret maxime sine cultura. Hab.  
M. Hymetto, Athenis, &c. &c. montes totos operit, vi. 6, 7.  
Radix επιπολαιος, et in spatium longum repens, vi. 7. ταρῤῥωδης,  
(vid.) ξυλωδης, ib. Duæ spec: 1. E. ορεινη. 2. E. ευοσμος, apud  
sylvestres ολιγο-ὕδροτατος, ib.

**ΕΡΥΘΕΔΑΝΟΝ.***Tetrandr.*

Φρυγανικον, ανακανθες, (frutex inermis;) plures numerantur ge-  
nera, quæ sunt difficilia separari, ex habitu, et varietate foliorum;

vi. 1. radix rubra, vii. 9. foliis Ωχροῦ, Pifi *Ocbri* L. sed rotundioribus, κυκλιδόν (habitu verticillato, *Bot.*) caulis repens; vires diureticæ, ix. 14.

ΕΡΥΣΙΜΟΝ. *Tetradyn.*

Cum *Sesamo* enumeratur, foliis fine nervis, vel venis, viii. 3. caulis subfistulosus, ib. semen non comeditur crudum, utpote nec *Lupini*; spec. affinis *Σησαμου*, et oleo abundans, viii. 7.

ἙΣΠΕΡΙΣ.

Νυκτός οζει μάλλον, unde nomen. Desc. nulla. De C. Pl. vi.

ΕΤΥΜΟΔΡΥΣ. Vid. Δρυς. *Monæc.*

ΕΥΒΟΙΚΗ. Vid. Καρυα. *Monæc.*

ΕΥΖΩΜΟΝ. *Didynam.*

Cum *Ocymo* enumeratur, rad. lignosa, i. 9. επισπορος, (sp. fæpius ferenda in anno?) vii. 1. radix lignosa, vii. 3. semen durat, vii. 6.

ΕΥΗΠΙΑΤΟΝ. *Pentandr.*

Syn. Στρυχνου, (vid. Στρυχον,) vii. 7.

ΕΥΩΝΥΜΟΣ. *Class. incert.*

Arbor *Punicæ Granati* L. flore et foliis similis. Ex insula *Lesbo*; odor floris gravis, iii. 18.

## Z.

ΖΕΙΑ. *Triandr.*

Σιτωδης, (frumentacea, spec.) πρωισπορος, (primo sationis tempore ferenda,) viii. 1. multis et profundis radicibus; multicaulis: καρπός κουφοτατός, (spica maxime paleacea,) προσφιλης πασι τοις ζωοις, (pecoribus omnibus gratissima,) viii. 9.

ΖΥΓΙΑ. *Monæc.*

Hab. montibus *Macedoniæ*, iii. 4. germinat ante equinoctium.



vernum, iii. 6. ευαυξης, (cito crescit,) iii. 7. hyeme cæditur, v. 1. lign. σκληρον, (durum, fragile,) v. 4.

## H.

ἩΔΥΟΣΜΟΣ. *Class. incert.*

Cum Ενδουσικῶ femel occurrit, vii. 7.

ἩΛΙΟΤΡΟΠION. *Pentandr.*

Επετειοκαυλος, (caule quotannis sese renovante,) vii. 8. successive floret, vii. 9. sempervirens, vii. 10. flos ακολουθει τα ασρα, (annon το ασρον Solem?) inde nomen.

ἩΜΙΟΝΟΣ ἡ. *Cryptog.*

Φυλλοις σκολοπενδρου, (pinnis sc. dense stipatis utrinque, ut Scolopendri pedes?) radix tenuis: vires in morbis splenis, ix. 19.

ἩΡΑΚΛΕΩΤΙΚΗ. *Monœc.*

Foliis εντομας (ferraturas) εχων cum Πτελεα, i. 16. Julifera arbor, iii. 7, 8. Sp. duæ: 1. H. αγρια, *Corylus Avellana* L. φυλλοις κεχαραγμενοις, (ferratis;) καρπιμωτερος, κατακοπτομενος τας ραβδους· καρπος στρογγυλος· πολυκαρπος, εν ταις φοραις· ραβδοις ανευ μασχαλων, (furculis simplicibus, non ramosis.) Sp. 2. H. ἡμερα, καρυῶ προμακρῶ, εκλευκοτερῶ, (pulvere sc. farinaceo ad bafin nucis,) *Corylus Colurna* L. Ang. “Filbert,” iii. 15. φλοιῷ ιδίας σιγµας λευκας εχοντι. N. B. Optime de cortice maculato, Coryli, ib.

ἩΡΑΚΛΕΙΑ. Vid. Μηκων. *Polyandr.*

ΗΡΙΓΕΡΩΝ. *Syngen.*

Pl. κιχωριωδης: inter λαχανα, αρουραια vocata, foliis Cichorii, vii. 7. floret longum tempus, primo vere εκκαυλει, και ανθει· ορθοκαυλος και νευροκαυλος, vii. 8.



## ΘΑΨΙΑ.

*Pentand.*

Planta venenosa; odor idcirco vitandus in colligendo, ix. 9. vires medicinales in radice et succo; pars radice dicitur vomitum ciere, pars alia purgare alvum; foliis Fæniculi, sed amplioribus; caule fistuloso; radice alba, ix. 10. emetica; succus ὑπωπιας αἰρει, (fugillationes.) Hab. Attica.

## ΘΕΡΜΟΣ.

*Diadelph.*

Annon dantur sylvestres et cultæ species? i. 6. enumeratur cum Capparide, ib. semen εν ὕλῃ βαθεῖα, (in densa materie, remotum a terra,) radicem emittit et germinat, i. 12. non eget cultura; cum Capparide et Σιλφίω, iii. 3. immediate ex ἄλῳ ferendum, viii. 1. βλαστανει (το σπέρμα) εκ του αυτου, (radiculam, et plumulam, Bot. ex eodem puncto profert. Vid. Monocotyled. Bot.) viii. 2. semen inedule fine coctione? viii. 7. semen durat, viii. 10. De Cauf. Pl. iii. 4.

## ΘΗΛΥΚΡΑΝΕΙΑ.

*Tetrandr.*

Hab. in Macedoniæ montibus, iii. 4. germinat προ Ζεφυρου, (vere primo?) iii. 6. differt a Κρανεία μαλακοτητι foliorum, cavitate ligni medullari, et fructûs magnitudine: plures baccæ ex communi pediculo umbellatim dispositæ, inedules, (vid. Κρανεία,) radices validi, iii. ουκ οζωδεις, ὡς κρανείας, i. 13.

## ΘΗΛΥΠΤΕΡΙΣ.

*Cryptog.*

Φυλλον μονοκωλον, (simplex, sine lobis, Bot.) radix magna, nigra; remedium vermifugum, præcipue adversus tænias, vino vel melle sumptum, ix. 20.

ΘΗΛΥΦΟΝΟΝ. Vid. Σχορπιον.

## ΘΗΣΕΙΟΝ.

*Class. incert.*

Radix gustu amara; alvum solvit; enumeratur cum Aro, Dracontio, et Xiphio, vii. 11.



**ΘΡΑΥΠΑΛΟΣ.** *Pentandr.*

Radix επιπολαιότη, (forfan quia crescit in udis?) enumeratur cum Κοκκυμηλεα et Σποδια, iii. 7. radices numerosæ; amat maxime umbrosa loca, iv. 1. una cum Taxo et Pado.

**ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ.** *Syngen.*

Caulis foliosus, i. 16. succus ὕδαρης, i. 19. επισπορος (spec. culta; bis, vel sæpius ferenda,) vii. 1. παπποσπερμος, (femine papposo Bot.) Spec. duæ: 1. θρ. λευκη. 2. θρ. μελαινα, quarum prior γλυκυτερα, απαλωτερα, vii. 4. Cultæ var. θρ. λευκης tres, ib.

1. θρ. πλατυκαυλος.
2. θρ. σρογγυκαυλος.
3. θρ. Λακωνικος.

Caules prioris latissimi adeo ut θυραις κηπίωρικαῖς inferviant. Spec. tertix folia σκολυμου. Var. Θριδακινης μελαινης respectu foliorum, ib.

1. θρ. πυκνοφυλλος.
2. θρ. ουλοφυλλος.
3. θρ. δασυφυλλος.
4. θρ. μανοφυλλος.

Respectu caulis, ib.

1. λευκοκαυλος.
2. πορφυροκαυλος.
3. ποικιλοκαυλος.

N. B. Infectum Πρασσοκουρις dict. Θριδακινη proprium, vii. 5.

**ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ ΑΓΡΙΑ.** *Syngen.*

Φυλλοῖς βραχυτεροῖς, caulis per maturitatem ἀκανθουται, (spinofus fit,) succus austerus, medicinalis; habitat inter fegetes. Ufus in hydropē levando, et in morbis oculorum, vii. 6.

**ΘΡΙΔΑΞ.** *Syngen.*

Differentia in caulibus παλιβλαστοῖς, (vid.) vii. 2. βραχυρρίζα, vii. 3. melius ex femine, (ου μεταφυτευθεισα,) vii. 5. papposo femine, vii. 3. Forfan fyn. Θριδακινης αγριας.

**ΘΡΥΑΛΛΙΣ.** *Pentandr.*

Inter ἀνθουντας κατα μέρος, (quæ in spica vel thyrsō florent

successive,) cum Plantagine enumeratur, et semel occurrit sine descriptione, vii. 10.

ΘΥΙΑ. }  
ΘΥΙΟΝ. } *Monæc.*

Sempervirens, i. 15. οψικαρπότερος παντων, iii. 6. cum Taxo, ib. Hab. in cacuminibus montis, iv. 1. habitus Cupressi; foliis, ramis, trunco; etiam fructu: frequens in Cyrenæa, regione prope Ammonis templum: lignum incorruptibile; radicis præcipue, ex qua simulacra et alia pretiosa, v. 5.

ΘΥΜΒΡΑ. }  
ΘΥΜΒΡΟΝ. } *Didynam.*

Succus δριμυς, (astringens, pungens,) i. 19. Inter perennes, ανακανθους, (sine spinis,) cum Origano, Thymo, &c. vi. 1. differt a Thymo, ότι σπέρμα έχει φανερον, abfimile Θυμω, (sed hic error notandus, ambo enim gymnospermæ, sed Thymi femina minutissima,) vi. 2. Seritur τριτω αροτω mense Maio, vii. 1. Semina durant, vii. 6.

ΘΥΜΟΝ. *Didynam.*

Succus similis Thymbræ δριμυς, i. 19. semen invisibile, (ώς ανθος μονον,) iii. 2. Frequentissime in desertis Libyæ, iv. 4. Spec. duæ: 1. Thymus alba; 2. nigra: ambo floribus luxuriant æstate: flores apibus gratissimi: semen minimum, calycibus occultatum, vi. 2.

ΘΥΜΟΝ ΛΙΘΟΕΙΔΕΣ. *Coral.*

iv. 8.

## I.

ΙΑΣΙΩΝΗ. *Pentandr.*

Monopetala: ανθος διαγραφην εχον, μονον ον, των πλειονων, (etfi flos monopetalus fit, expansionem habet floris polypetali Bot.) i. 21.



ΙΔΑΙΑ. Vid. Αμπελος.

ΙΔΑΙΑ. Vid. Πευκη.

ΙΚΜΗ. }  
ΙΚΑΜΗ. } *Class. incert.*

Planta palustris in lacu Orchomeni, cujus descriptio nulla, iv. 11.

ΙΞΙΑ. *Diæcia.*

In trunco Quercûs, iii. 9. amat Boreale latus, iii. 15. Spec. gummosa, ix. 1. De C. Pl. ii. 5.

ΙΞΙΝΗ. *Class. incert.*

Forſan Cardui ſp. ſic dicta, vi. 3. ῥιζοφυλλος, (radicem ex folio agens,) et ex folii medio ακανον, (pericarpium ſpinoſum, vid. ακανος) producens, magnitudine mali, foliis involutum, vi. 4. Gummi Maſtiche ex caule, ix. 1.

ΙΟΝ. *Syngen.*

Sempervirens, i. 15. Spec. duæ: 1. Ιον λευκον. 2. Ιον μελαν, vi. 6. Ιον μελαν, ſæpe uno verbo Μελανιον, differt ab Ιω λευκω, ὅτι πλατυφυλλον, εγγειοφυλλον και ſαρκοφυλλον εſτι, ib. ευοσμοτερον τε λευκου, ib. item vi. 7. N. B. Vid. infr. Ιωνια.

ΊΠΠΟΝ. }  
ΊΠΝΟΝ. } *Class. incert.*

Planta palustris cum priore enumerata, et ex eodem lacu, ſed diverſa. N. B. Si ex nomine Ίππος conjicere liceat, forſan Hippuris, vel Equiſetum L. ambo fluviatiles.

ΊΠΠΟΜΑΝΗΣ. Syn. Τιθυμαλλου. ix. 15.

ΊΠΠΟΜΑΡΑΘΡΟΝ. *Pentandr.*

Ναρθηκωδες, νευροκαυλον, (caule fiſtuloſo, ſtriato,) ſemel occurrit, vi. 1.

**ἵΠΠΟΣΕΛΙΝΟΝ.** *Pentandr.*

Sempervirens, i. 15. radix carnosâ, vii. 3. magnitudine differt ab ἑΛΕΙΟΣΕΛΙΝῳ: caulis maximus; radix magnitudine Rhaphani *sativi*, nigra: femina nigra familia Οροῦου, sed majora; folia familia ἑΛΕΙΟΣΕΛΙΝΟΥ, δασέα, &c. (pubescentia) vires diureticæ, vii. 6. succus gummosus in radice, ut Scammonia, ix. 1.

<b>ἵΠΠΟΦΕΩΣ.</b>	} <i>Tetrandr.</i>
<b>ἵΠΠΟΦΥΟΝ.</b>	

Planta spinosa, cum Τριβόλῳ, Ονωνιδί, vi. 3, 4. Vid. Φεως, etiam φουσεος ακανθικης et desc. vi. 3. differt a φλεως. Vid. *Triandr.*

**ΙΡΙΣ.** *Triandr.*

Æstate floret, vi. 7. cum Ασφοδελῳ enumeratur; folio καλαμωδεσερῳ, (angustiore et rigidior?) καυλῳ ανδρους μονον (pl. acaulis, scapo prædita *Bot.*) sed minore et rigidior; radix optima, suaveolens, iv. 6. ix. 7.

**ΙΣΧΑΙΜΟΣ.** *Polygam.*

Ex India; spec. cujus vires stypticæ mirabiles. Def. nulla, ix. 15.

**ΙΣΧΑΣ.** *Class. incert.*

Plant. pharmaceutica: radix emetica et cathartica, cum Θαψία enumeratur; foliis rutaceis, parvis; caulibus repentibus 3. vel 4. radice Asphodeli, sed λεπυρωδε, (tunicata.) Hab. in montosis et calcareis locis, ix. 10.

**ΙΤΕΑ.** *Diæcia.*

In paludosis, i. 17. (βραχυσελεχης) lign. leve, i. 8. βλαστανει απο παρασπαδων, (furculos emittit,) iii. 1. ωλεσικαρπος, (femina copiosissime per aerem spargens. Hom. II. vid. ωλεσικαρπος) iii. 2. πρωιβλαστος, (primo vere germinans,) iii. 6. ευαυξης, (cito crescens,) iii. 7. πολυειδης (var. plurimæ.) 1. I. μελας, cortice subnigro, φοινικῳ, (atro rufo.) 2. I. λευκη, cortice albo. 3. I. ἐλικη apud Arcades καρπῳ γονιμῳ, (opponitur ωλεσικαρπῳ, sc. fructum immaturum spargens, secundum Theophr.) iii. 13. spec. peculiaris in Hæmo monte, iv. 7. In palude Orchomeni lacus, iv. 11. βραχυβιος, iv. 14. arbor succifera Philippis iterum fur-

rexit, iv. 19. scutis faciendis, opus textile sc. v. 8. sed et ex ligno ipso, quod *συμμυει πληγεν*, (quando perforatur coalescit,) v. 5.

ΙΦΤΟΝ. }  
ΙΦΤΣΟΝ. } *Didynam.*

Inter flores coronarios æstivos, cum Iride, Lychni, &c

ΙΨΟΣ. *Incertum.*

Omnium *οψιβλαστοτατος* cum Aria et *Τετραγωνια*, iii. 6. Semel occurrit.

ΙΩΝΙΑ. *Syngen.*

Spec. duæ: 1. *λευκη*, spec perennis annos tres durans, ætate *ελαττουμενη*, *λευκοτερη*, vi. 7. 2. *μελαινα ακλονητος* (non ramosa) *προσριζοφυλλος· αιφυλλος διολε φερων το ανθος*, (ex omni parte florens,) vi. 6. Vid. *Ιωνια* Lex. Theophr. N.B. Ex locis supradictis, ubi solummodo occurrit vox hæc, colligi potest vocem *Ιωνια* plantam ipsam æque ac violetum indicare. Vid. *Ροδωνια*, *Κριωνια*, Lex. Theophr.

## K.

ΚΑΔΥΤΑΣ. *Class. Incert.*

*Βοτανον Συριακον*, super truncis arborum. De C. Pl. ii.

ΚΑΚΤΟΣ. *Icosandr.*

Hab. in Sicilia solum; omnium maxime singularis planta; immediate ex radice emittit caulem peculiarem, *κακτον* vocatum, latum, densum, spinis obsitum; cocti hi et decorticati, edules sunt, et conservantur in *άλμη*, "brine." Ex cacto hoc alius affurgit caulis, vocatus *περνιξ*, edulis etiam; in quo fita est fructificatio spinosa, pappo involuta, Palmæ *εγκεφαλω* similis, quæ vocatur *σκαλια*, vi. 4.

ΚΑΛΑΜΟΣ. *Triandr.*

*Ινοφλοιος*, (cortice fibroso,) *μονολοπος*, (cortice simplici,) *γονατω-*



δης, (caule nodofo.) i. 8, 10. μητρα ὑμενωδης, (pars interior membranis divisa,) i. 9. radice fibrosa, i. 10. γωνιοφυλλος, (nervo acuto longitudinali prominente,) (vid. γωνια) i. 16. λοχμωδης, (vid.) cum Cypero, iv. 9. Species Calami quinque: 1. K. αυλητικος. 2. K. πλοκιμος. 3. K. χαρακιας. 4. K. ζευγιτης (affinis K. χαρακιας, si non idem, ex arefactione lacûs proveniens.) 5. K. βομ-  
 ξυκιας, qui omnium aridissimus, folio latiore, et magis cano, iv. 11. spica minore. Dissertatio de K. αυλητικῳ et methodo fistulas formandi, in hoc capite occurrit: optimi ex Cephiso flumine. Divisio alia: 1. K. πυκνος. 2. K. μανος. 3. K. κοιλος (συ-  
 ριγξ voc.) 4. K. σερεος, (πληρης.) 5. βραχυς. 6. ὑψηλος. 7. πα-  
 χυς. 8. λεπτος. 9. πολυφυλλος. 10. ολιγοφυλλος. 11. μονοφυλλος. 12. K. δοναξ, maxime communis spec. et maxime lignosa. 13. K. τοξικος, spec. peculiaris; arcubus, an potius sagittis proprius. 14. K. Λακωνικος (variegatus.) 15. K. επιγειος, spec. repens, folio fa-  
 ligno, ad spicula propria. Hab. fluvio Acefine, iv. 12. folia am-  
 plexicaulia, vi. 2.

ΚΑΛΑΜΟΣ. Σχοινος, (vid. Σχοινος,) ix. 7.

ΚΑΠΝΙΟΣ. Vid. Αμπελος.

ΚΑΠΠΑΡΙΣ. *Polyandria.*

Nunquam colitur, i. 6. iii. 3. foliis et caule spinosis, vi. 3. fo-  
 liis spinosis; radice simplici; caule repente: æstate florens in are-  
 nosis, vi. 5. επετειοκαυλος, (perennis,) vii. 8.

ΚΑΡΔΑΜΟΣ. }  
 ΚΑΡΔΑΜΟΝ. } *Tetradyn.*

Succus aufterus, i. 19. planta λαχανωδης, cum Ανηθῳ, Κοριανθῳ,  
 εν πρωτοις αροτοις (olera quæ feruntur hyemali solititio,) vii. 1.  
 genus simplex, vii. 4. semen durat, vii. 6.

ΚΑΡΔΑΜΩΜΟΝ. *Monandr.*

N. B. Planta forsan Καρδαμωμος: sed unguentum solum me-  
 moratur inter aromata, ix. 7.

## ΚΑΡΥΑ.

*Monæcia.*

Περσική. }  
 βασιλική. } Syn. Juglandis, *Regiæ*. L.  
 Ευβοϊκή. }

Ξυλον ασαπες, (incorruptum,) v. 5. item in aqua durans ; cum Οξύη, (Fago,) ib. item v. 8. optimum ad carbinationem, iii. 7. arbor non germinat ex apice furculorum ; fed εκ των πλαγιων προωδεται αυτο το ὑπαρχον, ὡσπερ και αυτο το σελεχος, (ex lateribus propelluntur incrementa, pari modo, ac in trunco evenit,) iii. 7. Carbones optimi ex ligno hujus arboris, v. 10. Fructus maturatur μετ' οπωρον, (ineunte hyeme,) iii. 6. το Καρυον pro nuce arboris ? iv. 6. Hab. Tmolo, et Olympo Myfio, ib.

## ΚΑΣΙΑ.

*Enneandr.*

Cum Σμυρνή et Ολιβανῶ, in Arabia ; spec. ramosissima ; ramulis parvis, fed latioribus Cinnamomo ; cortice fibroso ligno firmiter adhærenti : vires eadem cum Cinnamomo ; methodus singularis partem interiorem furculi destruendi, ope vermium, ix. 4.

## ΚΑΥΚΑΛΙΣ.

*Pentandr.*

Oleris genus ; semel cum Ανδρουαλία, Ὑποχοιριδι, &c. vocantur κικωρη, quia foliis similibus instruuntur ; desc. nulla.

ΚΕΑΝΩΘΟΣ. Vid. Ακανθα. *Syngen.*

Ῥίζα γονατωδης, (nodis abundans) εξ ἑκάστου γονατος ἀφίησι ανω βλαστον, κατω ῥιζαν ; fed non καλαμωδης, iv. 11.

## ΚΕΓΧΡΟΣ.

*Polygamia.*

Hymenosperrnus, cum Πύρρῳ, i. 18. ανωνυμος κοινή προσήγορία, (differens habitu, etfi cum σιτωδεσι conjunctus,) viii. 1. cum Ελυμῳ et Σησαμῳ, ib. feritur æstate ineunte, μη δυναμενος φερειν τον χειμωνα, ib. καυλος καλαμωδης, viii. 3. πολυκαρποτατος, (feminibus maxime abundans,) femina durant, viii. 10.

ΚΕΔΡΙΣ. }  
ΚΕΔΡΙΑ. }

*Diæcia.*

Θαμνωδης (fruticosus;) τι μικρον, ὃ ου δενδρουται, i. 15.

ΚΕΔΡΟΣ.

*Diæcia.*

Ξυλου φλοιος ασαρκης, i. 8. sempervirens, i. 15. foliis apice acuminatis, i. 16. radice superficiali, iii. 7. Gen. duo: Κ. λυκια. Κ. φοινικη. ambo fimiles Juniperi, fed differunt foliis magis pungentibus, et rigidis. Alii distinguunt ita. 1. Κεδρος. 2. Οξυκεδρος. Lign. incorruptum το πλειστον εγκαρδιον, (totum fere cor,) rubri coloris, *fragrans*; bacca flava, myrti magnitudine, *fragrans*, gustu dulcis; annum totum in arbore durans: trium annorum proventus simul in arbore, προπερυσινος, περυσινος, νεος: cortice Cypressi, fed magis scabro. Hab. in montosis, saxosis, iii. 12. in montibus Thraciæ, iv. 6. et Phryg. ib. εαν επικοπη το ακρον, φθειρεται, iv. 19. Statuæ fiebant ex ejus ligno, v. 5. Lignum minime ponderosum et ad navalia utile, v. 8. Cedri in Syria magnitudine tali, ut tres homines amplecti nequeant: long. 13 ulnarum, ex quo ενδεκηρης ναυς, (navis quindecim-remis,) an Cedr. *Libani* L. ? v. 9. οπος δακρυωδης, (succus refinofus.)

ΚΕΝΤΑΤΡΙΟΝ.

*Syngen.*

Succo amaro, cum Αψινθιω, i. 19. amat frigida loca, iv. 6. folia amara, fed utilia, vii. 9.

ΚΕΝΤΑΤΡΙΣ ΤΡΙΟΡΧΙΣ. *Class. incert.*

Planta spinis venenosis, ut videtur, ix. 9.

ΚΕΝΤΑΤΡΙΣ.

An idem cum Κενταυριω? radix crassa, pinguis, ix. 15.

ΚΕΝΘΗΡΙΑ.

*Class. incert.*

Syn. ατρακτυλιδις; (α κεντεω) οπος αιματωδης.

ΚΕΝΤΡΟΜΤΡΡΙΝΗ.

*Diæcia.*

Επιφυλλοκαρπος, (fructificatione super folium,) una cum Δαφνη Αλεξανδρεια; ambo Rusci L. iii. 17.



ΚΕΡΑΣΒΟΛΟΝ. Vid. Ερεβινδος.

ΚΕΡΑΣΟΣ. *Icosandr.*

Οροφουης, (procera arbor) μεγαλει μεγας· και γαρ εις τεσσαρας και εικοσι πηχεις, (sc. circumferentia ramorum,) circumferentia trunci ipsius διπηχυς: lignum durum valde; cortex similis Tiliæ et ad eisdem usus; methodus peculiaris decorticandi, adeo ut pars interior illæfa maneat, iii. 13. flos albus, Pyri similis, εκ μικρων ανδρων συγκειμενον, (umbella ex multis floribus, κηρωδης, (quorum superficies plana favi aperturas imitatur; vid. Lex. Theophr.) fructus rubri coloris, Diospyri similis; magn. Κυαμου, (Pifi antiquorum.) N. B. Italis “Maraschino?” (nucleus Διοσπυρου, σκληρος; Cerasi, μαλαχος.) Hab. in irriguis ad ripas fluvium, iii. 13. arbor gummosa, ix. 1.

ΚΕΡΚΙΣ. *Decandr.*

Arbor Populi albi similis canitie foliorum: folium Hederæ simile; αγωνιον εκ του αλλου, μερους? (vid. γωνια,) την δε μιαν, (γωνιαν,) venam sc. intermediam folii prominentem, (προμηκη,) color superioris et inferioris folii partis idem; pedunculis foliorum longis, tenuibus, unde folia inclinantur; cortex scaber, maculatus, iii. 14. N. B. Forſan ſpec. alia *Class. incert.*

ΚΕΡΩΝΙΑ. *Polygam.*

Fructus in filiqua, i. 18. fructificatio in apicibus, i. 23. arbor in Ionia ſic dicta; ex caudice ſummo fructificans; item ex apicibus, iv. 2.

ΚΗΛΑΣΤΡΟΝ. }  
ΚΥΛΑΣΤΡΟΝ. } *Pentandr.*

Frutex ſempervirens, i. 15. incultus, i. 6. in planis Macedoniæ, iii. 4. fructus ante hyemem decidit, iii. 6. amat frigida loca, iv. 1. cum Junipero; uſus ad baculos, “the Staff-tree,” Ang. v. 3.

ΚΗΡΙΝΘΟΝ. *Pentandr.*

Inter flores æſtivos cum Lychnide, et Diantho *Armeria*. Deſc. nulla, vi. 7.

KINNAMOMOS. *Enneandr.*

Hab. India, Arabia, Syria, iv. 6. Fruticosa species, ib. cum Olibano et Casia enumeratur, ix. 4. frutices ambo ramulis Viticis, *Agni casti* similibus; cortex furculorum optimus, ix. 5. inter aromata recensetur, ix. 7.

KISTOS. *Polyandr.*

*Φρύγανον ανακανθες*, (frutex inermis,) cum *Spiræa*, *Cneoro*, &c. vi. 1. Spec. duæ: *αρρήν. Ξηλυσ.* 1. folio majore, rigidiores, magis nitente; flore purpurascens, haud ab simili flore *Rosæ*, *caninæ*; *αμφω ασμοι*, vi. 2.

KITOS. *Pentandr.*

Frutex, i. 4. sempervirens, folia juniora angulosa; annosa, subrotunda, i. 15. pedunculis longis, ib. flos stamineus, i. 21. peculiari modo, i. 22. *δενδρoutai χαρακος παγουσης*, (si palum admoveas, brevi crescit sine fulcro.) (N. B. Hoc expertus sum,) ii. 1. bacca inedulis, iii. 6.

Genera 3: 1. K. λευκος. 2. K. μελας. 3. K. έλιξ. Spec. 1<sup>ma</sup>. baccis albis? 2<sup>da</sup>. foliis minoribus, fructu laxo corymbofo, vel in sphaeram collecto, (*κορυμβια dict.*) spec. secunda minus variat. spec. tertia (*έλιξ*) maxime ab aliis differt parvitate, et *ευρυθμια* foliorum, et raritate fructus; *ουκ αποκιττουται*, (non habitum amittit, vid.) Spec. Έλικος tres. 1. Έ. χλοερα, η ποωδης. 2. Έ. λευκη. 3. Έ. ποικιλη, vel Thracica. *Κιττος εκ των βλαστων αφησιν αι ριζας ανα μεσον των φυλλων, αις, ωςπερ ενδυεται τοις δενδροις, και τοις τειχοις*, (radiculæ caulinae,) bacca *Κιττου λευκου επιγλυκυσ*; *Κιττου μελανος, σφοδρα πικρος*, iii. 18. lign. *Θερμον*; opp. *ψυχρω*.

*Κιττου λευκου σπερμα προς το γονιμον ειναι*, (adversus sterilitatem,) ix. 19.

KIXΩPION.	}	<i>Syngen.</i>
KIXΩPH.		

Folia radicalia, i. 16. *λαχανον αρουραιον*, (cultā? an inter fetes?) vii. 7. vere caulescit et floret, vii. 8. *επικαυλοφυλλος, άματαις εκφυσεσι ακρεμόνικαις*, (simul ex divaricatione ramorum ad apices,) *εκφυει και τ' ανθος*, (flore[m] producit,) vii. 9. successive

floret, vii. 10. caulis magnus, ad apicem αποφυσειs emittens, radice magna, vii. 11.

## ΚΛΗΘΡΑ.

Monæc.

In humidis æque ac in aridis, i. 7. in planis Macedoniæ, iii. 4. quibusdam in locis ακαρπος, iii. 5. βλασανει μετα ζεφυρον, (fructificat autumnno,) iii. 6. cito crescit, iii. 7. Sp. simplex, sterilis; lignum molle, medulla intus; furculi tenues, cavi intus: folia Pyri, sed majora, et magis nervosa: cortex scaber; interior ruber, tinctorius: radices super terram, in aquosis, iii. 14. cum Salice, iv. 9.

## ΚΑΤΜΕΝΟΝ.

Diadelph.

Pl. medicinalis; καρπος colligendus primo mane πριν ήλιον επι-βαλλειν, ix. 9. radix ad abortiones, ix. 19.

## ΚΝΕΩΡΟΝ.

Octandr.

Frutex crassifolius, i. 16. ανακανθης cum Cisto, Spiræa, &c. vi. 8. Spec. duæ: 1. Κ. λευκον. 2. Κ. μελαν. Sp. 1<sup>ma</sup>. foliis coriaceis, oblongis, Oleæ foliis similibus. Planta humilis, fragrans. Sp. 2<sup>da</sup>. foliis Myricæ; habitus elatior, odor nullus: florent ambo æquinoctio autumnali: flos durat; radices magni; ramuli densi, vi. 2.

ΚΝΗΚΟΣ. }  
ΚΝΙΚΟΣ. }

Syngenes.

Flos femini infidet, i. 22. ακανθωδη φουσιν εχει, (in ceteris partibus spinosa est,) το δε σπερματικον, (ακανον, pericarpium) ουχ ομοιωs, (non similiter spinosum,) vi. 3. αποφυσειs εχει, (caulis supra ramosus,) ib. Spec. duæ: 1. Κ. αγρια. 2. Κ. ήμερα. Prioris etiam sp. duæ. 1<sup>ma</sup>. ευθυκαυλοτατη; adeo ut πηνιοιs (fufis) mulieribus inferviat; καρπω (pericarpio) magno, nigro, amaro. 2<sup>da</sup>. villosa, caule Sonchi; foliis procumbentibus, vi. 4.

## ΚΟΙΞ.

Monæc.

Καλαμοφυλλος, i. 16. Planta bulbosa; recte Κοιξ scribitur sed Ald. Lect. κυξ. forf. vox Ægyptia?



**KOKKOS KNIDIOS.** *Class. incert.*

Fructus rotundus, ruber, grano Piperis major, ισχυροτερος πολυ τη θερμότητι, adeo ut fuccus urat fauces: an Capficum, *baccatum*? ix. 22.

**KOKKYTPIA.** *Pentandr.*

Cum Arbuto et Andrachne enumeratur; foliis Ανδραχνης, δένδρον μικρον καρπος εκπαππουμενος, (fructificatione *rapposa*,) ιδιον τρυτο, (peculiare hoc est,) ουδ' αφ' ενός ακηκοαμεν αλλου δένδρου; recte, iii. 16.

**KOKKTMHΛEA.** *Icosandr.*

Fructus carnosus, i. 18. fuccus fructûs aquofus, i. 19. flos quinquepetalus, i. 21. superus, i. 22. radices super terram numerosæ, iii. 7. arbor maxima; Mespili habitu: πυρηνι σρογγυλω, (bacca rotunda,) floret vere; maturat fructum Octobri; arbor semper-virens. Hab. Thebais.

**KOLOKTNΘH.** *Monæc.*

Cum Cucumere enumeratur, fuccus υδαρης, (aquofus,) i. 19. flores superi, i. 22. semen pullulat 6 vel 7 diebus, vii. 1. βραχυρρίζα, vii. 3. varietates plurimæ; semina non durant longum tempus, vii. 6. inter culta enumeratur.

**KOLOYTEA.** *Diadelph.*

Sp. 1. Arbor filiquosa, i. 18. foliis εγγυθεν τοις της Ιτεας? ramosissima: ib. καρπος ελλοβος, ωσπερ τα χεδροπα λοβοις πλατεσι, ου σενοις, (i. e. secundum species diversas,) semine parvo, molliusculo; filiquis sparsis; arbor rara, iii. 14. Hab. M. Ida.

Sp. 2. Species peculiaris juxta Liparam. Arbor ευμεγεθης: semine in lobis magnitudine φακου, (Fabæ,) cujus usus in pecoribus faginandis mirus, et ideo feritur.

Sp. 3. fruticosa πολυμασχαλος, (vid.) foliis Lauri, sed rotundioribus, et Pyri *Mali* similibus; parte superiore viridibus; inferiore glaucis, venis multis, cortice Vitis, sine flore, vel fructu, sed solummodo καχρυι κορυνωδει. Desc. obscura, si non textus corruptus.

ΚΟΜΑΡΟΣ. }  
ΚΩΜΑΡΟΣ. }

*Decandr.*

Ῥήξιφλοιός, ὥς ἐκπιπτειν, (cortice lacerato, decidente,) i. 8. sempervirens, i. 15. φερεῖ μιμαικυλά ἐδωδιμα (fraga, sc.) Arb. med. magn. cortice tenui, instar Myricæ; folio inter Prinum et Laurum; floret Octobri; flores ἀπο μίας κρεμασρας, (ex uno pediculo penfili,) ἐπ' ἀκρον, βοτρυδον (in apice, racematim dispositi,) floris Myrti magn. ἀφυλλοὶ δέ, (sc. monophylli,) καὶ κοίλοι, ὥσπερ ὠν ἐκκεκολληµµενον, (ut ovum excavatum,) τὸ σοµα δὲ ἀνεωγµενον ὅταν δ' ἀπανθήσῃ, ἡ προσφυσις τετρύπηται, (flore delapso, fructus enascens stigmate perforatus,) τὸ δ' ἀπανθήσαν (fructificatio, flore delapso) λεπτον, ὥσπερ σφονδυλὸς περὶ ἀτρακτῶν, (ut verticillus circa fufum,) ἡ Καρνεῖος Δωρικός, (vid. καρν.) fructus ἐνιαυτῷ πεπαινεται ὥς ἐσυμβαινει ἅµα τοῦτον δ' εἶχειν, καὶ τὸν ἕτερον ἀνθεῖν; optime, iii. 16.

ΚΟΜΗ ἡ.

*Syngen.*

Radice fusiformi, Bot. gustu dulci: foliis Croci, sed longioribus: caule brevi; καλυκὶ μεγάλῳ, (perianthio magno,) πωγωνί ἐξ ἀκρου πολίῳ, (de capitulo papposo, unde nomen τραγοπωγων,) vii. 8.

ΚΟΝΤΖΑ.

*Syngen.*

Inter ποωδῆ ἀνακανθή cum Thymbra, Origano, &c. vi. 1. Spec. duæ: 1. Κ. ἀρρήν. 2. Κ. θηλεία. 1. foliis majoribus, caule amplo, (παχεί,) magis ramoso; flore speciosiore; odore pungenti. 2. foliis tenuioribus: habitus συνεσηκῶς, (compressus Bot.) odor βαρύς; adversus insecta utilis, vi. 2.

ΚΟΡΙΑΝΝΟΣ.

*Pentandr.*

Ποωδῆς· feritur cum Ἀνηθῷ καὶ Καρδαμῷ ἐν πρώταις ἀροτοῖς, (vid.) vii. 1. radix lignosa, γυμνοσπερµος, (vid.) vii. 3. genus simplex, vii. 4. semen durat, vii. 6.

ΚΟΡΟΝΟΠΟΤΣ.

*Tetrandr.*

Ἐπιγειοφυλλός, cum Anthemio, Anchusa, &c. vii. 9.

ΚΟΡΧΟΡΟΣ.

*Syngen.*

Inter λαχανα ἀῤρωτα· proverbialiter amarus, vii. 7.

## ΚΟΣΤΟΣ.

*Monandr.*

Inter aromata Indica, ix. 7.

## ΚΟΤΙΝΟΣ.

*Diandr.*

Sylvestres meliores, i. 7. κραδας in trunco generat, (vid.) κοιλο-  
τητες ιδιοι in trunco, i. 13. opp. Ελαια, i. 24. ii. 3. iv. 14. lign.  
densum album, v. 4. incorruptum, v. 5. aptum malleis, και τερε-  
τριαις πυρειας, (vid.) v. 9.

## ΚΟΨΙΜΟΣ ἥ.

*Class. incert.*

Affinis Κραταιγου· καρπω στρογγυλω. Vel spec. diversa, iii. 15.

## ΚΟΥΚΙΟΦΟΡΟΣ.

*Palma.*

Similis Φοινικι trunco et foliis; sed capite diviso, ραξδοις  
(spathis) brevibus, raris; fructus χειροπληθης, rotundus, flavus,  
gustu dulcis; non congregatim sed separatim; nucleo durissimo  
intus: lign. a Palma valde diversum: sc. non fibrosum, sed  
solidum ponderosum. Hab. Persia.

## ΚΡΑΝΕΙΑ.

*Tetrandr.*

Lign. durum, i. 9. in maribus nodosum, i. 13. in planis Ma-  
cedoniæ, iii. 4. Germinat προ ξεφυρου; fructum maturat περι τρο-  
πας Σερινας, iii. 6. cito crescit, iii. 7. Spec. duæ: 1. αρρήν. 2. Ση-  
λεια: habitu solum differentes, ambo foliis Amygdali, sed pinguio-  
ribus, et magis crassius; cortice tenui fibroso; trunco subgracili;  
οζοις similibus Viticis, Agni casti. Lign. Θηλυκρανειας molle, me-  
dulla intus nulla. Αρρήν ακαρπος; Θηλυκρανεια, καρπιμος, drupa  
edulis; nucleo intus, instar Olivæ, duro; fructus racemosus.  
N. B. Duæ certe species diversæ, et ita a Linneo enumerantur,  
vid.

## ΚΡΑΝΙΟΝ.

*Cryptog.*

Fungus; cum Hydno, i. 9.

## ΚΡΑΤΑΙΟΓΟΝΟΝ. }

## ΚΡΑΤΑΙΟΓΟΝΟΣ. }

*Didyn.*

Fructus solum numeratur inter roborativa; sine desc. N. B. Fa-  
bulosa forsan planta. Vires generativæ, ut nomen græcum denotat.  
Vid. Ger. em. ix. 19.



ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ. }  
 ΚΡΑΤΑΙΓΩΝ. } *Icosandr.*

Folio Mespili τετανω, (rigido; vid. τετανος) latiore, longiore; margine simplici, non ferrato; arbor mediæ magn. lign. subflavum, ποικιλον, (maculatum?) cortice Mespili: καρπω (drupa Bot.) σρογγυλω, simili Κοτινου, per maturitatem arefacto in arbore; et nigro, iii. 15.

ΚΡΙΘΗ. *Triandr.*

Πυκνορρίζα, i. 9. πρωϊσπορος, viii. 1. αναφυεται μονοφυλλα, (monocotyledon Bot.) viii. 2. maturat semen 40 dies post inflorescentiam, viii. 3. γυμνη, (non glumis involuta,) σοιχειωδης, (grana in ordine collocata,) sc. δισιχοι, τρισιχοι, &c. viii. 4. amat solum ψαφαρες (vid.) Κ. Ετεοκριδη. de C. Pl. iii.

ΚΡΙΝΟΝ. *Hexandr.*

Inter σεφανωτικά cum Narcisso: coloribus variant, item habitu; μονοκαυλα· δικαυλα σπανιως; sed in eodem scapo flos unicus, vel plures: radix ampla, σαρκωδης, (carnosa,) καρπος æque ac radix ad propagandum inserviens, vi. 6.

ΚΡΙΟΙ. *Diadelph.*

Κρ. οροξιαιοι var. Οροξου, viii. 5.

ΚΡΟΚΟΣ. *Triandr.*

Radix σαρκωδης, (bulbus non tunicatus?) i. 10, 11. foliis σενοις, (linearibus,) τριχοφυλλος, ευθυσ άμα τοις φυλλοις το ανθος (optime,) φιλει πατεισθαι, (conculcari,) vi. 6. Inter flores autumnales. Spec. duæ: 1. Κ. ορεινος, ευοσμος. 2. Κ. ήμερος. vi. 7. radix βαλανωδης, (glandiformis,) έμαλης, vii. 9. καυλω ανθους, (scapo Bot.) forsan Cr. aureus Fl. Græc. t. 35. var. Κρ. ορεινης. Inter aromata, ix. 7.

ΚΡΟΜΜΥΟΝ. *Hexandr.*

Bulbus tunicatus. i. 8. corticatus etiam, i. 10. folia radicalia, intus cava, i. 16. propagatur ex bulbis, vii. 2. ακροκαρπον, vii. 3.

Var. cultæ: 1. Κ. Σαρδιον. 2. Κνιδιον. 3. Σαμοθρακιον. 4. Σητανιον. 5. Σχιςον. 6. Ασκαλονικον. N. B. Posteriores tres dif-

ferunt ab aliis : n. 4. μικρον, et γλυκυ ευ μαλα. n. 5. κατω σχι-  
ζεται. n. 6. αγονος (bulbos non producit) επι ταις ριζαις, Allium  
*Schænoprasum*, Ang. "Cives," vii. 4. amat loca irrigua, iv. 5.  
λειοκαυλος, (vid.) iv. 8.

**ΚΡΟΤΩΝ.***Monœc.*

Folia junioris plantæ rotunda, senioris angulofa; contrarium  
evenit in Hedera, i. 16. annon Ricini spec. arborefcens. de C.  
Pl. ii.

**1. ΚΤΑΜΟΣ.***Gynandr.*

Species paludofa et fluviatilis. caulis 4 cubitos altus, magn.  
daçtyli; καλαμοειδης, mollis, non geniculatus διαφυσεσιν ενδον, (ca-  
vitatibus medullosis,) in apice caulis κωδια, (pericarpium,) παρο-  
μοια σφηκιω περιφερει, (vespæ nido,) και εν ἐκασω των κυτταρων,  
(in singulis cellulis,) κυαμος, (femen,) μικρον υπεραιρον αυτου, (le-  
viter supereminens in receptaculo,) feminum numerus circiter 30.  
Flos papaveraceus, coloris rosei, aquis innatat; folia ampla lo-  
ricæ Thettalicæ, similia; radix ampla; planta edulis. Hab. Æ-  
gypto.

**2. ΚΤΑΜΟΣ.***Diadelph.*

Πωδης, πολυχρονιος τη ανθησει, vii. 3. cum Ερεβινθω et  
Πισω, viii. 1. πρωισπορος, (vid.) Dicotyledon, viii. 2. foliis subro-  
tundis; caule lignoso; ramis ex lateribus: folus inter χεδροπα  
ορθοκαυλος, (optime,) viii. 3. corculum feminis Bot. prominens,  
viii. 5. ου ταχυ βλασanei, v. 10.

**ΚΥΚΑΣ.***Palma.*

Hab. Æthiopia; species θαμνωδης, truncis pluribus simul  
junctis ad basim: ραϋδοις (spathis?) cubitalibus: foliis latis, ωσπερ  
εκ δυοιν συγκειμενοις, (plicatis,) καρπω στρογγυλοτερω, μειζονι, ήττον  
γλυκει: maturatur anno tertio: ex his conficiuntur panes, ii. 8.

**ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΣ.***Pentandr.*

Bulbus cortice tectus, vii. 9. Vires medicæ in morbis pulmo-  
num; mulieribus εν προσθετοις; (vid.) adversus ulcera, και προς  
τω μεδυσκειν, (ad providendum adversus ebrietatem,) ix. 10.  
Desc. nulla.

## ΚΤΜΙΝΟΝ.

*Pentandr.*

Γυμνοσπερμον, cum Anetho ; semen *σεινον*, γραμμωδες, (lineare Bot.) δειν καταραν σπειραντας ! vii. 3. variat, vii. 4.

## ΚΥΝΟΡΟΔΟΝ.

*Icosandr.*

Το όλον φυτον ὁμοιον τοις Κυνοροδοις, iv. 5. syn. pr. Κυνοσῆατου vel Rosa, *canina* L.

## ΚΥΝΟΣΒΑΤΟΣ.

*Icosandr.*

Ορθοφυης, και ὑψος εχων, καρπω ὑπερυδρω ὁμοιω τῃ της ῥοδης, δεινδρου και θαμνου μεταξυ. Rosa, *Canina*, “Dog-rose, or Hip-tree,” Angl. Fructus κατ’ ανεμον colligendus ; ει μη κινδυνον ειναι των οφθαλμων ; anne ex filis quæ grana involvunt ; an spec. peculiaris, ix. 1.

## ΚΥΝΩΨ.

*Tetrandr.*

Pl. κιχωριωδης, cum Aphaca et Buprestii, vii. 8. βλασανει αμα τοις πρωτοις υετοις, ib. an diversus ab Αχυνωψ, vii. 10. Error, ut suspicor, textûs in hoc loco.

## ΚΥΠΑΡΙΤΤΟΣ.

*Monæc.*

Procera arbor, i. 8. radicibus horizontalibus, i. 9. *μονοσελεχης*, i. 14. sempervirens, i. 5. *σαρκοφυλλος*, i. 16. maxime in Ida, iii. 3. et in Cyrenaica, iv. 3. Creta, Lycia, Rhodo, iv. 6. ex ligno fiebant statuæ una cum Cedro, v. 5. Lign. incorruptum, ib.

## ΚΥΠΕΙΡΟΣ.

*Triandr.*

Cum Sparganio ἑμαλοτητι *ιδια*, (polita maxime,) radice fingulari, i. 10. *γωνιοφυλλος*, (vid. *γωνια*,) i. 16. planta locustris *λοχμωδης*, (vid.) iv. 9. In Lacu Orchomeni, iv. 11. radice maxime fingulari, sc. inæqualis magnitudinis ; pl. *δυσολεθρος*, ib.

## 1. ΚΥΤΙΣΟΣ.

*Diadelph.*

i. 9. lign. durissimum, arbor vivax, iv. 20. lignum Ebeni simile, colore excepto, v. 4.

## 2. ΚΥΤΙΣΟΣ.

*Diadelph.*

Species parasitica vel scandens, quæ plantas alias crescendo enecat : a quibusdam Cytifus Marantia dicta, Medicago, *arborea*, L. Semel occurrit, iv. 20.



ΚΩΜΑΚΟΣ. }  
 ΚΩΜΑΚΟΝ. } *Class. incert.*

Fructus et succus Κωμακου solum occurrit, ix. 7.

ΚΩΝΕΙΟΝ. *Pentandr.*

Caulis carnosus, i. 8. ναρθηκωδης, (fistulosus item,) vi. 2. οπος  
 lethalis, ix. 8. Hab. Sufis, ix. 15.

## Λ.

ΛΑΘΥΡΟΣ. *Diadelph.*

Inter χεδροπα: foliis longioribus, viii. 3. επιγειοκαυλος, (pl.  
 repens,) ib. femina obnoxia vermi, σκωληκι dicto, όταν υγρανθωσι,  
 viii. 10.

ΛΑΚΑΘΗ. *Icosandr.*

In planis Macedoniæ, iii. 4. Sine desc.

ΛΑΚΑΡΑ, vel Λευκαρά. *Class. incert.*

An idem cum præcedente? Arbor cito crescens, cum Φηγγω,  
 Αρκευθω, Σφενδαμνω, in udis crescens, iv. 7. Error forsan textus.

ΛΑΠΑΘΟΣ. }  
 ΛΑΠΑΘΟΝ. } *Hexandr.*

Caulis carnosus, i. 8. μονορριζος; pl. επισπορα: feminatur cum  
 Τευτλιω, Θριδακι &c. Spec. culta; an Rumex acetosa? vii. 1. radix  
 1½ ped. longa, vii. 2. carnosæ vel potius ξυλωδης, vii. 3. genus  
 simplex, vii. 4. crudæ inedules, vii. 7.

ΛΕΙΜΩΝΙΑ, Ανεμωνη.

Vid. Ανεμωνη, vi. 7.

1. ΛΕΙΡΙΟΝ, vel Ναρκισσος. *Hexandr.*

Foliis radicalibus, Asphodeli similibus, sed latioribus; scapo  
 nudo, viridi; flore spatha membranacea involuto in apice, vi. 7.  
 Floret vere.

2. ΛΕΙΠΙΟΝ. *Hexandr.*

Λειριον ἑτερον dict. planta autumnalis, cum Croco montano, vi. 7.

ΛΕΜΝΑ. *Monæc.*

Ὁ προσαγορευουσι Λεμνα. Spec. fluviatilis. Τοῦτο πλεον το καθ' ὕδατος ἐστίν, (aquis pars major supernatat,) sine desc. ut maxime omnium communis, iv. 11.

ΛΕΥΚΑΚΑΝΘΑ. *Syngen.*

Inter spinosas capitulo, (ἀκανῶ) inermi? vi. 6. foliis solummodo spinosis, ib.

ΛΕΥΚΗ. *Diæcia.*

Folia juniorum diversæ formæ a foliis seniorum, i. 16. σρεφε τα ὑπτια των φυλλων μετα τροπας, ib. Vid. Ελαια, p. 19. amat irrigua loca: propagatur ἀπο παρασπαδων, (vid.) vel καταπηγνυμενος, iii. 1. in planis Macedoniæ, iii. 4. πρωϊβλασος, iii. 6. in aquosis cito crescens, iii. 7. Spec. montana, iii. 10. cum Populo, cui affinis habitu; ἀνανδη ἀμφω, iii. 14. βραχυβιος, iv. 14. Historia mirabilis Λευκης εν Σταγειροις, εν τῷ Μουσείῳ, iv. 19.

ΛΕΥΚΟΙΟΝ. *Hexandr.*

Planta bulbosa cum Sisyrrinchio; bulbis rotundis, tunicatis, vii. 13. N. B. Λωτος λευκοιος, alia planta cum Anthemio enumerata, vii. 9. vid. Λωτος. Diadelph.

ΛΕΥΚΟΙΟΤ *ανθε δένδρον. Class. incert.*

Semel occurrit, iv. 9.

ΛΙΒΑΝΟΣ. *Class. incert.*

Ὅπως δακρυωδης; cum Cedro, Abiete, Pinu, ix. 1. An idem cum sequente?

1. ΛΙΒΑΝΩΤΟΣ.	}	<i>Class. incert.</i>
ΛΙΒΑΝΩΤΙΣ.		

Odorifera pl. ex India, Arabia, Syria, cum Σμυρνῇ, Casia, &c.

iv. 6. Gummi obtinetur post germinationem, ix. 2. in M. Arabum; arbor med. magn. ramosissima, folio Ἀπρις, sed minore; fature viridi, ut Πηγανου: φλοιος λειος, ὡς Δαφνης, ix. 4.

## 2. ΛΙΒΑΝΩΤΙΣ. *Pentandr.*

ix. 12. N. B. Libanoti spec. duæ: 1. Λ. καρπιμος. 2. Λ. ακαρπος. Prioris fructus in usu; posterioris, radix: fructus vocatur καχρυς.

1. Folio Ἑλεοσελινου, sed majore; caule cubitali; radice crassa, alba; odore Libanoti; fructus albus, scaber, oblongus.

2. Folio Θριδακινης amaræ, sed magis scabro; radice brevi, ix. 12.

## ΛΙΝΟΝ. *Pentandr.*

Φυλλα λιπαρα, (pinguia, nitentia,) viii. 7.

## ΛΙΝΟΣΠΑΡΤΟΝ. *Triandr.*

Cortex πολυλοπος, cum Tilia, Vite, &c. i. 8. (vid.)

## ΛΥΧΝΙΣ. *Decandr.*

Inter flores æstivos cum Diantho *Armeria*, *Lavandula*, &c. vi. 7.

## 1. ΛΩΤΟΣ. arb. *Polygam.*

Cortex trunci ασαρκος, cum Cedro et Cypressso, i. 8. medulla ligni dura, i. 9. lignum præ duritie enode, i. 13. Arbor in Libya frequens et optima, iv. 3. magnitudine Pyri; foliis εντομας εχουσι πρινωδεις, (marginibus ferratis,) lignum nigrum: fructus magn. Κυαμου, mutans colorem in maturando, ut uva; situ alternus, instar baccarum Myrti; dulcis gustu; cibus Lotophagorum. Species plures, iv. 4. lign. Ebena prox. v. 4. ex quo statuæ, v. 5.

## 2. ΛΩΤΟΣ. Nymphæa. *Polyandr.*

Caulis similis Ari, *Colocasia*, και οι πετασοι (folia, ita ex forma πετασου, vid. vocata,) ὡσαντως, πλην ελαττους, επιφύεται δ' ὁμοιως ὁ Λωτος τῷ τῆ Κυαμῆ, (error, ut suspicor, textûs: vid. ex desc. Κυαμῆ supr.) παραφύεται δε φυλλον μεγα παρ' ἑκάστου των κυαμων: flos albus, petalis angustis, liliaceis, dense stipatis, quæ cum fol occultatur intus sese inflectunt, et discum floris occultant, μετ' απανθησιν καταδυνει, iv. 10. inter aromat. ix. 7.



3. ΛΩΤΟΣ. herb. *Diadelph.*

Πωδης cum Picride et Anthemio, επικαυλοφυλλος, vii. 19. genera plura, quæ differunt caulibus, floribus, foliis. Qu. an Lotus Linn. vel Trifolium, *Melilotus* ejusdem, vii. 14.

## M.

ΜΑΓΥΔΑΡΙΣ. *Class. incert.*

Vox Ægyptia; cum Σιλφίω enumeratur. Vires medicæ in radicibus, i. 11.

ΜΑΛΑΧΗ. *Monadelph.*

Cultura δενδρεται, (Lavatera forsan arborea L.) i. 4. inter αρραιας quæ λαχανη vocantur: δει πυρωσεως, (igni coquatur necesse est,) cum Τευτλιδι et Λαπαθῳ, vii. 7. επετειοκαυλος, vii. 8.

ΜΑΛΙΝΑΘΑΛΛΗ. *Triandr.*

Foliis Cyperi; radix bulbosa, magnitudine Mespili, sine nucleo, vel cortice crasso; gustu dulcis; edulis, vel cocta in jure, vel in τραγημασι, (bellariis.) Hab. Ægypt. iv. 10.

ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ. *Pentandr.*

Ναρθηκωδης, cum Helleboro, vi. 2. Vires foliorum in ulceribus; radicis ad morbos cutaneos; succûs in podagra, ix. 10.

ΜΑΡΑΘΡΟΝ. *Pentandr.*

Γυμνοσπερμον, i. 18. vii. 3. succus fragrans, i. 19. ναρθηκωδες, (caule fistuloso,) νευροκαυλον, (striato,) vi. 1. cum Κωνειῳ et Mandragora, vi. 2.

ΜΕΛΑΜΠΤΡΟΣ Ποντικός. *Didynam.*

Crescit una cum Tritico, viii. 8.

ΜΕΛΑΝΙΟΝ. *Syngen.*

Vid. Ιον, Ιωνια. Inter σεφανωτικα πωδη, vi. 6. inter æstivos flores, cum Oenanthē, vi. 7.

## ΜΕΛΕΑ.

*Diand. et Polygam.*

Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. fructificat æstate, cum Σφενδαμνῳ, iii. 6. cito crescit, iii. 7. πυκνορρίζα, ib.

Spec. duæ : 1<sup>ma</sup>. Μ. ευμηκης. 2<sup>da</sup>. Μ. ταπεινότερα. iii. 11. folia amborum, φυλλορρόεντα ἀφ' ἑνὸς μίσχου, (pinnata, cum lobis decidentia,) φυλλα (lobi finguli) Lauri fimiles, apice acutiores, et margine ferrato, περι μίαν, οἶον κατὰ γόνυ, συζυγίαν, (ex adverso, pedunculo communi juncta,) τὰ φυλλα δὲ καθ' ἑκάστον πεφυκε, (lobi separatim producuntur,) συχῶν ισχυρῶν τῶν συζυγιῶν, (crebris paribus loborum,) ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῆς Οἰης. Fructus in lobo tenui compresso, φέρει δ' ἑτέρ' ἄλλα, οἶον βρυαῖ· ἑκάστα καθ' αὐτὸ σφαιροειδῆ, (sc. flores masculi,) τὰ μὲν περι τῶν καρπῶν· τὰ δ' ἀπηρτημένα πολυ, (valde distantia.) N. B. Fraxinus secundum Linn. floribus hermaphroditis et fœminis; apud Botánicos recentiores, ut Genus Diandrum.

1. Μ. ευμηκης· ξυλῶ, λευκῶ, εὐίνῳ, (vid.) ανοζοτέρῳ, σκληρῳ.

2. Μ. ταπεινότερα, ἥττον ευαυξῆς, ξυλῶ ξανδοτέρῳ τραχυτέρῳ.

N. B. Prior vocatur Βεμελία, Fl. Græca, fasc. 1.

## ΜΕΛΙΑΣ ΣΙΤΟΣ.

*Octandr.*

Inter ποωδῆ cum Loto L. femel occurrit; variat habitu secundum loca, vii. 14.

## ΜΕΛΙΑΩΤΟΣ.

*Diadelph.*

Enumeratur cum Loto; herba varians habitu secundum loca, vii. 14. de C. Pl. l. vi.

## ΜΕΛΙΝΟΣ.

*Triandr.*

Inter σιτωδῆ, cum Cenchro, viii. 3.

## ΜΕΛΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ.

*Polyandr.*

Inter ποωδεις ανακανθας, quæ foliis maxime differunt, cum Conyza, &c. vi. 1.

## ΜΕΣΠΙΛΗ.

*Icosandr.*

Spec. tres. 1. Μ. ανθηδων. 2. Μ. σητανειος. 3. Μ. ανθηδο-μοειδης.

1. Drupa major, luteo-alba, laxa, (χαυνα.)

2, 3. Drupa minore, saporis melioris, sed succo astringenti. Omnium flores amygdalini, albi; folia πολυσχιδη, (lobata,) και επ' ακρω σελινοειδη, μειζοσι σχημασι, τετανα, (divifuris σελινου, fed majoribus) περικεχαραγμενα όλον, (undique ferrata,) pedunculo tenui, longo: lign. firmum; folia rubescunt valde autumnno, iii. 12.

**ΜΗΔΙΚΗ.** *Diadelph.*

Μισοκοπρος, viii. 8.

**ΜΗΚΩΝ.** *Polyandr.*

Sempervirens, i. 15. Αγγειοσπερμος, 1. 18. succus spissus, (οπωδης,) i. 19.

**ΜΗΛΕΑ ΜΗΔΙΚΗ.** *Polyadelph.*

Ανθες ηλακατη, (pistillo Bot.) in medio, i. 22.

**ΜΗΛΕΑ ΠΕΡΣΙΚΗ.** *Polyadelph.* i. 22.

**ΜΗΛΕΑ.** *Icosandr.*

Arbor μονοσελεχης, (trunco simplici,) αγωγη μονον, ("by training,") i. 5. cortice lævi, i. 8. medulla carnosâ; ολιγορριζα και επιλολαιορριζα, i. 19. οζοι ὅμοιοι θηριων προσωποις, (in venis ligni, ut videtur? vel facie externa) εἰς μεγαῖσος και περι αυτον, πλειονες, i. 13. foliis carnofis, Pyri longioribus, i. 16. flos φυλλωδης, (polypetalus,) i. 21. flos superus, Bot. i. 22. fructificatio εκ των ἑνων κλαδων, (ex furculis prioris anni,) i. 23. varietates plurimæ, cultæ, i. 24. Spec. duæ, verna et ferotina, ii. 1. ferendo degenerat, ii. 3. προμοσχευεται επ' αυτων των δενδρων, (infitione propagatur,) ii. 7. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. οψιβλασος, ib. fructus maturatur ἅμα πρωτοις ψυχροις, iii. 6. Lignum vermibus minus obnoxium, iv. 16. Hab. Ponto, iv. 4.

**ΜΗΛΩΘΡΟΝ.** *Class. incert.*

Inter φρυγανα ανακανθα, cum Cisto; fine desc. vi. 1.

**ΜΗΝΙΑΝΘΕΣ.** *Pentandr.*

Palustre gen. in paludibus lacûs Orchomeni, iv. 11. fine desc.

**ΜΙΑΟΣ.** *Diæcia.*

In montibus Macedoniæ, iii. 4. οψιβλασος, iii. 6. magn.



maximæ, iii. 7. Genus simplex, foliis Ελατης, (Fir-tree,) πο-  
λυμασχαλος, (vid. μασχαλη,) lignum flavo-rubescens, totum  
cor; fructus ruber, Piso major, tener: folia equis lethalia; non ta-  
men pecoribus, iii. 10. amat umbrosa loca, iv. 1. lign. ad opera  
sculptilia, v. 8.

## ΜΙΝΘΑ.

*Didynam.*

Cum Sifymbrio et aliis, quorum folia et ramuli odoriferi,  
vi. 7.

## ΜΝΑΣΙΟΝ. }

## ΜΝΑΥΣΙΟΝ. }

*Class. incert.*

Pl. ποωδης, edulis, gustu dulcis: affinis Σαρι, iv. 9. N. B. Am-  
bo voces Ægyptiacæ.

## ΜΥΑΚΑΝΘΟΣ.

*Class. incert.* vi. 4.

## ΜΥΚΗΣ.

*Cryptog.*

Caulis όμαλης? forsan lævis et fungosus. Spec. Agarici, vel  
Boleti stipitati, cum Hydno, i. 8.

## ΜΥΚΗΣ λιθινος.

*Lithoph.*

Απολιθεται ύπο τς Ηλις. Hab. Mare Rubrum, iv. 8.

## ΜΥΟΦΟΝΟΝ.

*Class. incert.*

Caulis fistulosus, vi. 2. Μαραθρου affinis species, ib.

## ΜΥΡΙΚΗ.

*Diœcia.*

Sempervirens, i. 15. iii. 4. crassifolia, i. 16. N. B. Species ar-  
borea occurrit in insula Maris Rubri, Τυλος dict. v. 6.

## ΜΥΡΡΙΣ.

*Class. incert.*

Λαχανον ευσομον; enumeratur cum Anetho et Fœniculo; de  
C. Pl. vi.

## ΜΥΡΡΙΝΟΣ. }

## ΜΥΡΤΟΣ. }

*Icosandr.*

Frutex, i. 4. sempervirens, 1. 15. flores superi, Bot. i. 22. in

furculis anni prioris, i. 23. var. plurimæ, 1. 24. germinat εκ τῆς ἀκρὸς καὶ εκ τῶν πλαγιῶν, iii. 7. baccæ vinosæ. Spec. Μικρομυρτός dict. de C. Pl. vi.

ΜΩΛΥ.

*Hexandr.*

Radix bulbosa, instar Κρομμυς; foliis Scyllæ. Hab. M. Cyllenio, et ad Pheneum, ix. 15.

## N.

ΝΑΙΠΟΣ.

*Class. incert.*

Hinc fit unguentum ναιρον dict. ix. 7. Differt a Ναρδῳ, quia in eodem catalogo simul recensentur, ib.

ΝΑΠΥ.

*Tetradyn.*

Succus δριμυς, (austerus, pungens,) i. 19. spec. επισπορα, (vid.) vii. 1. ελλοβοσπερμον, (angiospermus,) cum Ραφανιδι καὶ Γογγυλιδι, vii. 3.

ΝΑΡΔΟΣ. }  
ΝΑΡΤΟΣ. }

*Polygam.*

Andropogonis spec. ex India : vid. Act. Soc. Reg. Londini 1790. Semel occurrit. Unguentum ναρτη dict. ix. 7.

ΝΑΡΘΗΞ.

*Pentandr.*

Pl. affinis Καλαμου, μητρὰ ὑμενωδει, (medulla caulis diffipimentis divisa,) caule fistuloso friato; μονοκαυλος, γονατωδης; foliis amplexicaulibus, πολυσχιδεσι, (profunde et multum divisis,) ὥς εἶναι τριχωδη, (linearia Bot.) Flores lutei, parvi, Anethi fimiles. Caulis ἐξ ἀκροῦ σχιζεται, (sursum ramosus est,) καρπὼ ἐν τοῖς παρακαυλίζουσι, (ramulis lateralibus?) radix fusiformis Bot. vi. 2.

ΝΑΡΘΗΚΤΙΑ.

*Pentandr.*

Affinis, sed minor, vi. 2.

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ.

*Hexandr.*

Affinis Λειριου; foliis radicalibus Asphodeli similibus, sed lati-

oribus ; καυλος (scapus) αφυλλος, ανθει εξ ακρου εν υμενι τινι, (spatha membranacea Bot.) καθαπερ εν αγγειω καρπος (pericarpium) magnum, oblongum ; radix carnosa, oblonga, vi. 6. floret vere primo cum Λειριω καυ Βολβοκωδιω, vi. 7. vii. 12.

## ΝΗΛΕΙΑ ?

Class. incert.

N. B. Semel occurrit. Suspicio ibi legendum pro Ανδραχνη, Νηλεια ; Ανδραχνη ελεια ; A. paludosa, i. 8.

## ΝΗΠΕΝΘΕΣ.

Class. incert.

Nomen Poeticum, ut videtur : Plantæ narcoticæ, forsan Papaveris, somniferi Linn. Hab. Τυρρηνια, ix. 15.

## ΝΥΜΦΑΙΑ.

Polyandr.

Succus dulcis : hab. in lacubus et aquosis Orchomeni, Creta, Bœotia &c. ab Ægyptiis Μαδωναϊν vocatur. Bulbus edulis ; folia rotunda, natantia ; vires stypticæ, ix. 13.

## Ξ.

ΞΕΙΡΙΣ. }  
ΞΙΡΙΣ. }

Triandr.

Vid. Ιρις, ix. 9. si non Genus diversum.

ΞΙΦΙΟΝ. }  
ΞΙΦΟΣ. }

Triandr.

Enumeratur cum Asphodelo : folia ensiformia ; radix bulbosa, vii. 12.

## Ο.

ΟΗ. }  
ΟΙΗ. }  
ΟΥΗ. }

Icosandr.

Fervori folis exposita ακαρπος γινεται, ii. 3. statu sylvestri fructus dulcior, iii. 3. επιπολαιοριζος, iii. 7. Spec. duæ : 1. Ο. αρ-



ῥην. 2. Ο. Θηλεια. Fructus variat figura, oblonga, ovata, rotunda ; folia pinnata ; flores in racemo, iii. 12.

## OINANΘΗ.

Hexandr.

Spec. ποωδης. Inter σεφανωτικά cum Ιωνια, Διος ανθει, Ἡμερο-καλλιδι, vi. 7.

## OINΑΡΟΣ ?

Class. incert.

Affinis Andrachnes, sempervirens, ramorum partibus inferioribus nudis, i. 15. Forsan legendum Ανδρ. οιναρως.

## OINOΘΗΡΑ.

Class. incert.

Foliis Amygdali, sed latioribus ; floribus rubris, vel rosaceis ; radice magna, rubra. Radix exficcata vinum olet, unde nomen, ix. 21. Hab. in montibus, ib.

## ΟΙΣΟΣ, vel Ισος.

Pentandr.

Spec. duæ: 1. Ο. μελας. 2. Ο. λευκος ; ita dict. a colore fructûs, iii. 17. foliis et ramulis tenuioribus, ib. N. B. In Cod. Aldini legitur Ισον.

## ΟΚΙΜΟΣ. }

## ΟΚΥΜΟΣ. }

Didyn.

Radix lignosa, i. 9. caulis foliosus, i. 16. inter επισπορα τριτοις αροτοις, (quæ feruntur ter in anno,) vii. 1. propagatur απο βλα-των, (" slips,") vii. 2. radix fusiformis, ib. floret successive ; τα κατω πρωτον, vii. 3. εμφλοισσπερμος, (vid.) vii. 3, 6.

## ΟΛΙΒΑΝΟΣ.

Class. incert.

Enumeratur inter plantas balsamiferas Arabiæ, ix. 4. Forsan legendum ὁ Λιβανος. Gummi vocatur Olibanum.

ΟΛΟΣΧΟΙΝΟΣ. vid. Σχοινος.

## ΟΛΥΡΑ.

Triandr.

Habitu Tritici, πρωϊσπορος, viii. 1. καρπος πολυλοπος, (femen

glumis numerosis tectum,) cum Τιφη, viii. 4. μαλακωτερα και ασθενεστερα Βρομου και Ζειας, viii. 9.

**ONOKIXΛΗΣ.** *Class. incert.*

Pl. ποωδης : cum Αφακη et Κιχωριω : floret fucceffive, vii. 10.

**ΟΝΩΝΙΣ.** *Diadelph.*

Caule spinoso, πορθακανθος, (spinis caulinis,) foliis πηγανωδεσι, (rutæformibus,) ὡςπερ σεφανου την ὀλην μορφην, (radiatim, coronæ ad instar,) flore papilionaceo; femine lobato, lobis sine dissepimento, Bot. N. B. Planta Agricolis infesta, vi. 1, 4, 5.

**ΟΞΥΑ.** *Monæc.*

Λεπτορριζος, iii. 7. cortex lævis; truncus enodis: lignum ευχρουν, (bene coloratum,) firmum, venosum; folia indivisa, apice acuminata, (unde forsan nomen,) fructus lævis, βαλανωδης· εν εχινω, (pericarpio setaceo,) πλην ουχ ὡς Διος βαλανος, (non aculeis; aut non æque rigidis ac Fagi, Castaneæ,) iii. 10. ξυλον ὑγροτατον, cujus usus εις κλιναρια ενδιδοντα, (lectulos elasticos?) v. 8.

**ΟΞΥΑΚΑΝΘΑ.** *Icosandr.*

Sempervirens i. 15. hab. in planis Macedoniæ; floret primo vere; fructum maturat προς Πλειαδων δυσιν, iii. baccæ speciosæ, et in fertis usitata, vi. 7.

**ΟΠΟΒΑΔΣΑΜΟΝ.** *Class. incert.*

Cum Libanoto, Smyrna, &c. iv. 6. N. B. Forfan vox composita ex οπος (succus) et βαλσαμον. Vid. Βαλσαμον.

**ΟΡΕΟΣΕΛΙΝΟΝ.** *Pentand.*

Differt ab Ἰπποσελινω et Ἐλειοσελινω, foliis similibus Κωνειου; radice tenui; fructu Anethi simili, vii. 6.

**ΟΡΙΓΑΝΟΣ.** *Didyn.*

Sempervirens, i. 15. succus δριμυς, (acris, astringens,) i. 19. ποωδης, ανακανθος, vi. 1.

Spec. duæ : 1. Ο. λευκη, καρπιμη.  
2. Ο. μελαινα, ακαρπος.

Semen germinat 30 diebus, vii. 1. propagatur etiam a ramulis, vii. 2.

‘OPMHNON. }  
‘OPMINON. } *Diandr.*

Seritur vere cum Cenchro, &c. viii. 1. semen nigrum Cumini simile, amarum, viii. 7.

ΟΡΟΒΑΓΧΗ. *Class. incert.*

Φθειρει Οροβους δια το περιπλεκεσθαι, (circumvolvendo suffocat;) ut spec. quædam herbaceæ scandentes, sc. Polyganum, Fumaria, &c. Semel occurrit. de C. Pl. l. v.

ΟΡΟΒΟΣ. *Diadelph.*

Pl. σιτωδης, leguminosa, οψισπερμος, viii. 1. femina proxime collocata in legumine, (συμφαυουσι αλληλους,) viii. 5.

N. B. Infecti species Φαλαγγιον dicta, Orobi peculiaris, viii. 10. Siliqua cylindrica, viii. 5.

ΟΡΟΒΙΑΙΟΙ ΚΡΙΟΙ. *Diadelph.*

Genus intermedium inter Ερεβινθον et Οροβον, viii. 5. nisi textus fit corruptus: hinc Linnei, Cicer, *Arietinum*, ib.

ΟΡΤΥΞ.

Syn. Αρνογλωσσου, vii. 10.

ΟΡΥΖΟΝ. *Hexandr.*

Pl. Indica, ζων πολυν χρονον εν υδατι, (diu sub aquis vivens,) εξ ου το εψημα, (juscum vel pulmentarium Indicum conficitur;) semen simile Ζειας, εν φοβη (gluma) bivalvi; valvula exteriori cava, (vid. annot. in Ελυμον,) iv. 5. non spicata, ut Κεγχρος.

ΟΡΧΙΣ. *Gynandr.*

Foliis Scillæ; radice duplici, bulbiformi: quorum major mas, minor fœmina vocatur, ix. 19.

ΟΣΤΡΥΑ. }  
ΟΣΤΡΥΙΣ. } *Monœc.*

Arbor trunco nodoso, i. 13. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4;



ευαυξής, iii. 7. affinis Fagi; folia Pyri fimilia, πολυῖνα, (costata, "ribbed,") semen parvum grano hordei simile: lignum durum, iii. 10.

ΟΥΗ. Vid. Οη, Ουη.

ΟΥΙΓΓΟΣ. *Class. incert.*

Fructu sub terra cum Arachidna, i. 1. radix magna carnosā; βλασος βραχυς (statura humilis,) καρπος (tuberculum) in deliciis apud Ægyptios, i. 11.

ΟΥΙΠΠΟΣ ? }  
ΟΥΙΤΤΟΣ ? } *Class. incert.*

Syn. prioris, i. 10. N. B. Pronuntiandum forsan Vingos, Vippos; voces Ægyptiacæ. Error textûs, ut videtur.

## II.

ΠΑΔΟΣ. *Icosandr.*

Umbra gaudet, ut Μίλος, iv. 1. Semel occurrit.

ΠΑΛΙΟΥΤΡΟΣ. *Pentandr.*

Frutex, i. 4. caule spinoso, i. 8. ramulis etiam spinosis, i. 16. Hab. in planis Macedoniæ, iii. 4. pullulat primo vere, iii. 6. καρπος εν λοξῳ τινι, (loculo quodam,) granis 3 vel 4; folia et λοβοι προς βηχας, (adversus tussēs,) iii. 17. optimi in Libya, iv. 3. folia Loti vel Cercidis fimilia: fructu rotundo, rubro, iv. 4. in paludosis, iv. 9, 13. cum Βατῳ, (πτορδακανθος,) vid. vi. 1.

ΠΑΝΑΚΕΑ. }  
ΠΑΝΑΚΕΣ. } *Pentandr. ix. 12, 15.*  
ΠΑΝΑΞ. }

Spec. tres: 1. π. Ασκληπειον.

2. π. Ἡρακλειον.

3. π. Χερωνειον.

π. 1. Foliis Θαψίας, crassis; caule nodoso: radice longa, simplicis; vires eadem, ac Θαψίας.

π. 2. Foliis latoribus; radice dactyli magn. δικρανη η τρικρανη, (bi- vel tri-cipiti,) succus pharmaceuticus, adv. ισραν νοσον, (Epilepsiam.)

π. 3. Foliis Λαπαθου hirsutis; flore aureo; radice longa, tenui, ix. 12.

Hab. Psophidi in saxosis. N. B. Παναξ forsan succus inspissatus.

### ΠΑΝΤΑΔΟΥΣΑ. *Class. incert.*

Planta spinosa cum Ononide, Tribulo: sine desc. vi. 4.

### ΠΑΠΥΡΟΣ. *Triandr.*

Planta aquatica in profundis fluvii Nili crescens, radice carpo-  
manūs magn. prælonga; caule (Παπυρος vocato) triquetro, 4 cu-  
bitos longo; κομη (panicula, Boi.) αχρεια, ασθενει καρπω ουδενι:  
usus varii; ad victum humanum, ad navigia, vela, vestimenta,  
stragula, funes, &c. iv. 9. ναρθηκωδης (fistulosus) modo peculiari,  
vi. 2.

### ΠΕΛΕΚΙΝΟΣ. *Diadelph.*

Species affinis Αφακης; ita dict. ex forma filiquæ πελεκεως  
simili, i. e. viii. 8.

### ΠΕΝΤΑΠΕΤΕΣ. } ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟΝ. } *Icosandr.*

Foliis Vitis, sed minoribus; caule tenui, repente; κνημαις  
πυκναις, (flexuris numerosis,) radice rubra, quadrangulari, ix. 14.

### ΠΕΠΕΡΙ. *Diandr.*

Spec. duæ: 1. fructu rotundo: κελυφει (pericarpio) σαρκωδει,  
ερυθρῳ. 2. fructu oblongo, nigro; feminibus papaveraceis.  
N. B. Ambo Σερμαντικα σφοδρα, ix. 22. Ufus in medicina cum  
Κωνειῳ, ib.

### ΠΕΡΔΙΚΙΟΝ. *Polygam.*

Genus herbaceum; radice magna, carnosa, fibris numerosis: affi-  
nis Σπαλακος et Κροκου, i. 11. N. B. Ita vocatur quia perdices  
amant εγκυλισθαι αυτω, ib. Nomen hodiernum Græc. Περδι-  
κακι, Fl. Græc. Prodrom.

## ΠΕΡΣΕΑ.

*Class. incert.*

Δενδρον μεγα και καλον εν Αιγυπτω, simile Pyri foliis et flore ; sempervirens, και πασαν ωραν καρπον πεπαινει, (fructus successive maturatur,) iv. 2. Enumeratur cum Συκαμινω, Βαλανω, Ακανθω, ib. fructus oblongus magn. Pyri, viridis, nucleo intus, saporis dulcis, et maxime salutaris. Lignum, ut Loti, nigrum, ib.

## ΠΕΡΣΙΚΑ μηλεα.

*Polyadelph.*

Foliis Ανδραχνης : spinis Απριου, vel Οξυακανθης, lævissimis tamen et prælongis. Pomum quod fert inedule, sed valde fragrans, utpote et folia, quæ, cum vestibus sint reposita, vermes arcent : fructus successive maturatur. N. B. Hab. Medea, Persia. Spec. altera Μηλεα Μηδικα dicta, iv. 4. N. B. Vid. Μηλεα Μηδικα, p. 49.

## ΠΕΡΣΙΚΑ ΚΑΡΥΑ. Vid. Καρυα.

## ΠΕΥΚΕΔΑΝΟΝ.

*Pentand.*

Pl. pharmaceutica : hab. in M. Pelio, Parnaffo, Laconia, Tegea, Clitoria, Telethrio, ix. 15. semen inutile ; sed succus in usu : Δερμαντικός valde, ix. 22.

## ΠΕΥΚΗ.

*Monœc.*

Sylvestris naturæ, i. 6. ορδοφυης, οζωδης, (vid. οζος,) i. 8, 13. μητρα ξυλωδης· μονορριζος, μια ριζα μεγαλη, μικραις δ' απο ταυτης πλειοσι· απαρθλαστικός, i. 9. sempervirens, i. 15. σπαδοφυλλος, (foliis basi vaginatis,) i. 16. apice pungentibus, ib. semina oleosa, succus resinofus, i. 19. propagatur solum ex femine, ii. 2. iii. 1. non degenerat ferendo, ii. 3. iii. 3, 4. Dubia res apud antiquos an flos ullus, sed κυτταρου (iuli, vel amenti, Bot.) mentio, iii. 6. etiam καχρυος, iii. 7. αποκοπεισα ου βλασανει, i. 8.

Spec. duæ : 1. π. αγρια.

2. π. ήμερα.

II. αγριας. Etiam varietates duæ.

1. π. Ιδαια.

2. π. Παραλιας.

1<sup>ma</sup>. Arbor procera magis et ampla.

2<sup>da</sup>. Foliis tenuioribus, cortice læviore : strobilo rotundiore, cito dehiscente, iii. 10. N. B. Var. alia ακαρπος dicta ab Arcadibus



Πιτυς, ib. Folia Πευκης αυχμωδη, πεφρικοτα, (arida, erecta,) lign. ad navium latera, v. 8. etiam ad carbonēs, v. 10. οπος δακρυωδης, ix. 1. ῥητινη optima, ix. 2.

### ΠΕΤΚΗ κωνοφορος.

iii. 10. de C. Pl. l. i. Spec. peculiaris ; forsan Pinus, *Cedrus* L.

### ΠΕΤΚΗΣ τι γενος. Monæc.

Spec. decidua, i. 15. N. B. In hoc capite Πευκης τι γενος (quædam species Pinûs) αειφυλλον : ergo datur species decidua. Pinus, *Larix* L.

### ΠΗΓΑΝΟΝ. Decand.

Δενδρολαχανον, i. 4. sempervirens, i. 15. propagatur απο βλα-  
των, (vid.) vii. 2. nullæ species, vii. 4. μισοκοπρος, vii. 5.

### ΠΙΚΡΙΣ. Syngen.

Πωδης, cum Anthemio et Cichorio ; επικαυλοφυλλος, vii. 9. floret per totam ætatem : fuccus gustu amarus valde, unde nomen, viii. 1.

### ΠΙΛΟΣ. Cryptog.

Σφαιριον εριωδες μαλακον, iii. 8.

### ΠΙΝΗ. Cryptog.

N. B. Πινη ut nomen generale Fungi. de Cauf. Pl. l. iii.

### ΠΙΣΟΣ. Diadelph.

Αρχη (principium germinationis in femine) εκ του αυτου, (sc. Corculum et Plumula, Bot. ex eodem puncto,) viii. 1. επιγειο-  
καυλος, foliis oblongis, viii. 3. λοξος αδιαφρακτος, (filiqua sine  
dissepimento, feminibus alternatim utrinque,) viii. 5. obnoxius  
vermi, σκωληκι, (vid.) viii. 10.

### ΠΙΤΥΣ. Monæc.

Μητρα ξυλωδης, i. 9. arbor sempervirens, i. 15. σπαθοφυλλος,  
(foliis 2 vel 3 basi vaginatis,) apice pungentibus, i. 16. femina

oleosa, i. 19. propagatur ex semine, ii. 2. non degenerat ferendo, ii. 3. arbor Julifera Bot. iii. 6, 7. succisa perit, iii. 8. folia instar Πευκης (vid. supr.) Conus minor, i. 10. Ufus ligni ad navium latera et carbones, v. 10. ῥήτινη (succus “Tar” dict.) εντομαῖς (incisionibus) extrahitur, ix. 1, 2. N. B. Πευκη κωνοφορος ita dicta forsan ex magn. Coni. Πιτυς φθειροφορος ex parvitate, ii. 3. de C. Pl. l. i.

**ΠΙΤΥΙΝΗ.***Class. incert.*

Περιολλοκαυλος, (planta scandens,) cum Ακαρινη, vii. 8.

**ΠΙΤΤΟΥΣΑ.****ΠΙΤΤΩΝ.***Class. incert.*

Inter βολεωδη cum Βολεινη, Σισυριγχιω &c. vii. 13.

**ΠΛΑΤΑΝΟΣ.***Monæc.*

In aquosis, i. 7. κραδαις (vid.) obnoxia; πλατοφυλλος, i. 16. βλασανει απο παρασπαδων, (“cuttings,”) iii. 1. πρωῖβλασος, iii. 6. arbor rara in Italia, iv. 7. et in Ægypto, iv. 9. Specimen celebre ab Agamemnone plantatum, iv. 14. cortice ablato non moritur, (N. B. Ipse expertus sum,) ib. Lign. ψυχρον, v. 4. ad τονρειας navium, (vid.) v. 8.

**ΠΟΑ.***Triandr.*

Pl. paludosa in Ægypto miræ fertilitatis, iv. 10.

**ΠΟΛΙΟΝ.***Class. incert.*

Σαρκοφυλλον, i. 16. sempervirens; cum Heliotropio enumeratur. N. B. Nomen ex canitie foliorum.

**ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΝ.***Cryptog.*

Radix hirsuta, habens κοτυληδονας, (tentacula,) ὥσπερ Πολυποδος πλεκταναι, (cirrhi,) ix. 14. folia Πτεριδος, (vid. infr. Πτερις) ου φυει σπερμα: sc. nudo oculo visibile, ix. 22.

**ΠΡΑΣΙΟΝ.***Didyn.*

Θαμνος πολυκλαδος, ὑποδασυς, (foliis sub-pubescentibus,) λευκος, (incanis,) foliis εντομας βαθειας (ferraturas profundas) εχουσι· ῥαβδοις τετραγωνοις· ανδρσιν εκ διασηματων επι των καυλων,

(floribus ad intervalla verticillatim dispositis,) vi. 1, 2. Var. duæ:  
1. π. ποωδης, foliis majoribus. 2. π. αυχμωδης, foliis minoribus,  
glaucis, ib.

**ΠΡΑΣΟΝ.** *Hexandr.*

Affinis Γηθου et Κρομμυου ; bulbis propagatur, vii. 1.

**ΠΡΑΣΟΝ ΠΟΝΤΙΟΝ.** *Cryptog.*

Πλατυφυλλον παλαισιαιον, θαυμασου μεγεθους, iv. 7.

**ΠΡΙΝΟΣ.** *Monæc.*

Μητρα σκληροτερα, i. 9. sempervirens, i. 15. foliis παρακανθι-  
ζουσι, (margine spinosis,) i. 16. Hab. montibus Macedoniæ, iii.  
4, 5. ενιαυτοφορος, iii. 6. βαθυριζοτατος, iii. 7. κοκκος (galla)  
rubra? iii. 8. cortex λειοτερος, (aliis) lign. compactum, tenax;  
fructus βαλανωδης, sed minor glande Quercûs; ὁ νεος περικα-  
ταλαμβανει τον ἐνον, (fructus recens prodit antequam fructus prio-  
ris anni deciderit,) φερει παρα την βαλανον κοκκον φοινικουν, (v.  
supr.) iii. 16. v. 7. lignum ad axes, et alia, v. 8.

**ΠΡΟΥΜΝΟΣ. }  
ΠΡΟΥΜΝΗ. } *Icosandr.***

Gummofa arbor, ix. 1. οπος δακρυωδης hujus arboris, cum Κε-  
ρασω et aliis, ib.

**ΠΤΕΛΕΑ.** *Pentandr.*

Truncus κραδαις (vid.) obnoxia, i. 13. σρεφονται τα ὑπτια των  
φυλλων μετα τροπας, i. 16. vid. Ελαια. Spec. φυλνδρα· βλασανει  
απο παρασπαδων, (furculos ex radicibus emittit,) iii. 1. Hab. in  
planis Macedoniæ, iii. 4. Ambigebatur de fructu Πτελεας, utpote  
et Salicis et Populi, iii. 6. πρωϊβλασος, ib. παρυδρα, και ευαυξης,  
iii. 7. præter folia fert βοτρυν, και θυλακωδες τι, (Perianthium  
monophyllum turbinatum Linn. G. Pl. 316.) primo vere, ante-  
quam folia prodeant. N. B. Θυλακος folliculus, iii. 3.

Spec duæ: 1. Πτελεα.

2. Ορειπτελεα.

ex loco natali. Folia Ulmi κεχαραγμενα ησυχη, (leviter ferrata),



τραχεα δε, και ου λιαν, (sub-aspera.) Arbor magna, ligno flavo, firmo, fibroso; γλισχρω (lento) totum cor; variis ufibus inferviens. Spec. sterilis, αλλ' εν κωρυκεσι, (id. q. θυλακοις;) το κομμι, και θηρια αττα κωνωποειδη, (vid. Κωνωψ,) τας δε καχρους ιδιας εχει πολλας, μικρας, μελαινας· εν δε ταις αλλαις χωραις ουκ επισκεπτεται, iii. 14. lignum ασραβεσατον, (vid.) ασαπες εν αερι, qu. v. 4, 5. ad cardines ligneos, v. 8. οπος δακρυωδης εν κωρυκεσι, ix. 1.

## ΠΤΕΡΙΣ.

*Cryptog.*

Μισοκοπρος· απολλυται δε επικοιμωμενων των προβατων, viii. 8. radix pulverifata adversus tæniam, ("tape-worm.") Hab. Ægyptia, Arabia, &c. ix. 22. Desc. nulla, sed nomen certe ex forma folii πτερυγα æmulante.

## ΠΥΓΟΣ?

*Class. incert.*

Semel occurrit, et, ut videtur, ex errore textûs, pro Φηγος. Enumeratur cum Πυξω, iii. 4.

## 1. ΠΥΞΟΣ.

*Monœc.*

Lign. ponderosum, i. 8. sine μητρα, i. 9. ανοζος, i. 13. semper-virens, i. 15. ευαυξης, iii. 4, 7. foliis Myrti, iii. 15. amat frigida et montuosa loca, ib. Flores abundant melle, sed pravi saporis, ib. Lign. in aqua subsidens, v. 4. utile ad statuas faciendas, v. 5. item εις αξονας, και ἐλκηθρα τοις αροτοις, (vid.) v. 8.

## 2. ΠΥΞΟΣ.

*Cryptog.*

Cum Μυκητι, (Agarico L.) Κρανιψ, (Lycoperdoni L.) i. 9.

## ΠΥΡΟΣ.

*Triandr.*

Caulis ινοφλοιος, (cuticula fibrosa,) i. 8. πυκνορριζος, i. 9. ενυμενισπερμος, (femen in gluma membranacea,) i. 18. mutatio fabulosa in Αιραν, ii. 5. πρωισπορος, viii. semen germinat ἐκατερον εξ ἐκατερου του ακρου, (Corculum ex uno apice, plumula ex altero Bot.) viii. 2. maturatur semen 40 dies μετ' απανθησιν, viii. 3. semen εν χιτωσι πολλοις, (glumis) σαχυσ ασοιχος, (opp. ordine regulari feminum in spica hordeacea,) viii. 11. Var. cultæ Triticæ hæ.

π. Λιβυκος.

π. Αλεξανδρειος.

π. Ποντικός.

π. Ασσυριος.

π. Θρακικός.

π. Αιγυπτίος.

π. Καρχηρυδίας.

π. Σικελικός.

N. B. π. Σικελικός omnium βαρυτάτος, viii. 4, 5. Grana Πυ-  
 ρου servantur 30 vel 40 annos.

## P.

ΠΑΜΝΟΣ ἥ.

*Pentandr.*

Fruticosa. Spec. duæ: 1. ῥ. λευκή. 2. ῥ. μελαινα; fructus co-  
 lore discrepantes: ambo spinosæ, iii. 17. αειφυλλος. de C. Pl. i.  
 Lignum durum ad εσχαραν πυρείας utile, (vid.) v. 10.

ΠΑΦΑΝΙΣ.

*Tetradyn.*

Δενδρου φύσιν ἔχων, i. 4. radix σαρκώδης, i. 9. vii. 3. corticata,  
 i. 10. inter λαχανα culta, cujus satio μετα τροπας χειμερίνας,  
 vii. 1. radix μια, μακρά, παχέα, ὀρθή, ἀποφύσσει μικραῖς, (radi-  
 culis lateralibus,) vii. 2. φλοιος ἀφαιρετός, (avulsu facilis,) ib.  
 caulis πλαγιοκαρπός, (fructum ferens in ramulis lateralibus,) vii.  
 3. Var. cultæ plurimæ.

1. ῥ. Καρινθία.

4. ῥ. Κλεωνία.

2. ῥ. Λειοθαλασσία.

5. ῥ. Ευζωμός.

3. ῥ. Βοιωτία.

N. 1. Ευαυξέσατης, ῥίζα γυμνή, i. e. ἐξω τῆς γῆς.

N. 2. Aliter λειοθαλασσία vel Θρακικά; var. ισχυρός adversum  
 hyemem.

N. 3. Radice orbiculari, succo dulci.

N. 4. Radice μακρά, (longa.)

N. 5. Foliis Ευζωμου.

N. B. Species, foliis lævioribus, dulciōres. vii. 4.

ΠΑΦΑΝΟΣ.

*Tetradyn.*

Μεγρορίζος, (sed non σαρκορίζος,) i. 9. sempervirens, i. 15.

σαρκοφυλλος, i. 16. αλλον τροπον σαρκωδης· εν πλατει, ουκ εν  
 ερογγυλοτητι, (folia carnosā, cum expansione,) ακροκαρπος, και  
 πλαγιοκαρπος, i. 23. odor noxius Viti, iv. 20. feritur μετα πρω-  
 τοις αροτοις, vii. 1. Var. tres.

1. ῥ. ουλοφυλλος.

2. ῥ. λειοφυλλος.

3. ῥ. αγρια.

Foliorum προσθεσις πλατεια, (ima pars pedunculi folii expan-  
 ditur, et caulem amplectitur,) vii. 6.

‘ΡΟΔΟΝ. }

‘ΡΟΔΩΝΙΑ. }

*Icosandr.*

Frutex sempervirens, i. 15. Flores superi Bot. i. 22. πτορδα-  
 κανθος, (ramis spinosis,) vi. 1. propagatur quandoque ex femine :  
 sæpius κατακοπτόντες τον καυλον εμφυτευουσι, vi. 6. Var. plu-  
 rimæ.

1. πενταφυλλα.

3. εικοσιφυλλα.

2. δωδεκαφυλλα.

4. εκατονταφυλλα.

‘ΡΟΔΟΥ ανθει δενδρον. *Class. incert.*

Arbor πολυφυλλος, flore Rosæ, nocte clauditur ; unde dicitur  
 καθευδειν, iv. 9.

‘ΡΟΙΑ. }

‘ΡΟΑ. }

*Icosandr.*

Arbor mediæ magn. cum Μηλεα, i. 4. βραχυσελεχης, i. 8.  
 μητρα σαρκωδης ; radices horizontales, i. 9. truncus parte supe-  
 riore major, i. 14. σενοφυλλος, i. 16. sapor fructus acidus, i. 19.  
 flores punicej, i. 21. superi, i. 22. floret in furculis prioris anni,  
 i. 22, 23. Pericarpium vel fructus, humidus, εχων τα ανω μυ-  
 χωδη, (de loculamentis Pericarpii. L. G. Pl. 618<sup>a</sup>.) Var. plurimæ.  
 Serendo degenerat, ii. 3. Germinat bis in anno, iii. 7. βραχυ-  
 σιος, iv. 14. πτορδακανθος statu sylvestri, vi. 1.

<sup>a</sup> Φανερωτατα δε τω κεχωρισθαι τα (περικαρπια) της ‘Ροιας, (de Pomo Puni-  
 sæ novemloculari L. G. Pl. 618.) i. 18.



ῬΟΥΣ.

*Pentandr.*

Spec. duæ: 1. ῤ. ἀρρήν. 2. ῤ. θηλεία. Folia amborum ὅμοια Πτελέας, sed longiora, pubescentia, των δε κλονιων των νεων εξ ισου τα φυλλα εις δυο, (foliis pinnatis per paria opposita,) καταληλα δε, (folia ipsa alterna,) βαπτουσι τειτοις οί σκυτοδεψικοι τα λευκα δερματα, (coriarii utuntur hisce ad coria depilanda,) ολιγορρίζος, επιπολαιορίζος. Lign. fine medulla, iii. 18.

ῬΥΤΤΡΟΣ.

*Claff. incert.*

Planta ακανθώδης, Κνικου affinis, ανωθεν αποφυσεις εχων, (vid. αποφυσεις,) femel occurrit, vi. 3.

Σ.

ΣΑΠΙ το. *Triandr.*

Vox Ægyptia: Pl. palustris, cum Παπυρω et Μνασιω; nascitur post Nili inundationem: radix dura, contorta; caulis (σαριον dict.) bicubitalis, magn. pollicaris, triqueter. Panicula laxa, instar Papyri: succus dulcis, manducando ab incolis expressus: radix ad carbonandum optima, iv. 9.

ΣΕΛΙΝΟΝ. *Pentandr.*

Sempervirens, i. 15. caulis foliosus, i. 16. ευωδης, i. 19. affinis Anethi et Fæniculi; radix fusiformis, i. 9. Planta herbacea, loca irrigua amans, iv. 9. feritur μεθ' ήλιου τροπας, δευτεροις αροτοις, (autumno,) femen δυσφουεσατον παντων, (tardissime germinans,) vii. 5. non transplantatur, ib.

ΣΕΣΕΛΙ.

*Pentandr.*

Enumeratur cum Aristolochia et Hippofelino: vires pharmaceuticæ. Hab. montibus Arcadiæ, Tegeæ, Clitoriae, Telethrii, ix. 15.

## ΣΗΜΥΔΑ.

Monæc.

Arbor mediæ magn. cum Alno: foliis Coryli, sed augustioribus: cortex verficolor: lignum leve ad baculos faciendos, iii. 14.

## ΣΗΣΑΜΟΝ.

Didyn.

Pericarpium peculiare, i. 18. Inter ανωνυμα κοινή προσήγορία cum Κεγχρω et Ελυμω, viii. 1. femen germinat cito; cum Eryfimo enumeratur, ut affinis, ανθει φυλλωδει, (flore monopetalo, in quo differt a Κεγχρω, cujus flos χνοωδης,) πολυκαρποτατος, viii. 3. femina non comeduntur cruda, viii. 7.

## ΣΙΔΗ.

Class. incert.

Species aquatica, ita vocata ex similitudine fructûs σιδιω, vel pomo Mali, granati. Pericarpium desc. ὡς κυτινωδες τι τοιουτον πλην μειζω, (vid. κυτινος,) μεγαθει δε ὅλος ὁ ογκος ἡλικον μηλον· φυλλοις ποωδεσι εξωθεν παραπλησια τοις των Ῥοδων, τετταρα τον αριθμον. Intus κοκκως ερυθρους εχει, rotundos, parvos; succus aquosus. Flos ὁμοιος Ῥοδου καλυκι, (q. an calyci?) sed duplo major, aquis innatans utpote et folium. Pericarpium maturum κατακλινει εις το ὕδωρ και συναπτει επι τη γη, unde femina germinant, iv. 11.

## ΣΙΚΤΑ.

Monæc.

Δενδρου ὕψος εχει, (sp. habitu valde luxurians et altissime scandens loco natali.) de C. Pl. l. v. Cum Σικυω, i. 22.

## ΣΙΚΤΟΣ.

Monæc.

Succus aquosus, i. 19. flores superi, l. 22. feritur æstate, vii. 1. femen germinat diebus sex, ib. βραχυριζος, (radicibus tenuibus,) floret longum tempus, και επιβλασανει, (ramulos novos profert,) vii. 3. Var. cultæ.

1. σ. Λακωνικη.

2. σ. Σκυταλεα.

3. σ. Βοιωτικη.

Irrigatione gaudet, vii. 4, 5. κονιορτω maturatur. Vid. κονιασις.  
de C. Pl. iii.

**ΣΙΚΤΟΣ** αγριος. *Monœc.*

Spec. perennis, vii. 10.

**ΣΙΑΦΙΟΝ.** *Pentandr.*

Radix magna, carnosâ, pharmaceutica, i. 11. sylvestr. naturæ,  
iii. 3. Hab. Cyrene, iv. 3. caulis fistulosus peculiari modo: habi-  
tus Papyri, vi. 2. radix cubitum longa: folia, μασπετα dict.  
Σελινου similia, sed majora: femina lata, φυλλωδη, (membrana  
cincta,) vii. 3. επετειοκαυλον, (perenne.) Vere comeditur salutis  
causa, cruda, vel cocta. Porcos mire faginat. Succus duplex re-  
spectu virium; caulinus et radicalis. Athenis in vasibus farinâ  
mixtus venditur. Hab. Libya περι την Συρτιν, ὑπ' Ευεσπεριδων,  
vi. 3. semen latum Ανδραφαξυος simile, membrana ad margines,  
vii. 3.

**ΣΙΣΥΜΒΡΙΟΝ.** *Tetrandr.*

Ανθος ἄπλον τοις ειδεσι, (foran unicolor, vel herbaceus,) enu-  
meratur cum Ἐρφυλλω et Ἐλενιω, vi. 6. raro provenit ex fe-  
mine, vi. 7.

**ΣΙΣΥΡΙΓΧΙΟΝ.** *Triandr.*

Enumeratur cum Asphodelo; folia radicalia, i. 16. Planta  
bulbosa, bulbis non tunicatis: affinis Leucojo, vii. 13.

**ΣΙΤΟΣ.** *Triandr.*

Πρωσει τη ὑπαρχουση αυξανεται, (sensim, et fine nova germi-  
natione, εξ ακρου sese producit crescendo,) iii. 7. Vid. Πυρος.

**ΣΚΑΜΜΩΝΙΑ.** *Pentandr.*

Amat loca frigida; enumeratur cum Absinthio, Helleboro, et  
aliis montanis, iv. 6. φαρμακωδης τη ριζα, ib. radix gummosa,  
ix. 1. gummi, vel σπος inter medicamenta, ix, 10, 22.



**ΣΚΑΝΔΙΞ.** *Pentandr.*

Planta herbacea, επετειοκαυλος, (perennis,) cum Σικυω αγριω, vii. 8.

<b>ΣΚΙΛΛΑ.</b>	}	<i>Hexandr.</i>
<b>ΣΚΥΛΛΑ.</b>		

In marinis, et arenosis prope mare, i. 7. radix corticata et tunicata, i. 10. vii. 9. folia αμισχα, (seffilia, Bot.) longa, nitentia, Asphodeli latiora, ευδιαιρετα, vii. 12. Spec. duæ: 1. σ. φαρμακωδης. 2. σ. επιμενιδειος, vii. 11.

**ΣΚΟΛΥΜΟΣ.** *Syngen.*

Foliis non spinosis, vi. 3. radix edulis cruda et cocta: optima hyeme, vi. 4. floret vere cum Σικυω αγριω, viii. 10. ακολουθετα αςρα, ut Heliotropium, vii. 14.

**ΣΚΟΛΥΜΩΔΗΣ τις.** *Class. incert.*

Οπος εκστατικος, (maniam inducens.) Hab. Tegea, ix 13.

**ΣΚΟΡΟΔΟΝ.** *Hexandr.*

Enumeratur cum Κρομμυω, Σκιλλα, &c. i. 16. Var. plurimæ, distinguendæ foliis et radicibus, vii. 4. sc.

- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 1. σκ. πρωϊον.  | 4. σκ. ανευ γελγιδων, ib.  |
| 2. σκ. οψιμον.  | 5. σκ. λειοκαυλον. vii. 8. |
| 3. σκ. Κυπριον. |                            |

**ΣΚΟΡΠΙΟΣ.** *Class. incert.*

Cum Asparago sylvestri enumeratur, florens autumnō: flos εν τω σαρκωδει τω εξοιδεντι υπο το ακρον της ακανου, (textus corruptus: forf. επι το ακρον, sc. ex summitate Pericarpī,) vi. 3. flores primo albi, dein purpurascētes: radix simplex brevis, in-torta Scorpii caudæ similis, unde nomen. Vires alexipharmacæ, ix. 14.

**ΣΚΥΘΙΚΗ 'PIZA.** *Class. incert.*

Forfan Glycyrrhiza L. succus dulcis ; Ευθυγλυκεια alio nomine ; vires ad asthma et tussis. Hab. Mæotis. Desc. nulla, ix. 13.

**1. ΣΜΙΑΛΞ.** *Diæcia.*

Species επαλλοκαυλος, (vid.) caule spinoso ; spinis rectis ; foliis hederaceis ; νοτήρῳ τινι κατὰ την τε μισχῶ προσφυσιν, (glandula ad basin pedunculi ?) ἰδίον δε, ὅτι την δια μεσση ῥαχιν (nervum folii intermedium) εχει, και τας σημνιῶς διαληψεις, (nervos flamineos, vel intermedios,) ἐκ ἀπο ταυτης, (non pervenientes ex ipso nervo centrali,) ἀλλὰ περι αυτην περιφερῶς ηγμενας, (lineis concentricis ductos,) ἰουλος ἑλικτος, (cirrhus volubilis,) ἀνθος ευωδες, λειρινον καρπος σφυον, in summis ramulis, iii. 18. folia εἰς ὄξυ προηκοντα παρακανθιζοντα, i. 16.

**2. ΣΜΙΑΛΞ.** *Diæc.*

Spec. Quercus ab Arcadibus sic dicta ; αναμεσον Πρινθ και Δρυος, iv. 7.

**ΣΜΥΡΝΑ.** *Class. incert.*

Arbor odorifera maxime ; hab. India, Arabia, Syria, iv. 6. σπος δακρυωδης, (gummofus,) ix. 1. colligitur ὑπο Κυνα, ("in the Dog-days,") ix. 2. cum succo Λιξανωτης : arb. mediæ magn. trunco nodofo, flexuoso ; furæ magn. cortice spinoso, scabro : folio Oleæ-formi, ix. 4, 7.

**ΣΟΓΧΟΣ.** *Syngen.*

Planta ακανθωδης, ακανῶ (capitulo) lævi, affinis Στρεθιου, vi. 3. radix carnosâ, edulis ; ακανος oblongus, post florescentiam εκπακπεμμενος, (pappo coronatus,) folium arefactione διαχειται, (laxum fit,) και ου κεντει, iv. 4.

**ΣΠΑΛΑΞ.** *Class. incert.*

Enumeratur cum Croco et Περδικιω, radice magna, carnosâ, i. 11. an id. quod Ασπαλαθος ? cujus succus aromaticus, ix. 7.

## ΣΠΕΙΡΑΙΑ.

*Class. incert.*

Spec. ακροκαρπος cum Ερεικα, i. 23. affinis Marrubii, &c. vi. 1.

## ΣΠΟΔΙΑ.

Syn. Κοκκυμηλιας.

## ΣΤΕΛΕΦΟΤΡΟΣ.

*Triandr.*

Spica cylindrica, æquali, florens simul per totam spicam, ut Triticum; nomen ex figura spicæ: enumeratur cum Alopecuro, vii. 10.

## ΣΤΕΛΙΣ.

*Class. incert.*

Cum Ιξια et Ύφρατι. de C. Pl. ii. p. 155.

## ΣΤΟΙΒΗ.

*Syngen.*

Foliis carnosis, i. 16. παρ' ακανθαν έτερον εχων φυλλον, a quibusdam dicta Φεως, vi. 1. Enumeratur cum Ononidi, Tribolo, ib.

## ΣΤΡΟΥΘΙΟΣ.

*Class. incert.*

Species φυλλακανθωδης: capitulo lævi, ut Σογχος, vi. 3.

## ΣΤΡΥΧΝΟΣ.

*Pentandr.*

Ab aliis Ευηπατον radix edulis cocta et cruda, vii. 6. Var. tres.

1. Fr. dulci, eduli.

2. Fr. narcotico.

3. Fr. lethali, vel maniam ind. vii. 14.

N. 1. non describitur.

N. 2. Radix recens alba; arefacta rubra: foliis Tithymalli: vires in cortice radicis.

N. 3. Dicta Θρυρος, radice magna, intus cava, ix. 12. Hab. M. Pelion, Offa, Tegea.

## ΣΤΥΡΑΞ.

*Monæc.*

Enumeratur inter aromata Mediæ et Indiæ. Fructus, vel Gummi solum occurrit, ix. 7.



## ΣΤΚΑΜΙΝΟΣ.

*Monæc.*

Μητρα σκληροτατα, utpote et lignum totum; instar Ebeni et Loti, i. 9. arbor decidua, bacca οινωδει, i. 19. flos flamineus, i. 21. εν αυτοις τοις ὅλοις περικαρπιοις; non in apicibus, ουδ' εν τοις περι-  
ειληφοσι καθ' ἑκαστον, ἀλλ' εν τοις παραμεσον, ib. Textus hic corruptus valde. De fructu tenello Mori, *nigræ* L. cum flosculis fæmineis granulis singulis infidentibus? Comparatur cum Hedera, i. 22. ex ligno θερμῷ (vid.) arb. hujus fiunt terebra πυρρειας, (vid.) ικρια navium, (opera sculptilia,) και σεφαναι, v. 7, 8.

## 1. ΣΤΚΗ.

*Polygam.*

Amputatione eget, i. 5. βραχυσελεχης, λειοφλοιος, cortice μο-  
νολοπω: (vid) lignum carnosum, molle, porosum, i. 8. Medulla carnosa; radix horizontalis, i. 9, 11. lignum trunci sine nodis, i. 13. πλατυφυλλος, i. 16. fructus saporis mellei, οπωδης, (spissus,) ut Papaveris, i. 19. fructificat ex furculis ejusdem anni, i. 23. Cultura eget, ut aliæ fructiferæ spec. i. 22. Serendo degenerat, ii. 3. προμοσχευεται επ' αυτων των δενδρων, (inferendo cultæ species propagantur,) φυτευεται δε (etiam furculis propagatur, vel ex ramis, vel κράδαις trunci, ii. 7.) secunda germinatio ευδη-  
λος, iii. 6; 7. Differentia inter Συκην et Κοτινον, (sylvestrem et cultam,) iv. 14. Lign. minus obnoxium vermibus, iv. 16. Si truncus scindatur, non perit, iv. 19. lign. ισχυρον, v. 7. de C. Pl. 1. v. ubi tres differentiæ occurrunt.

1. σ. Λακωνικη.

2. σ. Λευκομφαλιος.

3. σ. Οπισθοκαρπιος.

De C. Pl. 1. v. morbus peculiaris ψωριασις, vid.

## 2. ΣΤΚΗ Αιγυπτια.

*Polygam.*

Καρποφορει εκ του σελεχους, i. 23. habitus prioris; differt tamen modo fructificandi; fructus magn. ficûs, succo dulcedine ολινδοις simili, sine granis: επικνισθεις (vid.) maturatur citius, arbor πολυσπος σφοδρα; lign. utile, si statim submergatur, iv. 2.

## 3. ΣΤΚΗ Κυπρια.

*Polygam.*

Species affinis Σ. Αιγυπτιας, sed non fructificans εκ σελεχους, ἀλλ' εκ βλαστοις αφυλλοις, ("spurs;") δενδρον μεγα, iv. 2.

4. ΣΤΚΗ *Ινδική.**Dodecand.*

Radices agit ex ramis summis, i. 12. Radices hæ terram attin-  
gentes sursum sese attollunt, ποιουντες ὡς περ δρυφρακτον, (sepi-  
mentum,) ὡς τε γινεσθαι καθαπερ σκηνην; hoc modo arbor exten-  
ditur ἐπὶ δυο σταδια: folia ampla orbiculata, clypei parvi magn.  
fructus συκοειδης parvus, iv. 5. Hab. Fluvio Acefine.

5. ΣΤΚΗ *Ποντια.**Mollusc.*

Ἀφύλλος, μεγαλει ου μεγαλη, iv. 7.

## ΣΦΑΙΡΙΟΝ.

1. σφ. πῖλος vocat. εριωδες, μαλακον, περι πυργης σκληροτε-  
ρον, (forf. περιπυργιον σκληρ. Ald.) ὡ χρωνται προς τους λυχνους,  
iii. 8.

2. σφ. κομην εχον (vid.) αχρειον τ' αλλα, επιβαπτον δε χυλω  
μελιτηριω κατα την ἀφην, (morbum cutis, an Lepra?) και γευσιν,  
(vid.) ib.

3. σφ. αμισχον, η κοιλομισχον· ιδιον και ποικιλον· τας γαρ  
εσπανηκοτας ομφαλους (εχει) επιλευκους, η επισιγμενους μελανι,  
και το αναμεσον κοκκοβαφες, (sensus obscurus; sed ομφαλοι for-  
san cancelli) Clathrus, cancellatus hic describi videtur, ib. Vid.  
Bull. Fungi.

4. σφ. φυλλικον, συμπεπιλημενον, προμηκες, (super foliis nas-  
cens? dense stipatum.)

5. σφ. λευκον, διαυγες (pellucidum) ὕδατωδες ὅταν ἀπαλόν η  
(primo statu gelatinosum) τελειουμενον δε σκληρυνεται, ut sæpe fit  
in Boletis &c. ib.

## ΣΦΑΚΕΛΟΣ.

*Diandr.*

Inter φρυγανα λαχανηρα sine spinis, cum Ελελίσφακω, Θυμ-  
ῤρα, Κονυζω, vi. 1. Σφακελος, foliis minoribus, odore minus acri,  
(Salvia officinalis?) Ελελίσφακος e contra folio majore, odore βα-  
ρυτερω. (Vid. not. ad Tab. System.) vi. 2.

## ΣΦΕΝΔΑΜΝΟΣ.

*Polygam.*

Hab. in montibus Macedoniæ, cum Ζυγία, iii. 4. spec. fylves-  
tris dicitur ανανθη ειναι, iii. 6. ευαυξης, iii. 7. ολιγορριζος, ib.  
Spec. tres:

1. σφ. αγρια.
2. σφ. ζυγία.
3. σφ. κλινοτροχος.

N. 1. Lign. inutile.

N. 2. Lign. flavum, ελον, (molle? tortuosum?)

N. 3. Lign. album ευῖνον, (opp. ελω, fibris rectis,) foliis omnium lobatis instar Platani, τετανοῖς, (rigidis?) sed non æque carnosif, iii. 11. apice acuminatis, ib. cortice haud æque lævi ac Tiliæ, &c. ὑποπελιω, (leviter maculato,) radicibus paucis, horizontalibus. Hab. in locis irriguis circa Idam; flos incognitus: fructus Παλιερα fimilis. N. 3. aliter Γλεινος, voc. hyeme cæditur, v. 1, 4.

ΣΧΟΙΝΟΣ. }  
ΣΧΙΝΟΣ. } Triandr.

Planta ενυδρος. Species tres :

1. σχ. αρρήν.....οξύς, ακαρπος.

2. σχ. μελαγκρανιος } καρπιμος.  
μελαγκρανις }

3. σχ. ὀλοσχοῖνος....ευσταρκης, (folio rotundo craffo,) cujus ufus maxime προς πλεγματα, ("platted Rush-work,") κορυνα δε ὁ καρπιμος, (fc. n. 2.) ἐξ αὐτου του γραμμωδους εξοιδησας, (ex medio fcirpi linearis intumescens,) κα'πειτα εκτικτει καθαπερ ωα, η σρογγυλοτητας, επισχαζουσας, (Pericarpia subglobofa apicehiantia,) ſemen nigrum ακιδωδης, (cuspidi ſagittæ fimile, triquetrum, acuminatum Linn. G. Pl. 67.) radix longa, craffa, iv. 13.

2. ΣΧΟΙΝΟΣ Καλαμος. Hexandr.

Radix miræ ſuavitatis. Hab. in Lacu Orchomeni et in Αυλωνι της Συριας, ix. 7. N. B. Σχοῖνος καὶ Καλαμος ut genera diverfa notantur. de C. Pl. l. vi.

3. ΣΧΟΙΝΟΣ Λιθινος. Corall.

Haud dignoſcendus a Σχοῖνω ipſo, iv. 8.



## T.

TEPEBINΘΟΣ. }  
TERMINΘΟΣ. }

*Diæcia.*

Species duæ : 1. τ. ἀρρὴν, ἀκαρπός.

2. τ. θηλεία,

N. 1. Arbor excelsa. Hab. mont.

Macedoniæ.

} sempervirentes, i. 15.

N. 2. Arb. humilis.

φυλλοὶς περι ἓνα μισχόν πλειοσι, (foliis pinnatis, paribus numerosissimis,) κατὰ συζυγίαν ἀγωνιωτερον τῆς Οἰῆς, (vid. γωνία) το ἐξ ἀκροῦ περιπτον, (folio impari, Bot.) ἀνθε τῷ τῆς Ελαίας? sed coloris rubri. Ligno γλισχρῷ (vid.) utpote et fructu; succo refinoso; φερεὶ δε κωρυκωδὴ τινὰ κοίλα καθάπερ ἡ Πτελεα, (de amento laxo squamulis ovatis Linn. G. Pl. 1108.) τινὶ ῥήτινωδὲ ἐντός, sed non inde Refina officinarum colligitur, iii. 15. ῥήτινη ἀπεπτός λευκή, ib. Germinat primo vere, iii. 6. lignum refinofum ad alia inutile, v. 8. Incisione æstate media refina obtinetur. Mons tota in Syria Terebinthis cooperta, ix. 2.

TERMINΘΟΥ ὁμοίος. *Class. incert.*

Similis Τερμινθε, fructu excepto. Fructus amygdaloides, gustu gratus, iv. 5.

TETPAΓΩΝΙΑ. *Pentandr.*

Οψιβλαστοστός enumeratur cum Aria, iii. 6. sic dictus a forma quadrangulari Pericarpīi, ib.

TETPAΛΙΞ. *Class. incert.*

Cardui species ex ordine lorum folii per paria opposita, Bot. æstate florens cum Ιξινῇ, vi. 3.

ΤΕΤΤΑΟΣ.

ΤΕΤΤΑΟΝ.

ΤΕΤΤΑΙΟΝ.

ΤΕΤΤΑΙΣ.

} *Pentandr.*

Cultura lignescit, i. 15. caulis carnosus, i. 8. radix fusiformis,

i. 9. folia *carnosa*, fucco dulci, i. 16. επισπορος, (vid.) vii. 1. εμ-  
φλοισσπερμος, (feminibus membranaceis tenuibus, compressis ca-  
lyce involutis, Linn. G. Pl. 310.) Var. plurimæ inter cultas, vii. 4.  
coctione eget ad usus culinarios, vii. 6, 7.

**ΤΙΓΡΙΝΟΝ** ξυλον. *Class. incert.*

Ex insula Τυλω in Arabia: βαρυ σφοδρα: striis in ligno, ut  
in pelle Tigridis. Ufus ad baculos, v. 6.

**ΤΙΘΥΜΑΛΛΟΣ.** *Dodecand.*

Spec. quatuor: 1. τ. παραλιας. 3. τ. μυρτιτις.  
2. τ. αρρήν. 4. τ. Συριακος.

omnes communi nomine ut plantæ πανακεις cum Στυχνω, sc.  
οι Στυχνοί, καὶ οι Τιθυμάλλοι, ix. 12. τ. παραλιας vocatur κοκκος,  
folio subrotundo; caule magn. σπιθαμης; fructu albo, ib. τ. αρ-  
ρήν, folio Oleæ; altitudo caulis διπηχυαιος, (bicubitalis.) τ. μυρ-  
τιτις, aliis τ. λευκος, folio Myrti magn. apice spinoso: ramulis  
sparsis per terram: fructus vocatur καρυον, ix. 12. τ. Συριακος,  
alias Πανακης, hab. Syria: vires φαρμακευτικαὶ σφοδρα, ix. 8.  
Hab. n. 1, 2, 3. Pelion, Offa, Tegæa, Telethrium, ix. 15.

**ΤΙΦΗ.** *Triandr.*

Enumeratur cum Πυρω ut πυκνορρίζος, i. 9. mutatio fabulosa,  
ii. 5. πρωϊσπορος æque ac Πυρος, Ζεια, Κριδη, viii. 1. maturat  
semen 40 dies μετ' απανθησιν, viii. granum (vel forsan spica)  
omnium maxime leve, ib.

**ΤΙΦΥΟΝ.** Vid. Ιφυον.

**ΤΟΞΙΚΟΣ.** Vid. Καλαμος.

**ΤΡΑΓΑΚΑΝΘΑ.** *Diadelph.*

Enumeratur cum Ιξια, ut species gummifera, ix. 1. Gummi  
sponte fluit, ix. 8. Hab. Laconia, ix. 15.

**ΤΡΑΓΟΠΩΓΩΝ.** *Syngen.*

Caule brevi; perianthio magno; barba (πωγων) pappo longo,  
πολιω, Bot. vii. 7.

1. ΤΡΙΒΟΛΟΣ. *Tetrandr.*

Species fluviatilis, εν ελωδεσι των ποταμων, (in profundis et limofis fluviorum,) folia aquis innatant, in quorum medio fructus : folia similia Πτελεας, pedunculis longissimis : caulis superne crassus, inferne tenuis, εχων αποπεφυκοτα τριχωδη, (stipulas Bot. lineares,) τα μεν πλεισα παραλληλα, (opposita,) τα δε και παραλλαττωντα, (alterna,) το μεν παραβλασημα εστι, ωσπερ καυλος αλλος, (caules secundarii magn. æquales primario,) fructus ater, και σκληρος σφοδρα, iv. 11.

2. ΤΡΙΒΟΛΟΣ. *Decandr.*

Provenit in novalibus, iii. 1. εχων παρ' ακανθον φυλλα, (spinis a folio separatis,) vi. 1. spinis ad caules, et in foliis, vi. 3. επευκαυλος, (species perennis,) vii. 8.

## ΤΡΙΟΖΟΣ. Vid. Ακανθα.

ΤΡΙΠΟΛΙΟΝ. *Class. incert.*

Planta pharmaceutica decantata ab Homero et Hesiodo. Radix in usu, quæ nocte effodienda est εις παν πραγμα σπουδαιον (antequam res magni momenti aggredienda sit.) Desc. nulla, ix. 21.

ΤΡΙΧΟΜΑΝΕΣ. *Cryptog.*

Caule Adianti nigri ; folia parva admodum, και πυκνα.

ΤΥΦΗ. *Monœc.*

Caulis αδιαφρακτος, (fine nodis,) hab. in Lacu Orchomeni, i. 8. enumeratur cum Σχοινω ιδιωτατον γενος ; foliis nullis ; radicibus paucis ; εχων εις τα κατω την ορμην, (profunde radicata,) iv. 11.

## Υ.

ΥΑΚΙΝΘΟΣ. *Hexandr.*

Inter σεφανωτικά. Species duæ :



ὕ. αγρια.

ὕ. σπαρτη.

Flos διαμενει, vi. 7. Hab. in montosis.

ΥΔΑΝΟΝ.

*Cryptog.*

Sub terra degit, cum Ασκιω, Ουιτω, fine radice, i. 9, 10.

ΥΛΗΜΑ τι.

*Polygam.*

Παθος συμβαινον αυτω ιδιον, (sensibilitas, vel irritatio peculiaris,) εαν τις αψητα των κλωνιων, τα φυλλα, ωσπερ αφαναινομενα συμπιπτει, ειτα μετα τινα χρονον αναβιωσκει, και θαλλει. (Descriptio accuratissima του παθους *Mimosæ*, *sensitivæ* L.) folia pinnata, ramis spinosis, iv. 3.

ΥΠΟΧΟΙΡΙΣ.

*Syngen.*

Inter olera culta κιχωριωδη, vii. 7. foliis lævibus; succo haud æque amaro ac Cichorii: successive floret; femina φοβη (capula vid.) involuta. Spec. ad usus humanos, vii. 11.

ΥΦΕΑΡ.

*Class. incert.*

Species parasitica, in arborum truncis. Enumeratur cum Ιξια, ut affinis. Amat meridionale latus; Ιξια προς βορραν, iii. 16.

## Φ.

1. ΦΑΚΟΣ.

*Diadelph.*

Leguminis gen. Indicum, ita a Græcis sub Alexandro magno vocatum, iv. 5.

2. ΦΑΚΟΣ.

*Diadelph.*

Leguminis gen. οψισπορος, viii. 1. πλαγιοκαυλος: enumeratur cum Erebintho et Οροβω: omnium πολυκαρποτατος, viii. 3.

Spec. duæ: 1. φ. λευκος.

2. φ. μελας.

Prioris femina dulciora, viii. 5.

ΦΑΣΓΑΝΟΝ. Vid. Ξιφιον, vii. 11, 12.

## ΦΑΣΚΟΣ.

*Cryptog.*Ὅμοιος τοῖς βραγχίοις ἰχθύων, ("Gills,") *Anne Lichen*? iii. 9.

## ΦΕΛΛΟΔΡΥΣ. }

## ΦΕΛΛΟΣ. }

*Monœc.*

Cortice aspero, i. 8. sempervirens, i. 15. σρεφονται τα ὑπτια των φυλλων μετα τροπας, (vid. *Ελαια*, p. 19. et *Lex. Theophrast.*)

Spec. duæ: 1. φ. *Αρκαδων.*2. φ. *Τυρρήνων.*

N. 2. arbor decidua, iii. 16. cortex duplex; exteriore αφαιρομενω ευθenei το δενδρον, iv. 18.

## ΦΕΩΣ.

*Class. incert.*

Caule et foliis spinosis, vi. 3. folio carnofo, cum *Ononide*, *Tribulo* &c. vi. 4.

ΦΗΓΟΣ. Vid. *Δρυς*.ΦΙΛΑΤΡΑ. *Diandr.*

Sempervirens, i. 15. λεπτοφλοιος· σρεφει τα ὑπτια των φυλλων, (vid. *Ελαια*, p. 19.) i. 16.

## ΦΙΛΥΚΗ.

*Class. incert.*

Species sempervirens, i. 15. hab. in mont. *Macedoniæ*, iii. 4. fero germinat, iii. 6. lign. ευεργοτατον, μαλακον, v. 7.

## ΦΙΛΥΡΑ.

*Polyand.*

Lign. ευκαμπτον, i. 8. folia gustu dulcia, fructus autem αδρωτος, i. 20. Καχρυας εχει, (vid. infra) iii. 7.

Spec. duæ: 1. φ. *αρρήν.*2. φ. *θηλεια.*

N. 1. fine fructu; ligno duro, enodi.

N. 2. ανθος καλυκωδες (apetalus) παρα τον του φυλλου μισχον, (ex pedunculo folii enascens,) καη παρα την εις νεωτα καχρυν εφ' ετερη μισχη, (an de calyce deciduo? *Linn. G. Pl.* 660.)

Fructus pisiformis; pedunculo longo: γωνίαις πεντε, (eminentiis, Angl. "ridges?") οἷον ἰνέσι προεχούσαις, femina intus plura, parva; folia subrotundo-acuminata, πλὴν ἐκ προσαγωγῆς μαλλόν ἢ περιφέρεια, καὶ τὸ πρὸς μίσχον κυρτοτάτον, (inferior pars versus basin brevior,) iii. 10. folia margine ferrato, ib. hyeme lign. cæditur, substantia μαλακὰ, (porosa,) v. 4, 6. πρὸς σανιδώματα νεών, (vid.) v. 8.

**ΦΛΟΓΙΜΟΝ.***Class. incert.*

Forfan ex colore flammeo? οἱ σεφανηπλοκοὶ χρωντὰ πολὺ ἐκτρέχει τῶν ἀλλῶν, (omnium præcocißimum,) vi. 7.

**ΦΛΟΜΟΣ.***Class. incert.*

Species Φλομῶ, μελαινα dicta. Obiter mentio fit per comparisonem, ix. 15.

**ΦΛΟΞ.***Class. incert.*

Inter σεφανώτικα αὖσμα cum Διὸς ἀνθεῖ, vi. 6.

**1. ΦΟΙΝΙΞ.***Palmæ.*

Amat maris littus, i. 7. ἀπαραβλαστός, i. 13. τραχυφλοιός, ξύλω ἰνωθεῖ, i. 8. μητέρα nulla, i. 9. μονοσελεχός, εἰς μήκος μόνον ἀυξητικός, (magn. fere æquali,) i. 14. sempervirens, i. 14, 15. καλαμοφυλλός, καὶ γωνιοφυλλός, (vid.) i. 16. εὐθύς σπέρμα μετὰ τὸ περιεχόν, (nucleus immediate infra corticem,) succus fructûs μελιτώδης, i. 19. ἀκροκαρπός, i. 23. propagatur σπέρμασι μόνον, ii. 2, 3. amat arenosa falina. Spec. sex:

1. φ. Βασιλικός.

4. φ. Αἰγυπτίος.

2. φ. Κυπρίος.

5. φ. Κυκὰς.

3. φ. Βαβυλωνίος.

6. φ. Χαμαιρεφής.

N. B. Dantur etiam species διφυεῖς καὶ τριφυεῖς, (bi-tri-cipites, ii. 8.) Hab. Nafamone juxta Hammonis templum, iv. 3. et Inf. Delos, iv. 14. Decacuminatione moriuntur, iv. 19. lign. in usu ad statuas faciendas, v. 4. lign. ἰσχυρόν, ἀναπαλιν γὰρ ἢ καμψίς, ἢ τοῖς ἀλλοῖς, (de elasticitate ligni?) τὰ μὲν γὰρ εἰς τὰ κατὼ καμπεταί· ὁ δὲ Φοινὶξ εἰς τὰ ἀνω, v. 7. δυσκαπνὸς ἰδίᾳ φύσει, (an



ad ignem concipiendum, vel respectu carbonationis ?) v. 10. methodus propagandi ex spatha. de C. Pl. i.

## 2. ΦΟΙΝΙΞ ΠΟΝΤΙΟΣ. *Lithoph.*

Βραχυστελεχης σφοδρα. εκφυσει ραβδων (ramuli secundarii) ευθειαι & κυκλοθεν, καθαπερ των ραβδων οι ακρεμονες· αλλ' ως εν πλατει, (habitus furfum complanatus, Bot.) κατα μίαν συνεχεις, (serie continua,) iv. 7.

## ΦΥΚΟΣ. *Cryptog.*

Nomen generale plantarum marinarum. Dividuntur in προσγεια (littoralia) et ποντια (pelagica :) item in πλατυφυλλα et τριχοφυλλα.

1. Πλατυ τετανοειδες, radice tunicata, hirsuta, iv. 7.
2. Δρυς ποντια, επι λιθοις προσπεφυκυια, sine radice ; ὡς περ λεπαδες ad bafin caulis, ib.
3. Ελατη ποντια σαρκοφυλλα; sed ramis longioribus, ib. v. 20.
4. Αμπελος ποντια, fructu rotundo, uvæ magn. ib. v. Vid. supr.
5. Πρασον ποντιον, affine, n. i. ib. Vid. supr.
6. Ἐτερον πρασον ποντιον, cujus longitudo bicubitalis ad columnas Herculis, ib.
7. Φυκος βαπτικος. Hab. in littoribus Cretæ, ib.
8. Φ. ὡς περ Μαραθρον, ib.
9. Φ. ὁμοιον Αγρωσει, caule nodofo, ib.
10. Φ. ὁμοιον Θριδακιναις, πλην ρυτοδεσερον (rugosiore.) spec. acaulis, ib.
11. Συκη ποντια, αφυλλος, μεγαθει & μεγα, coloris φοινικης. Vid. supr. p. 72.
12. Φοιnix ποντια, ib. N. B. n. 11. inter Molluscas Linn. n. 12. inter Lithophyta ? Vid. supr. p. 79.

## ΦΥΛΛΟΝ το. *Class. incert.*

Spec. duæ : φ. αρρενογονον.  
φ. θηλυγονον.

## X.

ΧΑΛΒΑΝΗ. *Pentandr.*

Planta gummofa, cujus odor βαρυς, ix. 7. Gummi vocatur Χαλβανον, item Γαλβανον, ix. 1.

ΧΑΜΑΙΔΡΥΣ. *Didynam.*

Foliis Quercûs, fragrantibus : species humilis ; vires alexi-pharmacæ, ix. 10. folia tunfa ulceribus applicantur αργεμασι, (vid.) fructus καθαιρει χολον, ib. Alt. σπιθαμιαίος.

ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ. *Syngen.*

Affinis Atractylidis, Cnici, &c. & φυλλακανθης, vi. 3.

Species duæ : 1. χ. λευκος.

2. χ. μελας.

N. 1. Foliis Σκολυμῶσ' ακανῶ (pericarpio) μεγαλῶσ' ὀπῶ γλυκεῖ. vi. 3.

N. 2. Foliis similibus, sed minoribus ; radice crassa, coloris flavi ; ὀπῶ βαρεῖ. Hab. in montosis frigidis. Canes et fues necat, ix. 13.

## ΧΑΜΑΙΡΕΦΗΣ. Vid. Φοινίξ.

## ΧΑΜΑΙΒΑΤΟΣ. Vid. Βατος.

Spec. repens ; ἔρπων ἐπὶ τῆς γῆς, ἥ συναπτει.

## ΧΑΡΑΚΙΑΣ. Vid. Καλαμος.

ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΝ. *Polyandr.*

Affinis Heliotropii et Scolymi, ἀμα τῇ Χελιδωνί ανθεῖ ἡ αἰτία φυσικῇ, ἡ συμπτωματικῇ, vii. 14.

ΧΟΝΔΡΙΛΛΑ. *Syngen.*

Inter λαχανα, vii. 11.

## Ψ.

ΨΕΤΔΟ-ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. *Didyn.*

Dictamni affinis. Hab. in asperis montium Cretæ, ix. 16.

## Ω.

ΩΚΙΜΟΝ. Vid. Οκιμον.

ΩΧΡΟΣ. *Diadelph.*

Species leguminosa, folio longiore, cum Piso, Lathyro, viii. 3.  
 επιγειοκαυλος, ib. obnoxius σκωληκι, viii. 10.



*Vegetabilia, Græco sermone, fere semper Masculini, vel Femininei generis; Fructus autem, Gummi, Succus, aliudve quoddam inde natum, semper Generis neutri. Exempla quæ sequuntur ex Theophrasto, et inter legendum occurrentia, sisto.*

ΑΜΥΓΔΑΛΗ, Arb.  
ΑΜΥΓΔΑΛΟΝ, Nux.

ΑΠΙΟΣ, Arb.  
ΑΠΙΟΝ, Fructus.

ΕΛΑΙΑ, Arb.  
ΕΛΑΟΝ, Fructus.

ΕΡΙΝΕΟΣ, Arb.  
ΕΡΙΝΟΝ, Fructus.

ΙΩΝΙΑ? Planta.  
ΙΟΝ, Flos.

ΚΑΡΔΑΜΟΣ, Planta.  
ΚΑΡΔΑΜΟΝ, Semen.

ΚΑΡΥΑ, Arb.  
ΚΑΡΥΟΝ, Nux.

ΚΑΣΤΑΝΟΣ, Arb.  
ΚΑΣΤΑΝΟΝ, Nux.

ΚΙΝΝΑΜΟΜΟΣ, Arb.

ΚΙΝΝΑΜΟΜΟΝ, Cortex vel  
Oleum.

ΚΡΑΝΕΙΑ, Arb.  
ΚΡΑΝΙΟΝ, Fructus.

ΜΗΛΕΑ, Arb.  
ΜΗΛΟΝ, Fructus.

ΟΥΗ, Arb.  
ΟΟΝ, Fructus.

ΠΑΝΑΚΗΣ, Planta.  
ΠΑΝΑΞ, Succus inspissatus.

ΟΛΙΒΑΝΟΣ? Arb.  
ΟΛΙΒΑΝΟΝ, Gummi.

ΡΟΙΑ, Arb.  
ΡΟΟΝ, Fructus.

ΡΟΔΩΝΙΑ<sup>a</sup>? Planta.  
ΡΟΔΟΝ, Flos.

<sup>a</sup> Vide notam p. 13.





*Pinus Abies L.*



*Pinus Picea L.*





TABULA SYSTEMATICA,  
LINNEANA,  
PLANTARUM THEOPHRASTI.





---

TABULA SYSTEMATICA,  
LINNEANA,  
PLANTARUM THEOPHRASTI.

---

*Monandria.*

ἈΛΙΜΟΝ. *Salicornia*, *fruticosa* ? iv. 20. de C. Pl. vi.

ΑΜΩΜΟΝ<sup>a</sup>. ΑΜΟΜΟΝ ? ix. 6, 7.

ΚΑΡΔΑΜΩΜΟΝ<sup>b</sup>. *Amomum*, *Cardamomum* ? ix. 7.

ΚΟΣΤΟΣ. *Costus*, *Arabicus*, ix. 7.

*Diandria.*

ΒΟΥΜΕΛΙΑ. *Fraxinus*, *excel-*

*fior*, iii. 11. iv. 9.

ΕΛΑΙΑ. *Olea*, *Europæa*, i. 4, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23. ii. 7. iii. 3, 5, 8. iv. 15, 19. v. 4, 5. vi. 2.

ΕΛΕΛΙΣΦΑΚΟΣ<sup>c</sup>. *Salvia*, *officinalis*, vi. 1, 2.

ΚΟΤΙΝΟΣ<sup>d</sup>. *Olea*, *sylvestris*, i. 7, 13, 24. ii. 3. iv. 14. v. 4, 9.

ΜΕΛΙΑ<sup>e</sup>. *Fraxinus*, *Ornus*, iii. 4, 6, 7, 11. iv. 14. v. 8.

---

<sup>a</sup> Fructus solum inter unguentaria memoratur.

<sup>b</sup> Incertum an A. *Cardamomum* L. cujus nulla apud Bauhinum mentio : forf. A. gran. Paradisi Bauh. Pin. 413. An id. cum priore ?

<sup>c</sup> *Salvia* L. genus amplissimum, cujus in Syft. Pl. Linn. ed. 3. spec. 32 ; in ed. D. Willdenow, A. D. 1797. 76 enumerantur. Spec. duæ solum apud Theophr. occurrunt, *Ελελισφακος* et *Σφακελος*. Flor. Græc. fasc. 1<sup>mo</sup>. 13 *Salviæ* species accuratissime delineantur. Notandum est *Salvias* scabritie foliorum, nec non odore, adeo inter se convenire, ut non, nisi a Botanicis systematicis, ita subtiliter eas partiri opus fuerit.

<sup>d</sup> Nulla specifica differentia inter *Ελαιαν* et *Κοτινον* in Syft. Linn.

<sup>e</sup> Vid. Flor. Græc. fasc. 1. t. 4. N. B. Nulla mentio *Βουμελιας* in hoc opere.

ὈΡΜΙΝΟΝ. *Salvia, borminum*,  
viii. 1, 7.

ΠΕΠΕΡΙ. *Piper, nigrum*, ix.  
22.

ΣΦΑΚΕΛΟΣ. *Salvia, bortenfis*?  
vi. 1, 2.

ΦΙΛΛΥΡΑ<sup>a</sup>. *Phillyrea, latifolia*,  
i. 8, 15.

ΧΑΜΑΙΔΡΥΣ<sup>b</sup>. *Veronica*,  
*Chamædrys*, ix. 10.

### Triandria.

ΑΓΡΩΣΤΙΣ<sup>c</sup>. *AGROSTIS*, i. 10.  
iv. 11<sup>d</sup>.

ΑΙΓΙΛΩΨ. *Avena, fatua*, vii.  
7, 8, 9, 11, 12.

ΑΙΡΑ. *Lolium, temulentum*, i. 8.  
viii. 4. 9.

ΑΛΩΠΕΚΟΥΤΡΟΣ<sup>e</sup>. *ALOPE-*  
*CURUS*? vii. 10.

ΒΡΟΜΟΣ<sup>f</sup>. *Secale, Cereale*, iv.  
9. viii. 4, 11.

ΔΟΝΑΞ<sup>g</sup>. *Arundo, Donax*, iv.  
12.

ΕΛΥΜΟΣ. *PANICUM*, viii. 10.

ΖΕΙΑ<sup>h</sup>. *Triticum, monococcum*,  
viii. 1, 9.

ΙΡΙΣ<sup>i</sup>. *Iris, Florentina*? iv. 6.  
vi. 7. vii. 12. ix. 7.

ΚΑΛΑΜΟΣ. *ARUNDO*, i. 8, 9,  
10, 16. iv. 9, 12. vi. 2.  
ix. 5.

κ. αὐλητικός.

κ. βομβυχίας<sup>k</sup>.

κ. ἐπιγυῖος.

κ. δοναξ.

κ. πλοκίμος<sup>l</sup>.

<sup>a</sup> Diosc. Φιλλυρία, unde nomen Latinum; vid. iconem nitidiff. Flor. Græc. t. 2.

<sup>b</sup> Inter Veronicas L. extat gen. V. Chamædrys dict. inter Φαρμακώδεις recensetur. (vid. Didynam.) apud Linn. Teucii gen. Chamædrys vocatur.

<sup>c</sup> Nomen graminis generale αγρα-εῖς, (campi vestis,) sed l. iv. 11. spec. paludosa Ægypti describitur.

<sup>d</sup> ΑἰγίλωνΨ Dioscor. aliud genus. Vid. Fl. Gr. t. 93. Spec. hæc Βρομος Diosc.

<sup>e</sup> Ex forma spicæ; sed non Alopecurus Linn. In Fl. Græc. sub nomine Phlei, *crinita*, delineatur spec. cujus spica caudam Vulpinam accurate refert.

<sup>f</sup> Bromus Theophr. differt a Bromo L. ut ex descriptione constat. Inter σιτωδεις enumeratur; spica omnium maxime paleacea, viii. 4. Ὁμοιοπυρος vocatur, viii. 9. (spica simplici, non paniculata, Bot.)

<sup>g</sup> Vid. Καλαμος.

<sup>h</sup> Vox Zea occurrit inter syn. Tritici, *Spelta*, et *Monococci*. Zea monococcos et dicoccos. Bauh. Pin. 21. 22.

<sup>i</sup> Iridis spec. octo in Græcia occurrunt; quarum tres barbatae; quinque imberbes: prioribus annumeranda Iris hæc: posterioribus Σισυριγγιον. Vid. Prodr. Fl. Græc. N. B. In fasc. 1<sup>mo</sup>. Fl. Græc. Irides barbatae, I. *Florentina*, et I. *Germanica*: imberbes, I. *tuberosa*, et I. *Sisyrinchium*, accurate delineantur.

<sup>k</sup> In Classi sexta, Bambusa, *arundinacea* L.

<sup>l</sup> Arundo, *Phragmitis*.

κ. τοξικός.  
κ. χαρμικίαις.  
KNEΩPON. CNEORUM ? i. 16.  
vi. 1, 2.  
KPIΘH<sup>a</sup>. Hordeum, *vulgare*,  
i. 9. viii. 1, 2, 3, 4.  
κρ. διττικός.  
κρ. τριτικός.  
κρ. τέτρατικός.  
κρ. πεντατικός.  
κρ. ἑξατικός.  
κρ. παραβλατικός.  
κρ. εἰσοκριθής. de C. Pl. iii.  
KPOKOC<sup>b</sup>. CROCUS, i. 9. vi. 6,  
7. vii. 9, 12. ix. 7.  
κρ. ορεινός.  
κρ. ἡμέριος.  
KTPEIPOC<sup>c</sup>. Cyperus, *longus*,  
i. 8, <sup>d</sup> 10, 16, iv. 9, 11. ix. 7.

ΛΙΝΟΣΠΑΡΤON. Lygeum,  
*spartum*, i. 8.  
ΜΑΛΙΝΑΘΑΛΛΗ<sup>e</sup>. Cyperus,  
*esculentus*, iv. 8.  
ΜΕΛΙΝΟΣ<sup>f</sup>. Panicum, *Itali-*  
*cum* ?  
ΞΙΡΙΣ. Vid. viii. 1, 3. An Iρις ?  
ix. 9.  
ΞΙΦΟΣ<sup>g</sup>. } GLADIOLUS, vii.  
ΞΙΦION. } 12.  
'ΟΛΟΣΧΟΙΝΟΣ. Vid. Σχοῖνος.  
ΟΛΥΤΡΑ<sup>h</sup>. Hordeum, *Zeocriton* <sup>p</sup>  
viii. 1, 4, 9.  
ΠΑΠΥΡΟΣ<sup>i</sup>. Cyperus, *Papyrus*,  
iv. 9. vi. 12.  
ΠΟΑ<sup>k</sup>. Ροα ? nomen generale.  
ΠΟΑ. Spec. palustris, iv. 10.  
in Ægypto.  
ΠΥΡΟΣ. Triticum, *æstivum*, i.

<sup>a</sup> Hordei culti apud L. species 4: H. *vulgare*, H. *distichon*, H. *hexastichon*, H. *zeocriton*. Gramina hordeacea 4. N. B. Κριθὴ παραβλατικός, forsan Triticum compositum L.

<sup>b</sup> Croci L. species duæ: fativus et vernus. Var. officinalis a Theophr. sub nomine κρ. ἡμέριου indicari videtur. Inter unguentaria aromatica, ix. 7. occurrit; pistillum sc. Extat icon Croci *aurei*, fasc. i. t. 35. Flor. Græc. An. Κρ. ἡμέριος Theophr. (vid. καυλον ανθους,) vii. 9.

<sup>c</sup> Cyperi L. spec. quatuordecim, apud Græcos decem. Prodr. Fl. Græc.

<sup>d</sup> Ex singulari habitu radices, i. 10. C. *comosus* Flor. Græc. i. t. 44. innui videtur.

<sup>e</sup> Forsan Μαλοναθαλλα ex forma tuberis: a Plinio vocatur Malum Anthallium.

<sup>f</sup> Forsan Milium *paradoxum*, sed inter σιτωδὴ culta recensetur: nomen ex gustu melleo feminis.

<sup>g</sup> Vid. Fl. Græc. t. 37. N. B. Var. occurrit ibi Gladioli, t. 38. labiis inferioribus litteris A. A. signatis. Vid. Athen. Deipnos. 15.

<sup>h</sup> Spec. σιτωδὴς ὁμοιοπυρός (spica simplici) apud Homerum ut pabulum equinum occurrit, una cum Κρι (κριθὴ) λευκῇ. A quibusdam Secale, *Cereale* L.

<sup>i</sup> Aliis Βελος.

<sup>k</sup> Vox ποα pro viridi, vel herbacea plantæ parte: quandoque pro gramine in genere.



8, 9, 18. ii. 5. viii. 1, 2, 3,  
4, 5, 10, 11.

π. Αλεξανδρειος.

π. Αιγυπτιος.

π. Ασσυριος.

π. Θρακιος.

π. Καρχηδονιας.

π. Λιβυκος.

π. Ποντικος.

π. Σικελικος.

ΣΙΣΤΡΙΓΧΙΟΝ<sup>a</sup>. Iris, *Sisyrinchium*, i. 16. vii. 13.

ΣΙΤΟΣ. Vid. Πυρος.

ΣΧΟΙΝΟΣ. } SCHÆNUS, i. 8.

ΣΧΙΝΟΣ. } iv. 9, 13. ix. 7.

σχ. σχοινος<sup>b</sup>.

σχ. ὀλοσχοινος.

σχ. μελαγκρανιον.

ΤΙΦΗ<sup>c</sup>. Triticum, *Spelta*, ii. 5.  
viii. 1, 3, 9.

ΦΑΣΓΑΝΟΝ. Iris, *Xiphium*,  
vii. 11, 12.

ΦΛΕΩΣ<sup>d</sup>. SCIRPUS, iv. 9, 12.

### Tetrandria.

ΑΠΑΡΙΝΗ. Galium, *verrucosum*, vii. 8, 14. viii. 8<sup>e</sup>.

ΑΡΝΟΓΛΩΣΣΟΝ<sup>f</sup>. Plantago,  
*major*, vii. 10.

ΕΡΥΘΕΔΑΝΟΝ. Rubia, *tinctorum*, vi. 1. vii. 19. ix. 14.

ΘΗΛΥΚΡΑΝΕΙΑ. Cornus, *sanguinea*, i. 13. iii. 4, 6, 11, 12.

ἸΠΠΟΦΕΩΣ <sup>g</sup> . ἸΠΠΟΦΥΟΝ.	{	Dipfacus,
		<i>Fullonum</i> ?
		vi. 3, 4.
	}	ix. 14.

ΚΡΑΝΕΙΑ. Cornus, *mas*, i. 9, 13. iii. 4, 6, 7, 12. v. 8<sup>h</sup>.

ΚΟΡΟΝΟΠΟΥΣ<sup>i</sup>. Plantago,  
*Coronopus*, vii. 9.

ΚΤΝΩΨ<sup>k</sup>. Plantago, *Cynops*,  
vii. 8, 10.

<sup>a</sup> Extat icon Fl. Græc. t. 42. radice supra fobolifera, ut apud Theoph. vii. 13.

<sup>b</sup> Schœnus mariscus ex descriptione. N. B. Holoschœnus usurpatur ut triviale nomen, a Linn. Sc. *mucronatus* solum delineatur, Fl. Græc. t. 43. σχ. μελαγκρανιον incert.

<sup>c</sup> Librariorum incuria duo genera confunduntur, Τίφη et Τυφή; quorum posterior Typha *latifolia* L. Vid. Monœc. N. B. In Abyffinia colitur hodie frumenti gen. "Teff" dict. testibus Bruceo et D. Valentia: forsan nativa vox antiquorum.

<sup>d</sup> Differt a Φεω, planta spinosa: sed forsan textus corruptus.

<sup>e</sup> Flor. Græc. t. 133.

<sup>f</sup> Ab aliis Στελεφουρος, vii. 10. (Spica cylindrica, vid. Lex. στελεφουρος.)

<sup>g</sup> Genus certe spinosum: an affine Φεως. vid. Alii legunt Ἰπποφύον. N. B. Dipfacus, *sylvestris*: Διψακος Diosc. Mallem igitur plantam hanc inter incertas numerare.

<sup>h</sup> Flor. Græc. t. 151.

<sup>i</sup> Nomen ex habitu inditum, foliis radiatim super terram.

<sup>k</sup> Forf. Plantago, *Psyllium*. Fl. Græc. t. 149.

ΣΙΣΤΜΒΡΙΟΝ<sup>a</sup>. *Sisymbrium*? ii. 5. vi. 6.  
ΤΡΙΒΟΛΟΣ<sup>b</sup>. *Tropa, natans*,  
iv. 11.

*Pentandria.*

ΑΓΧΟΤΣΑ. *Anchusa, tinctoria*,  
vii. 9.

ΑΚΤΗ<sup>c</sup>. { *Sambucus, nigra*,  
i. 8, 9, 13. iii.  
ΑΚΤΕΟΣ. { 6, 13, 14. v.  
4.

ΑΜΠΕΛΟΣ. *Vitis, vinifera*, i.  
8, 9, 16, 19, 21, 22, 23, 24.  
ii. 3, 4, 7. iii. 7. 11. iv. 6, 7,  
14. v. 4. ix. 21.

α. αγρία<sup>d</sup>.

α. ήμερη.

α. Ιδαία.

α. καπνία.

α. λευκοφαλία.

α. μανομινά. de C. Pl. i.

ΑΝΗΘΟΝ. { *Anethum, bor-*  
tense, i. 17. vi.  
ΑΝΗΣΟΝ. { 2. vii. 1, 3. ix.  
21.

ΑΝΔΡΑΦΑΞΙΣ.

ΑΤΡΑΦΑΞΙΣ.

{ *Chenopo-*  
dium, *Bo-*  
nus *Henri-*  
cus, i. 23.  
vii. 1, 2, 3,  
4, 6.

ΑΣΚΛΗΠΙΑΣ<sup>e</sup>. *Thapsia, Af-*  
clepium, ix. 12.

ΑΦΑΡΚΗ<sup>f</sup>. *Rhamnus, Alater-*  
nus.

ΓΑΛΒΑΝΟΝ. Vid. Χαλβανον.

ΕΛΕΙΟΣΕΛΙΝΟΝ<sup>g</sup>. *Apium,*  
*graveolens*? vii. 6.

ΕΛΙΞ<sup>h</sup>. *Hedera, Helix*, iii. 18.  
vii. 8.

i. ποικίλη.

i. ποωδης.

i. χλοερα.

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΝ. *Heliotropi-*  
um, *Europerum*, vii. 8, 9, 10,  
14.

ΘΑΨΙΑ<sup>i</sup>. *Thapsia*? ix. 9,  
10, 22.

ΘΡΑΥΠΑΛΟΣ. *Viburnum, O-*  
pulus, iii. 7. iv. 1.

ΘΡΥΑΛΛΙΣ<sup>k</sup>. *Verbascum*?

<sup>a</sup> *Menthae* species videtur, et idcirco inter *Didynamias*.

<sup>b</sup> Vox *τριβολος*, *Tribulum* terrestrem indicans, occurrit inter *Decandrias*.

<sup>c</sup> Forfan *Samb. racemosa*.

<sup>d</sup> Haud satis constat ex desc. an spec. diversae sub nomine *A. αγρίας* et *Ιδαίας*; folia enim non lobata. N. B. Haud crediderim cum Linn. *Vaccinii* speciem esse.

<sup>e</sup> Vox *Ασκληπιας*; ut trivialis *Panaces*, L. vid. *Πανακη*: forfan *Afc. vince-*  
*toxicum* L. vel potius *Thapsia, Asclepium*, Prodr. Fl. Græc.

<sup>f</sup> Forfan *Celastrus Clusii*.

<sup>g</sup> Tria occurrunt *Σελίνα*, quorum duo ex loco natali nominata; *Ελειο*, *Ορειο*;  
N. B. *Ίπποσελίνον*, forfan *Selinum palustre* L. et Bauh.

<sup>h</sup> An gen. diversum a *Κιστρω*? Vid. infr.

<sup>i</sup> *Sefeli, turpith*. L. et Bauh. 148.

<sup>k</sup> Genus ex orbe novo sub nomine *Thryallis* apud Linn. parum caute enu-  
meratur.

- ΙΑΣΙΩΝΗ<sup>a</sup>. *Convolvulus, sepium?* i. 21.
- ΪΠΠΟΜΑΡΑΘΡΟΝ. *Ferula, communis*, vi. 1.
- ΪΠΠΟΣΕΛΙΝΟΝ. *Smyrnium, olusatrum*, i. 15. vii. 6. de C. Pl. v.
- ΚΑΥΚΑΛΙΣ. *CAUCALIS*, vii. 7.
- ΚΗΛΑΣΤΡΟΣ. *CELASTRUS*, i. 6, 15. iii. 2, 6. iv. 1. v. 8.
- ΚΗΡΙΝΘΟΝ. *Cerithe, aspera*, vi. 7.
- ΚΙΤΤΟΣ<sup>b</sup>. *HEDERA*, i. 4, 15, 16, 22. ii. 1. iii. 6, 18, 20. v. 4. vi. 1. ix. 19.
- κ. λευκη.
- κ. μελαινα.
- κ. ἰλιξ.
- κ. ἐπιγειος.
- ΚΟΚΚΥΤΡΙΑ. *Rhus, Cotinus*, iii. 16.
- ΚΟΡΙΑΝΝΟΝ. *Coriandrum, sativum*, vii. 1, 3, 4, 6.
- ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΣ. *Cyclamen, Europæum*, vii. 9. ix. 10.
- ΚΥΜΙΝΟΝ. *Cuminum, cyminum*, i. 18. vii. 3, 4. viii. 10.
- ΚΩΝΕΙΟΝ. *Conium, maculatum*, i. 8. vi. 2. ix. 1, 8, 15, 18.
- ΛΙΒΑΝΩΤΙΣ. (herba) *ATHAMANTHA*.
- λ. καρπιμος.
- λ. ακαρπος.
- ΛΙΝΟΝ<sup>c</sup>. *Linum, usitatissimum*, viii. 7.
- ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ. *Atropa, Mandragoras*. vi. 2. ix. 10.
- ΜΑΡΑΘΡΟΝ<sup>d</sup>. *Anethum, Fæniculum*, i. 18, 19. vi. 1, 2. vii. 3.
- ΜΗΝΙΑΝΘΗΣ. *Menyanthes, trifoliata*, iv. 11<sup>e</sup>.
- ΝΑΡΘΗΚΤΙΑ<sup>f</sup>. { *Ferula, Ferulago?* i. 9. vi. 1, 2.
- ΝΑΡΘΗΞ. }
- ΟΙΣΟΣ. } *Ribes, Grossularia*, iii. 17.
- ΙΣΟΣ. }
- ΟΡΕΟΣΕΛΙΝΟΝ<sup>g</sup>. *Athamanta, Oreoselinum*, vii. 6.
- ΠΑΛΙΟΤΡΟΣ<sup>h</sup>. *Rhamnus, Spina Cbristi*, i. 4, 8, 16. iii.

<sup>a</sup> Aliis *Aquilegia vulgaris*; sed petalum expresse dicitur *μονον ειναι*. Vid. Dioscor. item Cat. Alph. p. 28.

<sup>b</sup> Genus *Hedera* L. spec. duas continet: *H. Helix*, *H. quinque-folia*: var. tamen tres enumerantur: *H. Poetica*, *H. sterilis*, *H. humi repens*. N. B. *H. Helix* Theophrasti, syn. *H. sterilis Bauhini*. *H. επιγειος*, syn. *H. humi repentis* ejusdem: *Hederæ* fructu albo apud Theophr. iii. 18. mentio fit sub nomine *Κιττου λευκης*: de qua inquirendum.

<sup>c</sup> Lin. *sativum* Bauh.

<sup>d</sup> Forfan var. β. Linn. *Fæniculum vulgare, Italicum*, Bauh.

<sup>e</sup> Forfan M. *Nymphæoides*: vid. Prodr. Fl. Græc.

<sup>f</sup> Genus ita denominatum ex caule nodoso, fistuloso. Antiqui internodiis caulinis *Ferulæ* vice phialarum utebantur. *Ναρθηξ* major; *Ναρθηκισ* minor.

<sup>g</sup> Vid. supr. notam in *Ἐλειοσελινον*.

<sup>h</sup> Forf. Rh. *Palmyrus* L.



4, 6, 17, iv. 3, 4, 9, 13.  
vi. 1.

ΠΑΝΑΚΕΑ <sup>a</sup>. } LASERPITI-  
ΠΑΝΑΚΕΣ. } UM, ix. 12, 15.

π. Ασκληπιας <sup>b</sup>.

π. Ἡρακλεια.

π. Χειρωνειον.

ΠΕΥΚΕΔΑΝΟΝ <sup>c</sup>. *Peucedanum, officinale*, ix. 15, 22.

ΠΙΤΤΙΝΗ <sup>d</sup>. *Cressa, erratica* ?  
vii. 8.

ΠΤΕΛΕΑ. *Ulmus, campestris*,  
i. 13, 16. iii. 1, 4, 5, 6, 7,  
8, 14. iv. 7. v. 4, 5, 8. ix.  
1.

πτ. πτελεια.

πτ. ορειπτελεια <sup>e</sup>.

ΡΑΜΝΟΣ <sup>f</sup>. *RHAMNUS* ? iii.  
17. v. 10.

ρ. μελαινα.

ρ. λευκη.

ΡΟΥΣ <sup>g</sup>. *Rhus, Coriaria*, iii.  
18.

ρ. αρρην.

ρ. θηλυς.

ΣΕΛΙΝΟΝ <sup>h</sup>. *SELINUM* ? i. 9,  
15, 16, 19. iv. 9. vii. 1, 5.  
ΣΕΣΕΛΙ. *Tordylium, officinale*,  
ix. 15.

ΣΙΛΦΙΟΝ <sup>i</sup>. *Laserpitium, latifolium*, i. 11. iii. 3. iv. 3. vi.  
2, 3. vii. 3. ix. 1, 2.

ΣΚΑΜΜΩΝΙΑ. *Convolvulus, Scammonia*, iv. 6. ix. 1, 10,  
22.

ΣΚΑΝΔΙΞ <sup>k</sup>. *Scandix, Pecten* ?  
vii. 8.

ΣΤΡΥΧΝΟΣ <sup>l</sup>. *SOLANUM* ? vii.  
6, 14. ix. 12, 15, 21.

στ. ήμερος, vel φονικος.

στ. μελας, vel ύπνωτικός.

στ. θρυορος, vel μανικός.

<sup>a</sup> Prior forsan planta ; posterior gummi. Vid. Obs. ad fin. tab.

<sup>b</sup> Vid. Ασκληπιας sup. N. B. π. Ἡρακλεια, *Heracleum, Panaces*. π. Χειρωνειον *Laserpitii* spec. ?

<sup>c</sup> An *P. officinalis* var. β ?

<sup>d</sup> *Chamæpetys, incana* forsan *Bauhini*.

<sup>e</sup> *Ulmi, campestris* var. nullæ apud Linn. Attamen recenter *Ulmi, Abelisicæ* mentio fit Aët. Linn. Lond. v. 9. ex specimine in Herbario Linn. a cl. Prof. J. E. Smith, et in Prodromo Fl. Græc.

<sup>f</sup> *Rhamni, cathartici* baccæ nigræ. Ραμνος Græcorum hodie *Lycium, Europæum*. Vid. Prodr. Fl. Græc. 155.

<sup>g</sup> Nullæ var. ap. Linn. An spec. duæ ?

<sup>h</sup> Vid. sup. Ἐλειοσελινον, &c. forsan *Selinum, sylvestre* L. Anne *Apium, Petroselinum* antiquis notum inter λαχανα ?

<sup>i</sup> Nulla *Silphii* mentio ap. Linn. forsan ex desc. *Ferulæ* spec. *F. nodiflora*, vel *F. Affasætida*.

<sup>k</sup> Semel occurrit sine desc.

<sup>l</sup> Στρυχνου tres species Theophr. tria genera Linn. constituunt: 1. στ. ήμερος, *Solanum, Melongena*. στ. ύπνωτικός, *Physalis, somnifera*. στ. μανικός, *Atropa, Belladonna*. Vid. Prodr. Fl. Græc.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΑ<sup>a</sup>. *Euonymus*,  
*Europæus*, iii. 6.

ΤΕΤΤΑΙΟΝ. { *Beta, vulgaris*, i.  
5, 8, 9, 16. vii.  
ΤΕΤΤΑΟΝ. { 1, 3, 4, 6, 7.

ΧΑΛΒΑΝΗ<sup>b</sup>. *Bubon, Galba-*  
*num*, ix. 1.

### Hexandria.

ΑΚΟΡΟΣ<sup>c</sup>. *Acorus, Calamus* ?  
i. 22.

ΑΜΑΡΑΚΟΣ. *ASPHODELUS*,  
vi. 7.

ΑΝΕΜΩΝΗ *Λειμονία*<sup>d</sup>. *Nar-*  
*cissus, Pseudo-Narcissus*, vi.  
7.

ΑΝΘΕΡΙΚΟΣ. *Asphodelus, lu-*  
*teus*, i. 7. vi. 2.

ΑΣΠΑΡΑΓΟΣ. { *Asparagus*,  
ΑΣΦΑΡΑΓΟΣ. { *apbyllus*, i.  
16. vi. 1, 3.

ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ<sup>e</sup>. *Asphodelus*,  
*ramosus*, i. 16. vii. 9, 11,  
12.

ΒΟΛΒΙΝΗ. *Scilla, unifolia*, vii.  
13.

ΒΟΛΒΟΚΩΔΙΟΝ<sup>f</sup>. *Bulboco-*  
*dium, vernalium*, vi. 8.

ΓΗΘΥΟΝ. } *ALLIUM*, i. 4, 5,  
ΓΗΤΕΙΟΝ. } 16. vi. 1, 3.

ΚΡΙΝΟΝ<sup>g</sup>. *Lilium, album*, vi.  
6, 8.

ΚΡΟΜΜΥΟΝ. *Allium, Cera,*  
i. 8, 10, 16. vii. 2, 3, 4, 5,  
8.

κρ. *Ασκαλονικον*<sup>h</sup>.

κρ. *Κνιδιον*.

κρ. *Σαμοθρακικον*.

κρ. *Σαρδιον*.

κρ. *Σητανειον*.

κρ. *Σχισον*.

ΚΡΟΜΜΥΟΓΗΤΕΙΟΝ. *AL-*  
*LIUM*, iv. 7.

ΛΑΠΑΘΟΣ. *Rumex, acetosa*,  
i. 8, 9. vii. 1, 2, 3, 4, 7.

ΛΕΙΡΙΟΝ. vid. *Ναρκισσος*, vi.  
6, 7.

ΛΕΙΡΙΟΝ<sup>i</sup> ἑτερον, vi. 6.

ΛΕΥΚΟΙΟΝ. *Leucoium, ver-*  
*num*, vii. 9, 13.

ΜΩΛΥ. *Allium, Moly*, ix. 15.

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ. *NARCISSUS* ? vi.  
6, 7. vii. 12.

ΟΙΝΑΝΘΗ. *CONVALLARIA*,  
vi. 7.

ΟΡΥΖΟΝ. *Oryza, sativa*, iv. 5.

<sup>a</sup> Ex forma fructus quadrangulari.

<sup>b</sup> Gummi χαλβανον vel γαλβανον.

<sup>c</sup> Ex situ cum Cnico, suspicor genus hoc Carduis affine esse, sed ita a Linn. acceptum.

<sup>d</sup> *Ανεμωνη*, simpliciter, *Anemonem* L. indicat; vid. *Polyandr*.

<sup>e</sup> *Ασφοδελος* et *Ανθερικον* proxime stant in Syft. Linn.

<sup>f</sup> Forfan *Narcissus minor* L. vel *bulbocodium*. Datur etiam *Ixiæ spec. bulbocodium* dist. L. Flor. Græc. t. 56. N. B. Omnes (ex voce κωδια) bulbis lanosis, vel gossypinis extus.

<sup>g</sup> Genus *Crinum* L. antiquis ignotum.

<sup>h</sup> Ang. "Shallott," sono Græcæ vocis retento. N. B. Haud fatis liquet respectu κρ. γηπειου, et κρ. σχισου, an All. *ampeloprasum*, et *schoenoprasum*.

<sup>i</sup> Forfan *Narcissus, Poeticus*, vel *Pseudo-Narcissus* L.

ΠΡΑΣΟΝ. *Allium, Porrum*, vii. 4, 8.

ΣΚΙΛΛΑ. { *SCILLA*, i. 7, 10,  
ΣΚΥΤΛΛΑ. { 16. vii. 9, 12.

σκ. *Diosc. Scilla, maritima.*

σκ. *Επιμενιδία, Scilla, Italica.*

ΣΚΟΡΟΔΟΝ<sup>a</sup>. *Allium, Scorodoprasum*, vii. 4, 8.

ΎΑΚΙΝΘΟΣ<sup>b</sup>. *Hyacinthus, comofus* ?

*Heptandria.*

Mirum videbitur nullam *Æsculi Hippocastani* L. apud Theophrastum mentionem incidisse : Clusius refert Constantinopoli Viennam delatam.

*Octandria.*

ΕΡΕΙΚΗ<sup>c</sup>. *ERICA*, i. 23.

ΚΝΕΩΡΟΝ<sup>d</sup>. *Daphne, Cneorum* ? i. 16. vi. 1, 2.

κν. λευκον.

κν. μελαν.

ΜΕΛΙΑΣ<sup>e</sup> Σίτος. *Polygonum*,

*Fagopyrum*, vii. 14.

*Enneandria.*

ΔΑΦΝΗ. *Laurus, nobilis*, i. 8, 9, 13, 5, 19, 24.1 iii. 4, 6,

8. iv. 6, 8, 20. v. 3, 4, 8, 10.

ΔΑΦΝΗ<sup>f</sup> αγρία, iv. 8.

ΚΑΣΙΑ. *Laurus, gracilis* g, ix. 4, 5.

ΚΙΝΝΑΜΟΜΟΣ<sup>h</sup>. *Laurus, Cassia*, ix. 7.

ΘΗΣΕΙΟΝ<sup>i</sup>. *Rheum, Rhabonticum*, vii. 11.

*Decandria.*

ΑΝΔΡΑΧΝΗ. *Arbutus, Andrachne*, i. 8, 15. iii. 4, 6. 7, 16. v. 8.

α. αγρία.

α. ήμερα.

ΒΑΛΑΝΟΣ. ή. *Guilandina, Bonduc*, i. 17. iv. 2.

ΔΙΟΣ ΑΝΘΟΣ<sup>k</sup>. *Dianthus Caryophyllus* ? vi. 1, 6, 7

<sup>a</sup> Forfan *A. Scorodopras*. var. β.

<sup>b</sup> Spec. *Hyacinthi* apud L. 13 ; quarum 10 Bauhino notæ. Forfan *Hyacinthus Theophrasti* ? *H. Poeticus* L. apud nos frequentissima. N. B. Omnium pulcherrima species in hortis nostris *H. orientalis*, antiquis ignota.

<sup>c</sup> Semel occurrit ut frutex apice florifero : nomen usurpatur a Bauhino, Clusio, et Linn.

<sup>d</sup> Incertum an *Daphne* : forfan *Cneorum* L. *Chamælea* Bauh. Vid. *Triandr.*

<sup>e</sup> Ex colore grani : forfan *P. Convolvulus* ; *Convolv. niger* Dodon.

<sup>f</sup> *L. nobilis* nulla datur var. Spec. hæc *Viburnum, Tinus* Bauh. rectius *Viburnum Lantana* ; vid. *Prodr. Fl. Græc.*

<sup>g</sup> *Laurus, Cinnamomum* antiquis ignota.

<sup>h</sup> Cortex, vel oleum solum inter unguentaria.

<sup>i</sup> Mallem sane *Rheum, palmatum* Thesæi nomine insigniri, sed locus natalis prohibere videtur.

<sup>k</sup> Aliis *Agrostemma Flos Jovis* L. vel *coronaria* L.



ΚΕΡΚΙΣ. *Cercis, filiquastrum*,  
iii. 14.

ΚΟΜΑΡΟΣ. *Arbutus, Unedo*,  
i. 8, 15. iii. 16. v. 10.

ΛΥΧΝΙΣ<sup>a</sup>. *LYCHNIS*.

ΠΗΓΑΝΟΝ. *Ruta, graveolens*,  
i. 4, 15. vii. 2, 4, 5, 9.

ΣΤΡΟΤΘΙΟΝ. *Gypsophila*,  
*Struthium*.

ΤΡΙΒΟΛΟΣ<sup>b</sup>. *Tribulus, ter-*  
*restris*.

### *Dodecandria.*

ΑΕΙΖΩΟΝ. *Sempervivum, ar-*  
*boreum*, i. 16. vii. 14.

ΣΥΚΗ ΙΝΔΙΚΗ<sup>c</sup>. *RHIZO-*  
*PHORA*, i. 12. iv. 4.

ΤΙΘΥΜΑΛΛΟΝ<sup>d</sup>. *EUPHOR-*  
*BIA*, ix. 8, 12, 15.

τ. παραλιος.

τ. αέρην.

τ. μυρτιτις.

### *Icosandria.*

ΑΜΥΓΔΑΛΗ.	{	<i>Amygdalus,</i>
ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ.		<i>communis</i> , i.
		18, 19, 21,
		23. ii. 3. vii.
		12. ix. 12.

ΑΠΙΟΣ. *Pyrus, communis*, 1, 4,  
16, 19, 21, 23, 24. ii. 3, 7.  
iv. 6, 14, 16.

ΑΡΙΑ. *Cratægus, Aria*, iii. 6,  
16. v. 1, 4, 5, 6, 10.

ΑΧΡΑΣ<sup>e</sup>. *Pyrus, sylvestris* sta-  
tu, i. 7, 24. ii. 3. iii. 4, 6,  
7. iv. 14.

ΒΑΤΟΣ<sup>η</sup>. *RUBUS*, i. 2, 8, 15,  
16. iii. 18.

β. σπδοφους. *R. fruticosus*.

β. χαμαιθατος. *R. Chamæmorus*.

β. κυνοσθατος. *R. Idæus*.

ΚΑΚΤΟΣ. *Cactus, Opuntia*, vi.  
4.

ΚΕΡΑΣΟΣ. *Prunus, Cerasus*,  
iii. 13. ix. 1.

1. ΚΟΚΚΥΜΕΛΙΑ<sup>f</sup>. *Prunus*,  
*Laurocerasus* ? i. 18, 19, 21,  
22. iii. 7. iv. 3.

2. Κ. ΣΠΟΔΙΑ, iii. 7. *incert*.

ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ. *Cratægus, tormi-*  
*nalis*, iii. 15.

ΚΥΝΟΣΒΑΤΟΣ. *Rubus, Idæus*,  
iii. 18. Vid. Βατος.

ΛΑΚΑΘΗ. *Prunus, Mabaleb*,  
iii. 4.

ΜΕΣΠΙΛΗ. *MESPILUS*, iii. 12.

<sup>a</sup> Ex medulla in caule lucernis apta?

<sup>b</sup> Duo sub nomine *τριβολος* occurrunt genera. Vid. Tetrand.

<sup>c</sup> Incertum an *Rh. conjugata*, vel *gymnorhiza* L.

<sup>d</sup> Plurima dantur genera apud antiquos sub nominibus *Tithymalus*,  
*Efula*, *Apios*, *Peplus*. Vid. Ger. em. 498. Sp. 1<sup>ma</sup> *Euph. Paralias*; 2<sup>d</sup> *Euph.*  
*Amygdaloides* Dioscor. 3<sup>ta</sup> *Euph. Myrsinitis*.

<sup>e</sup> *P. Pyrafter* L. *P. sylvestris* Bauhin. Οχνη.

<sup>f</sup> Incertum ex desc. nulla tamen vocis *Κοκκυμελιας* apud Bauh. vel Clu-  
sum mentio. N. B. *Prunus, Laurocerasus* L. Anglice "Laurel" vocatur; Lau-  
rus autem nobilis L. "Sweet Bay." *K. σποδια* spec. *sylvestris*, ignota.

μ. ἀνθηδων. Cratægus Azarota.  
 μ. σατανειος. M. Germanica.  
 μ. ἀνθηδωνοειδης. Crat. Oxyacantha.  
 ΜΗΛΕΑ<sup>a</sup>. Pyrus, *malus*, i. 4, 8,  
 9, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24.  
 ii. 1, 3, 7. iii. 4, 6. iv. 16,  
 19.  
 μ. οψία.  
 μ. ιαρινή.  
 ΜΥΡΡΙΝΗ. { Myrtus, *commu-*  
 ΜΥΡΡΙΝΟΣ. { *nis*, i. 4, 15,  
 16, 22, 23,  
 24. iii. 4, 6, 7.  
 ΜΥΡΤΟΣ. id. i. 9.  
 ΟΞΥΑΚΑΝΘΑ. Cratægus, *Py-*  
*racantha*, i. 15. iii. 4, 6. vi.  
 7.  
 ΟΥΗ. } Sorbus, *domestica*, ii. 3.  
 ΟΗ. } iii. 3, 7, 12.  
 ΠΑΔΟΣ. Prunus, *Padus*, iv. 1.  
 ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟΝ. { TORMEN-  
 ΠΕΝΤΑΠΕΤΗΣ. { TILLA,  
 ix. 4.  
 ΠΡΟΥΜΝΗ. PRUNUS, ix. 1.  
 ΡΟΔΟΝ<sup>b</sup>. } ROSA, i. 15, 22.  
 ΡΟΔΩΝΙΑ. } vi. 1, 6, 7.  
 ρ. πενταφυλλ. vel κυνοροδον. R. *Ca-*  
*nina*.

ρ. διχαφυλλ. incert.  
 ρ. ιικοσιφυλλ. R. *Cinnamomea*.  
 ρ. εκατονταφυλλ. R. *Centifolia*.  
 { Punica, *granata*, i. 4,  
 'ΡΟΙΑ. { 8, 9, 14, 16, 19, 21,  
 'ΡΟΑ. { 22, 23, 24. iii. 7. iv.  
 6, 14. vi. 1  
 ΣΤΡΟΥΘΙΟΝ. Pyrus, *Cydonia*,  
 ii 3<sup>c</sup>.  
 ΣΠΟΔΙΑ. vi. 3. Vid. Κοκκυ-  
 μηλία.  
 ΧΑΜΑΙΒΑΤΟΣ. Vid. Βατος.  
*Polyandria*.  
 ΑΚΟΝΙΤΟΝ. Aconitum, *Ly-*  
*coctonum*, ix. 16, 17.  
 ΑΝΕΜΩΝΗ<sup>d</sup>. ANEMONE, vi.  
 7. vii. 8.  
 ΑΤΡΑΓΕΝΗ<sup>e</sup>. Clematis, *Ori-*  
*entalis* ?  
 ΓΛΥΚΥΣΙΔΗ. Vid. Παιωνία,  
 ix. 9.  
 ΕΛΕΒΟΡΟΣ. HELLEBORUS,  
 iv. 6. vi. 2. ix. 9, 11, 15.  
 i. μελας<sup>f</sup>.  
 i. λευκος.  
 ΚΑΠΠΑΡΙΣ. Capparis, *spinosa*,  
 i. 6. iii. 3, 5, 1. vii. 8.

<sup>a</sup> Pyrus, *malus* statu sylvestri non notatur (Ang. "Crab-tree.")

<sup>b</sup> Rosa, *canina* L. Κυνοροδον Theophr. N. B. Vox Ροδωνία fere semper *rosetum* indicat, ut et Ιωνία violetum; sed quandoque, ut suspicor, plantam ipsam.

<sup>c</sup> Στρουθίου genera duo, quorum alterum Gypsophila, *Struthium*, L. Vid. Decandria.

<sup>d</sup> Vid. Ανεμώνη Λειμωνία Hexandr. sed secundum alios Ανιμώνη simpliciter, A. *hortensis*. A. *λειμωνία*, A. *pratensis* vel *nemorosa*.

<sup>e</sup> Genus Atragene Linn. apud Bauhin. vocatur Clematis. N. B. Planta hæc forf. Clematis, *Vitalba* L.

<sup>f</sup> Icones nitidissimæ plantarum Corollarii Tournefortiani, ab ipso depictæ in Annalibus Musei Hist. Nat. Parisiis nuperrime prodire. Inter has H. *niger*, *Orientalis*, vel H. *niger* Theophrasti accurate delineatur, "foliis Pla-

ΚΙΣΤΟΣ<sup>a</sup>. *Cistus*, vi. 2.  
 ΛΩΤΟΣ<sup>b</sup>. *Nymphæa*, *Lotus*,  
 iv. 10.  
 ΜΕΛΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ<sup>c</sup>. *Melitis*,  
*Melissophyllum*.  
 ΜΗΚΩΝ. *Papaver*, *Oriente*,  
 i. 15, 18, 19.  
 ΝΥΜΦΑΙΑ<sup>d</sup>. *Nymphæa*, *Nelumbo*,  
 ix. 13.  
 ΦΙΛΥΡΑ<sup>e</sup>. *Tilia*, *Europæa*, i.  
 16, 20. iii. 4, 6, 7, 9, 10.  
 v. 1, 4, 6, 8.  
 ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΝ. *Chelidonium*,  
*majus*, vii. 14.

*Didynamia.*

ΑΓΝΟΣ. *Vitex*, *agnus castus*, i.  
 4, 21, 22, 23.  
 ΑΙΜΑΔΩΡΟΝ<sup>f</sup>. *Orobanche*?  
 viii. 8.  
 ΑΜΑΡΑΚΟΣ. *Origanum*, *Ægyptiacum*.  
 ΓΛΗΧΩΝ. } *Mentha*, *Pule-*  
 ΒΛΗΚΩΝ. } *gium*, vii. 5.

ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. *Origanum*,  
*Dictamnus*, ix. 16.  
 ΕΡΠΥΛΛΟΝ. *Thymus*, *serpyllum*,  
 i. 15. vi. 1, 6, 7.  
 ΕΤΖΩΜΟΝ<sup>g</sup>. *Satureia*, *bortensis*,  
 i. 9. vii. 1, 3, 6.  
 ΘΥΜΒΡΑ<sup>h</sup>. } *Thymbra*, vi.  
 ΘΥΜΒΡΟΝ. } 1, 2. vii. 1, 6.  
 ΘΥΜΟΝ. *Thymus*, *vulgaris*,  
 i. 19. vi. 1, 2. viii. 1, 6.  
 ΙΦΥΟΝ. } *Lavandula*, *spica*?  
 ΙΦΥΣΟΝ. } vi. 7.  
 ΚΡΑΤΑΙΟΓΟΝΟΝ<sup>i</sup>. *Euphrasia*,  
*odontitis*? ix. 19.  
 ΜΕΛΑΜΠΥΡΟΣ. *Melampyrum*,  
*arvense*, viii. 8.  
 ΜΙΝΘΑ<sup>k</sup>. *Mentha*, vi. 7.  
 ΟΚΙΜΟΝ. } *Ocimum*, *Basilicum*,  
 ΟΚΥΜΟΝ. } i. 9, 16. vii.  
 1, 2, 3, 6.  
 ΟΡΙΓΑΝΟΣ. *Origanum*, *majorana*,  
 i. 19. vi. 1.  
 δ. λευκη.  
 δ. μελαινα.

tani, fed divifuris pluribus," Turcis hod. "Zopteme." Opera pretium erit descriptionem cel. Desfontaines perlegere, Ann. Mus. A. vi. fasc. 4. p. 278.

<sup>a</sup> In ed. Bas. legitur *Κιστος*.

<sup>b</sup> Tres *Λωτοι*. Vid. *Diadelph.* et *Polygam.*

<sup>c</sup> Rectius forsan *Melissa*, *officinalis* *Didyn.*

<sup>d</sup> *Nymphæa Lotus* et *N. Nelumbo* spec. ejusdem generis. Nescio an recte nominantur; ambo crescunt in Lacu Orchomeni, et in Nilo fluvio.

<sup>e</sup> Vox *Φιλλυρα* *Phillyream* indicat, duplici λ. Vid. *Diandr.*

<sup>f</sup> Parasitica pl. radici vel cauli adnascens. N. B. Vox *Orobanche* minus proprie a Linn. usurpatur. Vid. *Pl. Class. incert.*

<sup>g</sup> *Eruca* quorundam. Ex suavitate et usu in jure condiendo nomen Græcum. Angl. "Winter Savoury," quod id. significat ac vox Gr.

<sup>h</sup> An *Hyssopus*, *officinalis* L. vel *Satureia*, *Thymbra*.

<sup>i</sup> Nulla *Κραταιογονου* apud Linn. mentio inter synonyma. Forf. *Melampyrum*, *album* Ger. em.

<sup>k</sup> *Menthæ* 14 spec. Linn. Sp. Pl. 204.



ΠΡΑΣΙΟΝ. Marrubium, *album*,  
vi. 1, 2.

ΣΗΣΑΜΟΝ<sup>a</sup>. Sefamum, *Ori-*  
*entale*, i. 18. viii. 1, 3, 4, 7

ΧΑΜΑΙΔΡΥΣ<sup>b</sup>. Teucrium,  
*Chamædrys* ? ix. 10.

ΨΕΤΔΟ-ΔΙΚΤΑΜΝΟΣ. Ori-  
ganum, *Ægyptiacum*, ix. 16.

### *Tetradynamia.*

ΡΟΓΓΥΛΙΣ. Brassica, *Rapa*, i.  
9, 10. vi. 7. vii. 1, 2, 3, 4, 5,  
9.

γ. ἡμικρα.

γ. αγρια. vii. 6.

ΕΡΥΣΙΜΟΝ<sup>c</sup>. Erysimum, *offi-*  
*cinale*, viii. 3, 7.

ἙΣΠΕΡΙΣ. Hesperis, *matrona-*  
*lis*. de C. Pl. vi.

ΚΑΡΔΑΜΟΝ. Sifymbrium, *Na-*  
*sturtium*, i. 19. vii. 1, 4

ΝΑΠΥ. Sinapi, *nigrum*, i. 19.  
vii. 1, 4.

ΡΑΦΑΝΙΣ. Raphanus, *fativus*,  
i. 4, 9, 10. vii. 2, 3, 4.

ρ. Καρινδια. ρ. Λεοθαλασσια.

ρ. Κλωνια. ρ. Βοιωτικα.

ΡΑΦΑΝΟΣ. Brassica, *oleracea*,

i. 9, 15, 16, 23. iv. 20. vii.  
1, 4.

ρ. ουλοφυλλος, "curled Savoy."

ρ. λισοφυλλος, "smooth Cabbage."

ρ. αγρια, B. *arvensis*.

### *Monadelphia.*

ΑΛΘΑΙΑ. Lavatera, *arborea*, ix,  
15. 19.

ΕΡΙΟΦΟΡΑ. Gossypium, *arbo-*  
*reum*, iv. 9.

ΜΑΛΑΧΗ<sup>d</sup>. Althæa, *officina-*  
*lis*.

### *Diadelphia.*

ΑΡΑΚΟΣ<sup>e</sup>. Vicia, *cracca* ? viii.  
8.

ΑΡΑΧΙΔΝΑ<sup>f</sup>. Lathyrus, *am-*  
*phicarpus*, i. 1. 11.

ΑΦΑΚΗ. Lathyrus, *Aphaca* ? i.  
5, 6, 10.

ΔΟΛΙΧΟΣ. Phaseolus, *vulga-*  
*ris*, viii. 3, 10.

ΕΒΕΝΟΣ<sup>g</sup>. Ebenus, *Cretica*,  
i. 8, 9. iv. 5. v. 4, 5. ix. 22.

ΕΡΕΒΙΝΘΟΣ<sup>h</sup>. Ervum, *Lens*,  
viii. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10.

ΘΕΡΜΟΣ<sup>i</sup>. LUPINUS, i. 6, 12.  
iii. 3. viii. 1, 2, 7, 10.

<sup>a</sup> Sefamum inter Σιταδη Ανωθυμα; semina forsan ad usus culinariorum.

<sup>b</sup> Veronicae species sub nomine triviali *Chamædrys*. Vid. Diandr.

<sup>c</sup> Inter plantas Αρουραιας cum Sefamo. Forfan E. *barbarea*.

<sup>d</sup> Affinitas satis arcta inter Αλθαϊαν et Μαλαχην. Posterior forsan nominanda *Μαλακη* ex mollitie foliorum.

<sup>e</sup> Ex sono vocis forsan Linn. nomen triviale inditum. Var. Αρακου ὁμοιος dist.

<sup>f</sup> Error videtur textus; forsan scribendum Αρακιδνα ab Αρακα, quia habitu affines ambo: occurrit Αρακου ὁμοιος cum Arachidna, i. 11.

<sup>g</sup> Quare Ebenus *Cretica* L.? antiquis spec. certe nota. Vid. desc.

<sup>h</sup> Inter culta Αρουραια.

<sup>i</sup> Lupinorum apud antiquos mentio frequens in cibis: forfan L. *fativus* flore albo Bauh.

ΚΕΡΑΣΒΟΛΟΝ. Vid. Ερεβιν- θος.	ΟΡΟΒΟΣ <sup>f</sup> . OROBUS. vii. 6. viii. 1, 5, 10.
ΚΟΛΟΥΤΕΑ <sup>a</sup> . COLUTEA, i. 18. iii. 14, 17. κ. Ἰδαία. κ. περι Λιπαράν. κ. Φρυγανώδης.	ΠΕΛΕΚΙΝΟΣ. Coronilla, <i>secu- ridaca</i> , viii. 8.
ΚΛΥΜΕΝΟΝ <sup>b</sup> . Lathyrus, <i>Cly- menum</i> ix. 9.	ΠΙΣΟΣ. Pisum, <i>fativum</i> , viii. 1, 2, 3, 5, 10.
ΚΡΙΟΙ ΟΡΟΒΙΑΙΟΙ <sup>c</sup> . Cicer, <i>Arietinum</i> , viii. 5.	ΤΡΑΓΑΚΑΝΘΑ. Astragalus, <i>Tragacantha</i> , ix. 1, 8, 15.
ΚΥΑΜΟΣ <sup>d</sup> . Vicia, <i>Faba</i> , viii. 1, 2, 3, 5, 10.	ΦΑΚΟΣ <sup>g</sup> . ERVUM? iv. 5. viii. 1, 3, 5.
ΚΥΤΙΣΟΣ. CYTISUS, i. 9. v. 4. κ. δένδρωδης. Cyt. <i>Laburnum</i> . κ. Φρυγανώδης. Medicago, <i>arbo- rea</i> .	ΩΧΡΟΣ. Pisum, <i>Ochrus</i> , viii. 3, 10.
ΛΑΘΥΡΟΣ. Lathyrus, <i>fativus</i> , viii. 3, 10.	<i>Polyadelphia</i> .
ΛΩΤΟΣ <sup>e</sup> . Lotus, <i>Melilotus</i> , vii. 1, 9, 14.	ΜΗΛΕΑ ΜΗΔΙΚΑ. Citrus, <i>Medica</i> , i. 22.
ΜΕΛΙΛΩΤΟΣ. Trifolium, <i>offi- cinale</i> . de C. Pl. l. vi.	ΜΗΛΕΑ ΠΕΡΣΙΚΑ. Citrus, <i>Aurantium</i> , iv. 4 <sup>h</sup> .
ΜΗΔΙΚΗ. Medica, <i>fativa</i> , viii. 8.	<i>Syngenesia</i> .
ΟΝΩΝΙΣ. Ononis, <i>Antiquo- rum</i> ? vi. 1, 4, 5.	ΑΒΡΟΤΑΝΟΝ. Santolina, <i>Ros- marinifolia</i> ? i. 15. vi. 1, 7.
	1. ΑΚΑΝΘΑ <sup>i</sup> . { Atractylis, gummife- ra? iv. 5, ΑΤΡΑΚΤΥΛΙΣ. { vi. 3, 4. ix. 1.

<sup>a</sup> Forfan C. arborescens desc. ὡς δένδρον μέγα, iii. 14. Nomen ex κολουω, de actione folia colligendi, et præparandi ad usus pecorum faginandorum.

<sup>b</sup> Κλυμενον Theophr. medicinale valde, et forsan diversum. Κλυμενον Diosc. Calendula, *officinalis*, secundum alios Lathyrus, *Clymenum* L. De viribus inquirendum.

<sup>c</sup> Ex forma seminis caput arietis referente?

<sup>d</sup> Κυαμος alter occurrit in Claff. Gynandr. Arum, *Colocasia* L.

<sup>e</sup> Tres Loti. Vid. Claff. Polyandr. et Polygam.

<sup>f</sup> Enumeratur cum Ερεβινθῳ; spec. culta forsan antiquitus; an Ervum, *Er-  
vilia*?

<sup>g</sup> Affinis Ερεβινθου, forfan E. *hirsutum*. N. B. Spec. Indica memoratur, iv. 5.

<sup>h</sup> Dicitur inedulibus esse, sed fragrans. Var. quædam ignota.

<sup>i</sup> Spec. Indica, Cardui affinis, gummiifera.

2. ΑΚΑΝΘΑ ΑΦΥΛΛΟΣ. Spec. ignota, iv. 5.	ΑΦΙΑ. <i>Caltha, palustris</i> , vii. 8.
3. ΑΚΑΝΘΑ, ΔΙΨΑΣ <sup>a</sup> . Spec. ignota, iv. 8.	ΑΨΙΝΘΙΟΝ. <i>Artemisia, Ab-</i> <i>sinthium</i> , i. 19. iv. 6. vii. 9.
4. ΑΚΑΝΘΑ ΙΝΔΙΚΗ. Vid. <i>Ακανθα</i> n. i.	ΕΛΕΙΟΧΡΥΣΟΣ. <i>Caltha, pa-</i> <i>lustris?</i> vi. 7. ix. 21.
5. ΑΚΑΝΘΑ ΚΕΑΝΩΘΟΣ. <i>Serratula, arvensis</i> , iv. 5, 11.	ΗΡΙΓΕΡΩΝ. <i>Erigeron, graveo-</i> <i>lens</i> , vii. 7, 8.
6. ΑΚΑΝΘΑ ΤΡΙΟΖΟΣ. Spec. ignota, iv. 5.	ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ. } <i>Lactuca, sati-</i> ΘΡΙΔΑΧ. } <i>va</i> , i. 16, 19. 6. ix. 8.
7. ΑΚΑΝΘΑ ΉΡΑΚΛΕΙΑ. Spec. ignota, iv. 5.	ΘΡΙΔΑΚΙΝΗ αγρία. <i>Lactuca,</i> <i>sylvestris</i> .
8. ΑΚΑΝΘΑ ΧΑΛΚΕΙΟΣ. vi. 3.	ΙΞΙΝΗ <sup>c</sup> . <i>CARDUUS</i> , vi. 3, 4. ix. 1.
ΑΚΑΡΝΑ. } <i>Carduus, Acarna,</i> ΑΚΟΡΝΑ. } i. 16. vi. 3, 4.	ΙΟΝ. } <i>Viola, odorata</i> , i. 15.
ΑΝΔΡΥΑΛΙΑ <sup>b</sup> . <i>Andryala, inte-</i> <i>grifolia?</i> vii. 7.	ΙΩΝΙΑ <sup>f</sup> . } vi. 1, 6, 7. viii. 6. i. λευκή. i. μελαινα <sup>g</sup> .
ΑΝΘΕΜΙΟΝ <sup>c</sup> . } <i>ANTHEMIS?</i> i. ΑΝΘΕΜΟΣ. } 22. vii. 9, 12, 13.	KENTATPEA. } <i>Centaurea,</i> KENTATPION. } <i>Centauri-</i> um, i. 19. iv. 6. vii. 9. ix. 1.
ΑΤΡΑΚΤΤΑΙΣ. Vid. <i>Ακανθα</i> 1.	KIXΩΡΙΟΝ. <i>Cichorium, Inty-</i> <i>bus</i> , i. 16. vii. 7, 8, 9, 11.
ΑΦΑΚΗ <sup>d</sup> . <i>Leontodon, Taraxi-</i> <i>cum</i> .	

<sup>a</sup> In Lybiæ arenosis, aridissimis; herba prorsus deficiente. N. B. Spec. οὐλο *Ακανθων* huc referuntur, etsi forsan nonnullæ nihil habeant affinitatis cum *Carduis*, spinis exceptis. A peregrinantibus sedulo investigandæ sunt hæ species.—*Ακανθα* Nov. Test. perperam interpretatur “thorn.”

<sup>b</sup> Nulla *Andryaliæ* mentio inter synonymia Linn. Forf. *Sonchus, asper* Linn.

<sup>c</sup> Forfan *Matricariæ*, vel *Cotulæ*, spec.

<sup>d</sup> Datur *Lathyri* species *Αφακη* dict. vid. *Diadelph.* aliis *Απατη* dict.

<sup>e</sup> Spec. Gummi mastiche ferens. N. B. *Ixine* Fabii Columnæ. i.

<sup>f</sup> Vid. not in *Ῥοδωνία* Cl. Icofandr.

<sup>g</sup> Purpureo-nigra, “the dark blue double violet,” Ang.



ΚΝΙΚΟΣ. } CNICUS? i. 22. vi.	vii. 7, 11.
ΚΝΗΚΟΣ. } 3, 4.	ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ. CARLINA? vi.
ΚΟΜΗ ῥ. Tragopogon, <i>Orien-</i>	3. ix. 13.
<i>tale</i> ? vii. 7 <sup>a</sup> .	χ. λευκος. C. acaulis.
ΚΟΝΤΖΑ <sup>b</sup> . CONYZA? vi. 1, 2.	χ. μελας. Carthamus, <i>corymbo-</i>
ΚΟΡΚΟΡΟΣ. Hieracium, <i>mu-</i>	<i>pus</i> .
<i>rorum</i> .	ΧΟΝΔΡΙΛΛΑ <sup>b</sup> . Chondrilla,
ΛΕΤΚΑΚΑΝΘΑ <sup>c</sup> . Onopor-	<i>juncæ</i> , vii. 11.
<i>dum</i> , <i>Acantium</i> , vi. 3.	<i>Gynandria</i> .
ΜΕΛΑΝΙΟΝ. Vid. Iov, vi, 6,	ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΙΑ. ARISTOLO-
7.	CHIA, ix. 13, 15, 22.
ΠΙΚΡΙΣ <sup>d</sup> . PICRIS? vii. 9,	ΑΡΟΝ. Arum, <i>Dracunculus</i> , i.
11.	9, 10. vii. 9, 12.
ΣΚΟΛΥΜΟΣ <sup>e</sup> . Scolymus, <i>Hif-</i>	ΒΟΥΚΕΡΑΣ. Ophrys, <i>nidus a-</i>
<i>panicus</i> , vi. 3, 4. vii. 10, 14.	<i>vis</i> ? viii. 8.
ΣΟΓΧΟΣ. Sonchus, <i>oleraceus</i> ,	ΔΡΑΚΟΝΤΙΟΝ. Arum, <i>macu-</i>
vi. 4, 3.	<i>latum</i> , ix. 22.
ΣΤΟΙΒΗ <sup>f</sup> . Centaurea, <i>Stæbe</i> ,	ἙΛΛΕΒΟΡΙΝΗ <sup>i</sup> . Serapias,
i. 16. vi. 1.	<i>Helleborine</i> , ix. 11.
ΤΡΑΓΟΠΩΓΩΝ. Vid. Κομη	ΚΥΑΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑ <sup>k</sup> . Arum,
<i>supra</i> , vii. 7.	<i>Colocasia</i> , iv. 9. vii. 3.
ὑΠΟΧΟΙΡΙΣ <sup>g</sup> . HYPOCHÆRIS?	ΟΡΧΙΣ <sup>l</sup> . ORCHIS.

<sup>a</sup> Κατ' ἐξοχὴν ita dict. N. B. Ex voce κομη, rectius forsan Geropogon, *glaber*. Vid. infra, Τραγοπωγων.

<sup>b</sup> Conyzæ Linn. spec. 19. valde affines Erigerontis: in loco natali investigandæ.

<sup>c</sup> Spina alba Bauhini.

<sup>d</sup> Ita dict. ab amaritudine; nescio an Picris Linn.

<sup>e</sup> Radix edulis. N. B. Cynara, *Scolymus* Linn. Angl. "the Artichoke." Theophr. ignota, ut videtur.

<sup>f</sup> Genus Stæbe non occurrit apud Linn. sed Bauhinum et Clusium sequor.

<sup>g</sup> Bis occurrit inter Cichoracea.

<sup>h</sup> Plures Chondrillæ inter pl. affines: Sonchus, Prenanthes, Leontodon, Hieracium, Lapsana, Erigeron, Centaurea. Videant Peregrinatores.

<sup>i</sup> Forsan Satyrium.

<sup>k</sup> Κυαμος simpliciter Vicia, *faba*. Vid. Diadelph.

<sup>l</sup> Inter 32 species Orchidis difficillimum foret feligare; maxime communis, Orchis, *morio* L.

*Monæcia.*

ΑΙΓΙΑΩΨ<sup>a</sup>. *Quercus*, *Ægilops*, iii. 9.

ΒΛΙΤΟΝ. *Amaranthus*, *Blitum*, i. 23. vii. 1, 2, 3, 4.

ΒΟΥΤΟΜΟΣ<sup>b</sup>. *SPARGANIUM*? i. 8, 16. iv. 9, 11.

ΓΛΕΙΝΟΣ. Vid. *Ζυγία*, iii. 4.

ΔΙΟΣ ΒΑΛΑΝΟΣ. *Fagus*, *Castanea*, iii. 3, 4, 6, 7. iv. 6.

ΔΡΥΣ<sup>c</sup>. *QUERCUS*, i. 8, 9, 13. 16. iii. 4, 6, 7, 9. iv. 6. v. 5, 6, 10.

1. δ. ἡμερίς. q. *Robur*.

2. δ. αἰγίλωψ. (supr.) q. *Ægilops*.

3. δ. πλατυφυλλος.

4. δ. φηγος. q. *Esculus*.

5. δ. ἀλιφλοιος.

6. δ. φελλος. q. *Suber*.

7. δ. ετυμοδρυσ.

8. δ. οσπρίς. q. *Cerris*?

ΕΛΑΤΗ<sup>d</sup>. *PINUS*, i. 6, 8, 9, 13, 15, 16. iii. 8, 10. iv. 1, 6, 7, 19. v. 1, 2, 4, 7, 8. vi. 2. ix. 1.

ε. ἀρρήν. *P. Abies*.

ε. θηλεία. *P. Picea*.

ΖΥΓΙΑ. *Carpinus*, *Betulus*, iii. 4, 6, 7. v. 1, 4.

ΗΡΑΚΛΕΩΤΙΚΗ, *καρυα*. *CORYLUS*, i. 4, 16, 17, 19. iii. 3, 4, 6, 7, 8.

ἡ. ἡμερος. *C. Colurna*.

ἡ. αγρία. *C. Avellana*.

ΘΥΙΑ. *Thuja*, *aphylla*, i. 15. iii. 6. iv. 1.

KAPTA <sup>e</sup> Ευβοϊκή.	{	Juglans,
KAPTA Περσική.		<i>Regia</i> , iii.
KAPTA Βασιλική.		6, 7. iv.
		6. v. 5.
		8, 10.

ΚΛΗΘΡΑ. *Betula*, *Alnus*, i. 7. iii. 4, 5, 6, 7, 14. iv. 9.

ΚΟΙΞ. *Coix*, *Lachryma Jobi*, i. 16.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΗ. *Cucumis*, *Colocynthis*, i. 19, 22. vii. 1, 3, 4, 6.

ΚΡΟΤΩΝ. *Ricinus*, *Palma Cbristi*, i. 16.

ΚΥΠΑΡΙΤΤΟΣ. *Cupressus*, *sempervirens*, i. 8, 9, 13, 14, 15, 16. iii. 3. iv. 3, 6. v. 5.

ΛΕΜΝΑ. *Lemna*, *trifcula*, iv. 11.

<sup>a</sup> *Ægilops graminis* spec. v. *Polygamia*.

<sup>b</sup> Spec. affinis *Cyperis*: non *Butomus* L.

<sup>c</sup> *Quercus* spec. apud Linn. Sp. Pl. enumerantur 14; inter quas *Q. Phellus*. N. B. Vox *Phellus* minus proprie generi novi orbis attribuitur a Linneo. δρ. ἀλιφλοιος forsan αλλοφλοιος, (cortice duplici,) fyn. *Q. Suberis*. ετυμοδρυσ forsan. *Q. Robur*. N. B. An *Q. Ilex* L.?

<sup>d</sup> Genus *Pinus* L. dividitur in species foliis simplicibus *Ελάτη*; et species foliis basi unitis *σπαθοφυλλοις*, ut *Πευκη*, *Πίτυς*. vid.

<sup>e</sup> *Καρυον* neutr. gen. *Nux*. Vid. not. ad finem Cat. Alph.

ΟΞΥΤΑ <sup>a</sup> . <i>Fagus, sylvatica</i> , i. 16. ii. 6, 7. v. 5, 8. vii. 13.	ΣΙΚΤΑ. <i>CUCURBITA</i> . de C. Pl. v.
ΟΣΤΡΥΑ. } <i>Carpinus, Betulus</i> , ΟΣΤΡΥΙΣ. } i. 13. iii. 4, 7, 10.	ΣΙΚΤΟΣ <sup>d</sup> . <i>Cucumis, sativus</i> , i. 19, 22. vii. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10. ix. 10, 15.
ΟΣΠΡΙΣ. Vid. Δρυς.	ΣΙΚΤΟΣ αγριος. <i>MOMORDICA</i> , vii. 10.
ΠΕΤΚΗ <sup>b</sup> . <i>Pinus, Pinea</i> , i. 6, 8, 9, 13, 15, 16, 19. ii. 2, 3. iii. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10. iv. 1, 6, 19. v. 1, 2, 7, 8, 9. ix. 1, 2.	ΣΜΙΛΑΞ. <i>Quercus spec. ita</i> ab Arcadibus vocata, iv. 7.
π. παραλιας. <i>P. Pinafter</i> . π. Ιδαια. qu.	ΣΤΥΡΑΞ. <i>Liquidambar, styra-</i> <i>ciflua</i> , ix. 7.
1. ΠΙΤΥΣ. <i>Pinus, sylvestris</i> , i. 9, 15, 16, 19. ii. 2, 3. iii. 1, 4, 6, 8, 10. iv. 1, 6, 19. v. 1, 2, 7, 8, 9. ix. 1, 2.	ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ <sup>c</sup> . <i>Morus, nigra</i> , i. 19, 21, 22. v. 4, 5, 7, 8.
2. ΠΙΤΥΣ Κωνοφορος. iii. 10.	ΤΥΦΗ <sup>f</sup> . <i>Typha, latifolia</i> , i. 8. iv. 11.
ΠΛΑΤΑΝΟΣ. <i>Platanus, Orien-</i> <i>talis</i> , i. 7, 13, 16. iii. 1, 6, 7. iv. 7, 9, 14, 18. v. 4, 8.	ΦΕΛΛΟΔΡΥΣ. } Vid. Δρυς. ΦΕΛΛΟΣ. }
ΠΡΙΝΟΣ <sup>c</sup> . <i>Quercus, Prinus</i> , i. 9, 15, 16. iii. 4, 5, 6, 7, 8, 15. v. 7, 8. ix. 4.	ΦΗΓΟΣ. Vid. Δρυς.
ΠΥΞΟΣ. <i>Buxus, sempervirens</i> , i. 8, 9, 13, 15. iii. 4, 7, 15. v. 4, 5, 7, 8.	<i>Diœcia.</i>
ΣΗΜΥΔΑ. <i>Betula, alba</i> , iii. 14.	ΑΙΓΕΙΡΟΣ. <i>Populus, nigra</i> , i. 8. ii. 3, 4, 5, 6, 7, 14. iv. 14.
	ΑΡΚΕΥΘΟΣ. <i>Juniperus, com-</i> <i>munis</i> , i. 15. iii. 4, 6, 7. iv. 1. v. 8.

<sup>a</sup> Folio rigido acuto, unde nomen.

<sup>b</sup> Difficile admodum ex Theophr. verbis distinguere inter Πευκην et Πιτυν: annon prior *P. Pinea* vel *Cembra*? *P. Larix* obscure innuitur i. 15. ubi inter αειφυλλα, πευκης τι γενος occurrit; necesse est igitur aliud genus esse deciduum.

<sup>c</sup> Species hæc non enumeratur inter *Quercus* Theophrasti, sed ut genus diversum, foliis utrinque acuminatis.

<sup>d</sup> Nulla Cucumeris *Melonis* L. apud Theophrastum mentio, cujus hab. ignotum.

<sup>e</sup> Occurrit *Ficus spec.* apud Linneum sub nomine *F. Morus*. Vid. etiam Συκαμινος Αιγυπτια. Polygam.

<sup>f</sup> Occurrit hîc vox τυφη, vitio textûs, in codd. quibusdam. Vid. Τριανδ. Triandr.



ΔΑΦΝΗ<sup>a</sup> Αλεξανδρεια, *Ruscus*,  
*kyrophyllum*, i. 16. iii. 7.

ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ<sup>b</sup>. *Myrica*, *Gale*,  
iv. 11.

ΙΞΙΑ<sup>c</sup>. *Viscum*, *album*, iii. 9,  
16. ix. 1.

ΙΤΕΑ. *SALIX*, i. 7, 8. iii. 1, 2,  
4, 6, 7, 13. iv. 7, 11, 14, 19.  
v. 8, 4.

i. λευκη.

i. μελαινα.

i. ελικη.

ΚΕΔΡΙΣ. } *Juniperus*, *Sabina*,  
ΚΕΔΡΙΑ. } i. 15.

ΚΕΔΡΟΣ<sup>d</sup>. *Juniperus*, *Oxyce-*  
*drus*, i. 8, 15, 16. iii. 7, 12.  
iv. 6, 19. v. 5, 8, 9. ix. 1.

ΚΕΝΤΡΟΜΥΡΡΙΝΗ. *Ruscus*,  
*aculeatus*, iii. 17.

ΛΕΥΚΗ<sup>e</sup>. *Populus*, *alba*, i. 16.  
iii. 1, 4, 6, 7, 10, 14. iv. 14,  
19.

ΛΙΒΑΝΟΣ<sup>f</sup>. *Juniperus*, *Lycia*?  
ix. 1.

ΜΙΛΟΣ. *Taxus*, *baccata*, iii. 4,  
6, 7, 10. iv. 1. v. 8.

ΜΥΡΙΚΗ<sup>g</sup>. *Myrica*, *Cordifolia*,  
i. 15, 16. iii. 4. iv. 7. v.  
6.

ΣΜΙΛΑΞ. *Smilax*, *aspera*, i.  
15, 16, 18. vii. 8.

	} <i>Pistacia</i> , <i>Te-</i> <i>rebintus</i> , i.
ΤΕΡΕΒΙΝΘΟΣ.	
ΤΕΡΜΙΝΘΟΣ.	

15. iii. 4,

6, 15. v.

8. ix. 1, 2.

### *Polygamia.*

ΑΙΓΙΛΩΨ. *Ægilops*, *ovata*, vii.  
12. viii. 7, 8.

ΑΚΑΝΘΟΣ<sup>h</sup>. *Mimosa*, *Nilo-*  
*tica*, iii. 4. iv. 3. vi. 1.

	} <i>ATRIPLEX</i> ,
ΑΝΔΡΑΦΑΞΥΣ.	
ΑΤΡΑΦΑΞΙΣ.	i. 23. vii. 1,
	2, 3, 4, 6.

ΕΡΙΝΕΟΣ. *Ficus*, *Caprificus*,  
(vid. Συκη, p. 22.) i. 24. ii.  
3, 4, 6. iii. 6. iv. 14. v. 7.

ΙΣΧΑΙΜΟΣ. *Andropogon*, *If-*  
*chæmum*, ix. 15.

ΚΕΡΩΝΙΑ<sup>i</sup>. *Ceratonia*, *siliqua*,  
i. 18, 23. iv. 2.

<sup>a</sup> Vide infr. Κεντρομυρρίνη ambo sub nomine, *Ruscus* L.

<sup>b</sup> *Chamæleagnus* Dodon.

<sup>c</sup> *Fructus* Ιξίας expresse vocatur diversus a fr. Τφεατος. Vid. *Class.* incert.  
p. 29.

<sup>d</sup> *Cedri* species omnes sub genere, *Juniperus* L.

<sup>e</sup> Vid. Αιγείρος sup. Forſan *Populus tremula* L. nisi Europæ frigidioribus  
propria.

<sup>f</sup> Notam dubitationis adjeci. Refina Juniperi cujusdam vel Pinûs antiqui-  
tus in usu inter suffimenta. N. B. Vox λιβανον (refina) solummodo occurrit,  
ix. 1.

<sup>g</sup> Vid. Ελεαγνος.

<sup>h</sup> Hodie sub nomine *Acacia* in hortis et alibi ; arbor speciosa.

<sup>i</sup> Observandum *Ceratoniam* et *Ficum* ordinis *Triœcii*. L.

ΑΛΤΟΣ<sup>a</sup>. *Celtis, Australis*, i. 8,  
9, 13. iv. 3, 4.

ΝΑΡΔΟΣ<sup>b</sup>. } *Andropogon*,  
ΝΑΡΤΗ<sup>c</sup>. } *Nardus*, ix. 7.

ΠΕΡΔΙΚΙΟΝ<sup>d</sup>. *Parietaria, officinalis*, i. 11.

1. ΣΥΚΗ<sup>e</sup>. *Ficus, Carica*, i. 5,  
8, 9, 11, 13, 16, 19, 23,  
24. ii. 3, 7. iii. 6, 7, 17. iv.  
2, 6, 14, 16, 19. v. 7.

2. ΣΥΚΗ<sup>f</sup> Αιγυπτια. *Ficus, Religiosa*, i. 23. iv. 2.

3. ΣΥΚΗ Κυπρια. *ib.*

ΣΦΕΝΔΑΜΝΟΣ<sup>g</sup>. *Acer, campestre*, iii. 4, 6, 7, 11. v. 1, 4.

ΤΑΗΜΑ τι<sup>h</sup>. *Mimosa, sensitiva*, iv. 3.

### *Palmæ.*

ΚΟΥΚΙΟΦΟΡΟΣ<sup>i</sup>. *An Cocos?*

iv. 2.

ΚΥΚΑΣ. *Cycas, revoluta*, ii.  
8.

ΦΟΙΝΙΞ. *Phœnix, Dactylifera*,  
i. 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16,  
18, 19, 23. ii. 2, 3, 8.

ΧΑΜΑΙΡΕΦΗΣ. *CHAMÆOPS*,  
ii. 8.

### *Cryptogamia.*

#### *Filices.*

ΑΔΙΑΝΤΟΝ<sup>k</sup>. *ADIANTUM*.

ΉΜΙΟΝΟΣ<sup>l</sup>. *Asplenium, Hemionitis*, ix. 19.

ΘΗΛΥΠΤΕΡΙΣ<sup>m</sup>. *Acrosticum, Thelypteris*, ix. 20.

ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΝ<sup>n</sup>. *POLYPODIUM*.

<sup>a</sup> Vid. *Polyand. et Diadelph.*

<sup>b</sup> Unguentum *Ναρδον* folum memoratur. Spec. Graminis diu latens, cujus radix et spica odoratissima. Vid. Act. Reg. Soc. Lond. 1790.

<sup>c</sup> *Ναρτη* unguenti spec. diversa a *Ναρδη*. Vid. ix. 7. et *Ναιρον*, *Class. incert.*

<sup>d</sup> Nomen adhuc servatur apud Græcos hodiernos *Περδικακι*. Vid. Prodr. Fl. Græc.

<sup>e</sup> Vid. *Ερινεος*, p. 21. N. B. Genus *Ficus*, ordinis *Tricæcii*, L. Theophrastus recte observat ὅλως πολυεῖδες εἶναι τὸ γένος τῶν Συκῶν. de C. Pl. v. Genus *Ficus* in hac Classe collocatur, etsi proprie Genus *Tricæcium*. N. B. *Συκη Ινδικῆ* *Rhizophora* L. Vid. *Dodecandr.*

<sup>f</sup> Arbor hæc perperam vocatur *Συκαμινος*, i. 23. Vid. *Class. Monœc.*

<sup>g</sup> Forfan A. *Pseudo-Platanus* L.

<sup>h</sup> *Mimosa sensitiva* L. etsi sine nomine, descriptione tamen habitûs, et præcipue ἰδιότητι τοῦ παθούς inter plantas Theophrasto notas proculdubie enumeranda est. v. p. 77.

<sup>i</sup> *An Cocos* a *Κουκι*? *Palma, Thebaica*, *Coryphæ* affinis L. Ang. "Doom Tree," Bruce's Trav. v. 45. N. B. Non enumeratur inter sex species *Palmarum*, ii. 8.

<sup>k</sup> *Adiantum* genus L. 19 species continens: ex textura folii humorem repellente, nomen Græcum.

<sup>l</sup> *Hemionitis* L. Genus novi orbis.

<sup>m</sup> Non occurrit Genus *Thelypteris* apud Linn. Planta hæc fronde indivisa (μονοκωλφ.) Vid. Lex. Theophr.

<sup>n</sup> Nomen ex lobis frondis pedes *Πολυποδός* referentibus.

ΠΤΕΡΙΣ<sup>a</sup>. PTERIS.

ΤΡΙΧΟΜΑΝΕΣ. Adiantum,  
Trichomanes.

Musci.

ΦΑΣΚΟΣ<sup>b</sup>. Lichen, pulmona-  
ris.

Algæ.

ΑΓΡΩΣΤΙΣ Ποντια. Zoftera,  
marina, iv. 7.

ΑΜΠΕΛΟΣ Ποντια. Fucus, na-  
tans, vel bacciferus, ib.

ΔΡΥΣ Ποντια, F. vesiculosus, ib.

ΕΛΑΤΗ Ποντια. F. Abies ma-  
rina Gmel, ib.

ΠΡΑΣΟΝ Ποντιον. F. nodosus ?  
ib.

ΠΡΑΣΟΝ ἕτερον. F. loreus ? ib.

ΦΥΚΟΣ<sup>c</sup> Βαπτικον. F. palma-

tus, ib. &c.

ΦΥΚΟΣ Θριδακινη. Ulva, Lac-  
tuca, ib.

ΦΥΚΟΣ πλατυ, τετανωδης. F.  
digitatus, vel F. polyschides, ib.

ΦΥΚΟΣ Μαραθρον. F. fœnicu-  
laceus, ib.

Fungi.

ΑΙΔΟΙΟΙΔΕΣ τι. PHALLUS.

ΑΣΚΙΟΝ<sup>d</sup>. TUBER, i. 10.

ΚΡΑΝΙΟΝ. Lycoperdon, Bo-  
vista.

ΜΥΚΗΣ. AGARICUS ?

ΠΕΖΙΣ<sup>e</sup>. PEZIZA ? de C. Pl.

ΠΙΝΗ. de C. Pl. iv.

ΠΥΞΟΣ. An ΠΥΓΟΣ ?

ΣΦΑΙΡΙΟΝ. PEZIZA<sup>f</sup> ? iii. 8.

ΥΔΑΝΟΝ. HYDNUM ?

<sup>a</sup> Α. πτερυξ, frons alato-pinnata.

<sup>b</sup> Καθαπερ τρυχος οδονιον in truncis arborum. N. B. φασκος item Galla.

<sup>c</sup> Ω, βαπτουσιν ερι περι Κρητην. Hinc Latini fucare pro tingere.

<sup>d</sup> In umbra, vel sub terra proveniens.

<sup>e</sup> Hinc Linnei, et aliorum nomen: synonym. videtur Πυξου apud Ald.

<sup>f</sup> Quinque enumerantur species fungorum in foliis et truncis arborum crescentium, iii. 8.



## ERRATA ET OMISSA.

---

ΑΜΠΕΛΟΣ, Ἰδαία<sup>a</sup>. Vaccinium, *Vitis Idæa*, iii. 17.

ΑΠΑΘΗ. Syn. Αφακής, p. 17.

ΚΑΛΑΜΙΝΘΑ. (vid. Μινθα, p. 14.) de C. Pl. ii.

ΚΕΓΧΡΟΣ<sup>b</sup>. CENCHRUS, viii. 1, 2.

ΚΥΔΩΝΙΟΣ. Pyrus, *Cydonea*, ii. 3.

ΜΗΛΕΑ αγρία. P. *Malus*, fyl-

vestri statu: Angl, "Crab-tree." de C. Pl. vi.

ΟΙΣΟΣ. Salix, *viminalis*, vi. 2.

ΟΡΜΙΝΟΝ αγριον. Salvia, *Scblarea*. de C. Pl. vi.

ΟΧΝΗ. Syn. Αχρας, p. 12.

ΣΥΡΙΓΞ. Species Arundinis, p. 4.

ΧΑΝΔΡΑΣ. Syn. Χονδριλλας, p. 18.

---

<sup>a</sup> Vid. Αμπελος, p. 7. N. B. Locus natalis περι φαλακρας καλουμενας Ἰδης, iii. 17. saxosis et calvis M. Idæ cacuminibus; utpote et altitudo πυγονιαιος, Vaccinii speciem indicant, non obstante sententia in notula, p. 7. expressa.

<sup>b</sup> Rectius Panici spec. cujus semen inter αρουραια et σιτηρα.

# PLANTÆ CLASSIS INCERTÆ.

## A.

ΑΔΩΝΙΣ. v. Ονωνις ?  
 ΑΙΓΕΙΠΤΡΟΣ ? ii. 9.  
 ΑΚΑΛΥΨΗ <sup>a</sup>. vii. 7.  
 ΑΚΑΝΟΣ <sup>b</sup>. ix. 13.  
 ΑΚΑΡΝΙΚΟΣ <sup>c</sup>. iii. 18.  
 ΑΛΣΙΝΗ. ix. 13.  
 ΑΝΑΔΕΝΔΡΑΣ <sup>d</sup>. de C. Pl. v.  
 ANTIPPINON <sup>e</sup>. } ix. 21.  
 ANTIPPIZON. }  
 ΑΠΑΡΓΙΑ. vii. 9.

## ΑΠΙΟΣ <sup>f</sup>.

ΑΣΙΝΗ <sup>g</sup>. de C. Pl. ii.  
 ΑΣΠΑΛΑΞ <sup>h</sup>. } i. 11.  
 ΣΠΑΛΑΞ. }  
 ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ <sup>i</sup>. ix. 7.  
 ΑΦΥΛΛΑΝΘΕΣ. vii. 9.  
 ΑΧΤΝΩΨ <sup>k</sup>.

## B.

ΒΑΛΣΑΜΟΣ <sup>l</sup>. ix. 2, 6, 7  
 ΒΟΛΒΟΣ <sup>m</sup>. i. 10, 16. vii. 2.

<sup>a</sup> Spec. ποωδης cum Τευτλιδι; edulis post coctionem.

<sup>b</sup> Vox ακανος pericarpium Carduorum indicat; sed semel, ut fyn. Χαμοι-  
 λεοντος λευκης.

<sup>c</sup> Forfan Hederæ spec. nomen Gentilitium. Vid. Hederæ varietates, p. 8.

<sup>d</sup> Semel occurrit; Αναδενδρας et Συκη συντροφαι αλληλαις, ib. An Parafita  
 trunco Ficûs innascens?

<sup>e</sup> Forfan planta magica, και γαρ αι ποiei ευκλειαν. forma floris ως μοσχου  
 ρinos.

<sup>f</sup> Videtur Euphorbiæ spec. Vid. Απιος. Pyrus, communis, p. 12.

<sup>g</sup> Cum Έρφυλλα, ut species repens; an error textûs pro Απαρινη?

<sup>h</sup> Semel occurrit, ubi radix crassa memoratur.

<sup>i</sup> Desc. nulla, sed inter Aromata vox occurrit: an fructus vel σπος Ασπαλα-  
 κος. Vid. Σπαλαξ.

<sup>k</sup> Forfan legendum Κυνωψ. Vid.

<sup>l</sup> Forfan Amyris, Gileadenfis, Encycl. Brit.

<sup>m</sup> Allii L. genus radice bulbosa: vel Scilla unifolia Falc<sup>r</sup>. fyn. Βολβινης.  
 Hexandr.

ΒΟΛΒΟΣ <sup>a</sup> Εριοφορος. vii. 13	ΕΛΞΙΝΗ <sup>k</sup> . vii. 7.
ΒΟΥΠΡΗΣΤΙΣ <sup>b</sup> . vii. 8.	ΕΠΙΜΕΝΙΔΕΙΟΣ <sup>l</sup> . vii. 11.
Γ.	ΕΝΘΟΥΣΙΚΟΝ <sup>m</sup> . vii. 7.
ΓΛΕΙΝΟΣ <sup>c</sup> . iii. 4.	ΕΠΙΠΕΤΡΟΝ <sup>n</sup> . vii. 8.
Δ.	ΕΥΩΝΥΜΟΣ <sup>o</sup> . iii. 18.
ΔΑΥΚΟΝ <sup>d</sup> Δαφνοειδες. ix. 15,	Η.
22.	ΗΔΥΟΣΜΟΣ <sup>p</sup> . vii. 7.
ΔΕΝΔΡΟΝ <sup>e</sup> Τηγρινον. v, 4.	Θ.
6.	ΘΗΛΥΦΟΝΟΝ <sup>q</sup> . ix. 19.
ΔΡΥΠΙΣ <sup>f</sup> .	Ι.
Ε.	ΙΕΣΙΑ <sup>r</sup> . de C. Pl. v.
ΕΛΑΘΗΡΙΟΝ <sup>g</sup> . iv. 6.	ΙΚΑΜΗ <sup>s</sup> . } iv. 11.
ΕΛΕΙΟΛΕΙΜΩΝΙΑ <sup>h</sup> . vi. 4.	ΙΚΜΗ. }
ΕΛΕΝΙΟΝ <sup>i</sup> . vi. 6, 7.	

<sup>a</sup> Spec. incognita, Hyacintho Peruviano forsan affinis, cujus bulbus *εχει το εριον υπο τους πρώτους χιτωνας*. vii. 13.

<sup>b</sup> A quibusdam Bupleurum, *rigidum*.

<sup>c</sup> Spec. *Ζυγίας*· εν τῇ ὄρει *Ζυγία*· εν δε πεδίῳ *Γλεινος*. Vid. *Ζυγία* Monœc.

<sup>d</sup> Spec. venenosa, sine desc. forf. *Thapsia* L.

<sup>e</sup> Arbor, cujus lignum densum et pulchre variegatum.

<sup>f</sup> Δρυπεψ usurpatur de fructibus deciduis: vid. Lex. Theophr. Hic planta spinosa designatur. N. B. Vox *Drupa*, Bot. Bacca, nucleo intus.

<sup>g</sup> Enumeratur in Catalogo cum Helleboro et Scammonia; forf. *Momordica*, *Elaterium* L.

<sup>h</sup> Aliis *Λυλειμωνία*, palustris planta; textus certe corruptus

<sup>i</sup> Differt ab Helenio L.

<sup>k</sup> An Polygoni scandentis spec. vel *Fumaria claviculata*, vel *capreolata*.

<sup>l</sup> Nomen triviale spec. *Σκυλλας*. Vid. Cl. *hexandr*.

<sup>m</sup> Cum *Ἠδυοσμη* enumeratur: anne *Thymus*, *mastichina* L. ex odore pungenti.

<sup>n</sup> Forfan *Alchemilla*, *arvensis* L.

<sup>o</sup> Semel occurrit. Planta fausti ominis, ut nomen indicat. Differt ab *Euoynmo* L. fructus similis *Sesami*, εν φασφ.

<sup>p</sup> Species tota fragrans, ut videtur, caule sc. et foliis.

<sup>q</sup> Syn. *Σκορπιου*. Vid. infra.

<sup>r</sup> Forf. error textus pr. *Ιξία*.

<sup>s</sup> Planta palustris, cum *Ἰπνψ*: vox derivari videtur ab *ικμας*, humor.



ἵΠΠΟΝ<sup>a</sup>. }  
ἵΠΝΟΝ. } iv. 11.  
ἵΠΠΟΜΑΝΕΣ<sup>b</sup>. ix. 15.  
ΙΣΧΑΣ<sup>c</sup>. ix. 10.  
ΙΨΟΣ<sup>d</sup>. iii. 6.

K.

ΚΑΔΥΤΑΣ<sup>e</sup>. de C. Pl. ii.  
ΚΕΝΤΑΤΡΙΣ<sup>f</sup> τριόρχις.  
ΚΟΚΚΟΣ<sup>g</sup> Κνιδίος. ix. 22.  
ΚΟΨΙΜΟΣ<sup>h</sup>. iii. 15.  
ΚΤΝΩΨ<sup>i</sup>. vii. 8, 10.  
ΚΩΜΑΚΟΣ<sup>k</sup>. ix. 7.

Λ.

ΛΑΚΑΡΑ<sup>l</sup>. iii. 7.

ΛΕΙΜΟΔΩΡΟΝ<sup>m</sup>. de C. Pl. vi.  
ΛΕΙΜΩΝΙΑ. v. ΕΛΕΙΟΛΕΙΜΩ-  
νια.

ΛΕΥΚΟΙΟΥ<sup>n</sup> ανθει δένδρον, iv.  
9.

ΛΙΒΑΝΩΤΙΣ<sup>n</sup>. } iv. 6. ix. 2,  
ΛΙΒΑΝΩΤΟΣ. } 4, 12.  
ΛΙΜΝΩΔΕΣ<sup>o</sup> τι.

M.

ΜΑΓΥΔΑΡΙΣ<sup>p</sup>. i. 11. vi. 3.  
ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΠΟΝ<sup>q</sup> τι σφο-  
δρα.

ΜΗΛΩΘΡΟΝ<sup>r</sup>. vi. 1.

ΜΝΑΣΙΟΝ<sup>s</sup>. } iv. 9.  
ΜΝΑΤΣΙΟΝ. }

<sup>a</sup> In aquis nascens, cum priore. N. B. Ex nomine conjicere libet Equi-  
fitum L. vel Hippurim indicari.

<sup>b</sup> Τιθυμαλλου species, (vid.) si non succus inspissatus.

<sup>c</sup> Legitur Ισχας Απιος, vel Ισχας, η Απιος. forf. synon.

<sup>d</sup> Desc. nulla, nec apud Botánicos vox occurrit; planta forsan venenosa,  
ab ιπτω.

<sup>e</sup> Vox Syriaca, spec. parasiticam indicans.

<sup>f</sup> Forf. species Centauriæ. Vid. p. 17. Ex radice facile distinguenda.

<sup>g</sup> Forfan Capficum, frutescens.

<sup>h</sup> Affinis Cratægi fructu rotundo.

<sup>i</sup> An Echinops? vel ex forma floris ringenti, Bot. Antirrhini spec. Angl.  
“Snap-dragon.” Vid. Αχυνωψ, p. 26.

<sup>k</sup> Arbor fructu aromatico L. Myrobalano affinis. A quibusdam Myristicæ,  
spec.

<sup>l</sup> Forf. Λακαθη. Vid. Icosandr.

<sup>m</sup> Ευδus τη ρίζη παραφυομενιν. Parasitica spec. An error textus pro Αίμαδω-  
ρον? Vid. Didyn. Affinis videtur Βουκερατος, vel potius syn. Λειμωδαρον τε  
Βουκερας. de C. Pl. v.

<sup>n</sup> Arbor Thurifera nondum clare investigata; ab aliis herba: Athamanta,  
vel Ligusticum.

<sup>o</sup> An Hottonia, palustris? Vid. desc. floris et foliorum, Cat. Alph.

<sup>p</sup> Laferpitii spec. ut videtur. Vox Æthiopica?

<sup>q</sup> An Mangifera, Indica L. item ήδυκαρπος σφοδρα.

<sup>r</sup> Fruticis inermis spec. cum Cisto, et Eruthedano.

<sup>s</sup> Vox Ægyptiaca speciem palustrem indicans, cujus nulla in synon.  
Linn. mentio.

ΜΥΑ <sup>a</sup>. vi. 8.  
 ΜΥΑΚΑΝΘΟΣ <sup>b</sup>. vi. 4.  
 ΜΥΔΙΟΝ <sup>c</sup>. vi. ?  
 ΜΥΟΦΟΝΟΣ <sup>d</sup>. vi. 1, 2. vii.  
 10.  
 ΜΥΡΡΙΣ <sup>e</sup>.

## N.

ΝΑΙΡΟΣ <sup>f</sup>. } ix. 7.  
 ΝΑΡΤΗ. }  
 ΝΗΛΕΙΑ <sup>g</sup> i. 8.  
 ΝΗΠΙΕΝΘΕΣ <sup>h</sup>. ix. 15.

## O.

ΟΙΝΑΡΟΣ <sup>i</sup>. i. 15.

ΟΙΝΟΘΗΡΑ <sup>k</sup>. ix. 21.  
 ΟΙΝΟΡΑΝΘΗΣ <sup>l</sup>. de C. Pl. vi.  
 ΟΛΙΒΑΝΟΣ <sup>m</sup>. ix. 4.  
 ΟΝΟΚΙΧΛΗΣ <sup>n</sup>. vii. 10.  
 ΟΝΟΠΥΞΟΣ. De C. Pl. vi.  
 ΟΞΤΑΚΑΡΠΑ <sup>o</sup>. } iii. 6.  
 ΟΞΥΚΑΡΠΑ. }  
 ΟΡΟΒΑΓΧΗ <sup>p</sup>. de C. Pl. v.  
 ΟΥΙΓΓΟΣ <sup>q</sup>. } i. 10, 11.  
 ΟΥΙΤΟΣ. }

## Π.

ΠΑΝΤΑΔΟΥΣΑ <sup>r</sup>. vi. 4.  
 ΠΕΡΣΕΑ <sup>s</sup>. } iv. 2.  
 ΠΕΡΣΙΟΝ. }

<sup>a</sup> Cum Celastro. Forf. error textûs.

<sup>b</sup> A quibusdam Asparagus sylvestris: ab aliis 'Ιπποφειας syn. v. p. 6.

<sup>c</sup> Arbor quædam glandifera, forsan Quercûs species.

<sup>d</sup> Inter umbelliferas, cum Ναρθηκί et Μαραθρώ.

<sup>e</sup> An id. q. Μυρρίνη.

<sup>f</sup> Unguentum Ναιρον una cum Ναρτη memorantur. V. Ναρδος, p. 22.

<sup>g</sup> Error, ut videtur, pro Ελεια, palustri. Ανδραχνη Νηλεια, ib. pr. A. Ελεια.

<sup>h</sup> An succus inspissatus Papaveris, Somniferi, Angl. "Opium," vel Papaveris species? Vires ab Homero decantatæ.

<sup>i</sup> Cum Andrachne; si non nomen triviale.

<sup>k</sup> Vires εκστατικαι; odor vinosus: affinis Στυχου, vel Οναγρας Falc<sup>r</sup>.

<sup>l</sup> Forf. legend. Οινανθης.

<sup>m</sup> Mentio fit Gummi, Olibanum. Anne scribendum δ Λιβανος? Vid. Λιβανος, p. 21.

<sup>n</sup> Cum Cichorio.

<sup>o</sup> An error textûs? Forfan legendum οξυκακινθα, syn. Cratægi?

<sup>p</sup> Amplexu et luxuria plantas necat, ut Polygonum, Fagopyrum; minime Orobanche, L. Moldenhauer conjicit vocem hanc gentilitiam esse Ari, Colocasia. V. Tentamen in Theophr. p. 60.

<sup>q</sup> Pronuntiandum Vingos. Vox Ægyptiaca. Species sub terra radice tuberosa.

<sup>r</sup> Nullibi occurrit. Forf. nomen gentilitium.

<sup>s</sup> Non Laurus Persea L. sed forf. Persea arbor; Ger. em. 1606. Forf. το Περσειον fructus Amygdali, Persica. L.

ΠΙΛΟΣ <sup>a</sup>? iii. 8.

ΠΙΤΥΩΝ <sup>b</sup>. vii. 13.

ΠΙΤΥΙΝΗ <sup>c</sup>.

ΠΟΛΙΟΝ <sup>d</sup>.

P.

ΡΟΔΟΥ <sup>e</sup> ανθει δένδρον. iv. 9.

ΡΥΤΡΟΣ <sup>f</sup>. vi. 3.

Σ.

ΣΙΔΗ <sup>g</sup>. iv. 11.

ΣΚΟΛΥΜΩΔΗΣ <sup>h</sup> τῆς. ix. 13.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ <sup>i</sup>. vi. 3. ix. 14.

ΣΚΥΘΙΚΗ <sup>k</sup> ῥίζα. ix. 13.

ΣΜΥΡΝΑ <sup>l</sup>. iv. 6. ix. 1, 2, 4, 7.

ΣΠΑΛΑΞ. vid. Ασπαλαξ.

ΣΠΕΙΡΑΙΑ <sup>m</sup>. i. 23. vi. 1.

ΣΤΕΛΙΣ <sup>n</sup>. de C. Pl. ii.

ΣΤΑΕΓΝΙΣ <sup>o</sup>, vel Σιλιγνις.

ΣΤΡΟΥΘΙΟΣ <sup>p</sup>. vi. 3.

T.

ΤΕΡΜΙΝΘΟΥ <sup>q</sup> ὁμοιος. iv. 5.

ΤΕΤΡΑΛΙΞ <sup>r</sup>. vi. 3.

ΤΙΓΡΙΝΟΝ <sup>s</sup> ξυλον. v. 6.

ΤΡΙΠΟΛΙΟΝ <sup>t</sup>. ix. 21.

Υ.

ΥΦΕΑΡ <sup>u</sup>. iii. 16.

<sup>a</sup> Incertum an Galla, vel Fungus.

<sup>b</sup> Species bulbosa. N. B. Ambo ita dicti ex foliis Pini? Vox Pithyufa occurrit inter syn. Euphorbiæ.

<sup>c</sup> An genus diversum? vel forf. Ajuga, *Chamæpitys*.

<sup>d</sup> Polium, *Creticum* Bauhin?

<sup>e</sup> An Hybiscus L.

<sup>f</sup> Certe Cardui affinis genus. N. B. Vox Ritro occurrit inter synonyma Linnei, sc. Echinops, *Ritro*.

<sup>g</sup> Planta aquatica. Vid. *Μνασιον*. Pericarpio globoso instar mali granati, unde nomen.

<sup>h</sup> Affinis Scolymi Linn. sed lethalis.

<sup>i</sup> A quibusdam Genista, sed male; *ακανου* enim mentio. Foliis Cyclaminis; radice revoluta. N. B. Spec. alia aphylla, forf. Ulex. L.

<sup>k</sup> Ex dulcedine succûs Glycirhiza videtur innui.

<sup>l</sup> Arbor myrrhifera Arabiæ.

<sup>m</sup> An Spiræa L? non si licet conjicere ex descriptione.

<sup>n</sup> Spec. parasitica in truncis arborum. Cum Visco et Υφεαρι.

<sup>o</sup> Forfan tritici var.

<sup>p</sup> Duo Στρουθιοι occurrunt. 1. Cardui affinis pericarpio lævi, ut Sonchus. Vid. Στρουθιον, p. 12. 2. Pyr. *Cydonia*, sylvestri statu: sic αντι Κυδωνιας Στρουθιον, vi. 3. Apud Varronem enumerantur Mala Struthia, et Mala Cotonea: qu? i. c. 59.

<sup>q</sup> Vid. *Τερμινθος*. Class. Diœc.

<sup>r</sup> An Carduus Eriophorus? vel foliorum habitu affinis planta? N. B. Inter Ericas Linn. nomen occurrit triviale Tetralix.

<sup>s</sup> Vid. Δενδρ. Τίγρινον. p. 25.

<sup>t</sup> Spec. pharmaceutica ab Homero decantata. An After, *tripolium* L?

<sup>u</sup> Cum Στελιδι et Ιξια in truncis arborum.



Φ.	ΦΛΟΓΙΜΟΝ <sup>c</sup> . vi. 7.
ΦΕΩΣ <sup>a</sup> . vi. 3, 4, 5.	ΦΛΟΜΟΣ <sup>d</sup> μελαινα. ix. 13.
ΦΙΑΤΚΗ <sup>b</sup> . i. 15. iii. 4, 6.	ΦΛΟΞ <sup>e</sup> . vi. 6.
	ΦΤΑΛΛΟΝ <sup>f</sup> το. ix. 18.

<sup>a</sup> Planta spinosa, cum Capparide, Ononidi, Πανταδουση. N. B. Vox Φλειως apud Aldum, errore textûs; Φλειως enim Scirpus. vid. p. 6. Apud Falcr, Papyrus Syriacus. Vox Φειως synonyma apud quosdam Στοιβης. Vid. *Syngen*.

<sup>b</sup> An Rhamnus, *Alaternus* L.? vid. Desc.

<sup>c</sup> Ex colore flammæo forsan Erythronium, *Dens canis* L. etiam si libet conjicere ex præcocitate floris.

<sup>d</sup> Phlomis Genus L. sed diversum a Φλομφ. Obiter notatur in desc. Papaveris nigri. N. B. Φλομος μελαινα Diosc. Verbascum, *sinuatum* L. φλ. λευκη. Verb. *plicatum*. Prodr. Fl. Græc. 150.

<sup>e</sup> Inter flores coronarios cum Άιος ανθει an Agrostemma, *flos Jovis* L. N. B. Phlox Linn. Genus novi orbis.

<sup>f</sup> Forsan Mercurialis, *perennis*. Spec. duæ; φ. αρρενογονον, et φ. θηλυγονον; ex forma fructûs δικροφ, vel geminata. Vid. Ger. em. p. 333. de Arrenogono et Thelygono.

---

QUÆ IN REGNI ANIMALIS SEX CLASSIBUS  
LINNEI OBITER A THEOPHRASTO  
NOTANTUR.

---

CLASSIS PRIMA.

MAMMALIA.

ΔΟΡΚΑΣ. *Capra, Dorcas*; vel *C. Gazella*.

Hab. Εν τη μη ὑομενη γη. (Vid. infr. Πτωξ.)

ΕΛΑΦΟΣ. *Cervus, Elaphus*? an *C. Capreolus*.

Ὡς τα περι τας Ελαφους, αἱ τους Εχεις εσθιουσιν, ὑφ' ὧν τα  
αλλα θνησκουσι. de *C. Pl. iv.*

ἼΠΠΟΣ. *Equus, Caballus*.

Λοφουρος a Theophrasto sæpius vocatur; cauda sc. criftis ufitata.  
Στελεφουροι e contra, cauda, ftipitis instar, cylindrica, æquali; *Bos,*  
*Ovis, Cervus.*

ΚΥΩΝ. *Canis, familiaris*.

Κυν και Ὑς μονοι των θερμων πολυτοκει, (sc. 12, 15, 20. uno  
partu.) de *C. Pl. i.*

ΛΑΓΩΣ. *Lepus, timidus*.

Τα ιχνη των Λαγων ευοσμοτερα, (the scent lies better) ψε-  
κασθεντα μαλακως. Μεταπωρου καιρος κυνηγιας, ὅταν αἱ οσμαι  
των ανθων ου παρενοχλουσι. de *C. Pl. i. vi.* Superfætatio *Le-*  
*poris* occurrit in historia plantarum.

ΠΑΡΔΑΛΙΣ. *Felis, Pardus*.

Solus ευοσμος (odore fragranti delectatur.) de *C. Pl. vi.* Obser-

vatur a Theophrasto animalia in genere averfari odores. N. B. Species nonnullæ generis Felis L. ευωδεσι delectantur ; e. g. Felis, *Rattus* L. oleo Rhodii, utpote et Felis, *Lutra*.

ΠΤΩΞ. Mus, *Jaculus*.

Εν τη μη ὑομενη, (in partibus Libyæ ubi pluit nunquam,) ἰδια πλειω γινεσθαι· και Πτωκα, και Δορκαδα, και Στρουθιον, iv. 4.

ΥΣ. Sus, *Scrofa*.

Cum Cane ; μουνος των δερμων πολυτοκει, (vid. Κυων.) de C. Pl. iv.

## CLASSIS SECUNDA.

### AVES.

ΑΕΤΟΣ. Falco, *Cbrysaëtos*.

Mentio fit in plantis magicis colligendis, Αετον φυλαττεσθαι, ix. 9. respectu augurii boni.

ΓΥΨ. Vultur, *Percnopterus*.

Αναιρεται ὑπο των μυρων. de C. Pl. vi.

ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΣ. Picus, *martius*, ix. 9.

Νυκτωρ κελευουσιν ορυττειν τας ριζας της Παιωνιας· εαν γαρ οφθῃ ὑπο Δρυοκολαπτου, κινδυνευειν τοις οφθαλμοις, ib.

ΙΚΤΙΝ. Falco, *Milvus*.

N. B. Ex voce αἴσσω conjicere licet Ικτινα inter Falcones rapidi volatûs, locum obtinere.

ΚΙΤΤΑ. Sitta, *Europæa*. de C. Pl. ii. p. 155. B.

Ορυττει ἡ Κιττα θησαυριζομενη τας βαλανους.

ΚΟΚΚΥΞ. Cuculus, *canorus*. de C. Pl. ii. 155. B.

Ου δη του Κοκκυγος (φυσις), ει μη ην Ὑπολωις· (vid.) και εις την νεοττιαν τα ωα τιθῃσιν.

ΣΤΡΟΥΘΙΟΣ. Struthio, *Camelus*, iv. 4.

Εν τη μη ὑομενη (γη) γινεται.



ΥΠΟΛΩΙΣ. *Motacilla, modularis*, vel *Curruca antiquorum*. Vid. sup. Κοκκυξ.

ΧΑΡΤΟΔΡΑ ? }  
ΧΑΡΑΔΡΙΑ ? }

Κοπρος ανθρωπου και Χαρτοδρας δριμυτατη, ii. 8. an *Fimus Columbinus*? *cujus vires notissimæ*.

## CLASSIS TERTIA.

## AMPHIBIA.

ΕΞΙΣ. *COLUBER*; nomen Genericum.

Vid. Ελαφος, qui dicitur *Serpentibus vesci*. de C. Pl. iv.

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ. *CROCODILUS*.

Ῥιζα του κυαμου (vid. Κυαμος Αιγυπτια, p. 18.) ισχυρα, και επακανθιζουσα· διο και ο Κροκοδειλος φευγει μη προσκοψη τω οφθαλμω, iv. 10.

ΟΦΙΣ. *COLUBER*.

Αναιρουνται ὑπο των Σκορπιων. de C. Pl. iv. animal αποτον, (fine aqua vivens,) iv. 4.

Οφεις μικροι σφοδρα, συσπειρομενοι, ("coiled up,") iv. 5.

ΣΑΤΡΟΣ. *LACERTA*. Genus αποτον in aridis Libyæ vivens, iv. 4.

## CLASSIS QUARTA.

## PISCES.

ΚΑΡΧΑΡΙΑ. *Squalus, Carcharias*.

Ἡ δε θαλαττα (Ερυθρα) θηριωδης, και πλεισους εχει τους Καρχαριας, ὥς ε μη ειναι κολουμνησαι, iv. 8.

## CLASSIS QUINTA.

## INSECTA.

ΑΤΤΕΛΑΒΟΣ. *ATTELABUS*.

Καταβρωθεντων των εργαων αμπελου, (i. e. furculis *Vitis eros*is,) ὑπ' Αττελαβων, ii. 4.

N. B. Genus *Attelabus* a Linneo fiftitur, S. N. 619.

ΚΑΜΠΗ. *Eruca*. Inter *Lepidoptera*.

N. B. *Metamorphoseων Infectorum clarissima extant indicia apud Theophrastum. de C. Pl. l. v. Αἱ μεταβολαὶ κατὰ τὴν γεννησιν· οἷον ἐπ' ἄλλων, καὶ ἐπὶ τῶν καλουμένων Ψυχῶν· ἐκ Καμπῆς γὰρ Χρυσάλλις, (Chrysalis vel Pupa L.) εἰτ' ἐκ ταύτης ἡ Ψυχὴ, (Imago L.) vocantur τριγωνήσαντα. de C. Pl. i.*

ΚΑΝΘΑΡΙΣ. *Curculio, granarius* ?

Ἐπιγίνεται ἡ Κανθάρης ἐν τοῖς πυροῖς, viii. 10.

KENTIS. }  
KENTRIS. } *Ichneumon parvum non descriptum.*

Ἔστι καὶ ἕτερον γένος τῶν Ψήνων (vid.) ὃ καλοῦσι Κεντίνας· οὗτοι δ' ἀργοὶ, ὥσπερ Κηφήνες, (*Apis, mas* L.) τοὺς εἰσδυομένους κτείνουσιν, ii. 9. N. B. *De Ψήνι Ficûs fermo est; forf. Cynips, Psenes. L. S. N. 919.*

ΚΕΡΑΣΤΗΣ. Inter *Coleoptera*.

Ἰδίον τι περὶ τὸν καλούμενον Κεράσην συμβαίνει· ἐν τῇ Ἐλαίᾳ γίνεται, ἐν δὲ τῇ Συκῇ ἐντίκτει. de C. Pl. v. *Σκωληκας ἐντίκτομενους παντας, (erucas,) εἰς κεράσην ἀποκαθίσασθαι; φθεγγονται δ' οἷον τριγμον, (de stridore alarum inter volandum, ib.) de C. Pl. v.*

ΙΨ. CYNIPS.

Οἱ ἰπες, οἱ ἐν τοῖς κυάμοις ἐγγινομένοι, καὶ ἄλλοι ἐν ἄλλοις, ὥσπερ ἐν τοῖς δένδροις καὶ ξυλοῖς ἐλεχθῇ. N. B. *Animal a frequente diversum ex modo victûs, quod sæpe innuitur, viii. 10.*

ΚΝΙΨ. APHIS.

Ἐγγινονται δὲ Κνίπες ἐν τισὶ τῶν δένδρων...καὶ δοκοῦσιν ἐκ τῆς ὑγροτήτος συνισθῆναι, τῆς ὑπὸ τὸν φλοιὸν· αὕτη δ' ἐστὶ ΓΛΥΚΕΙΑ· γίνονται δὲ καὶ ἐν λαχανοῖς, iv. 7.

ONINNOΣ. }  
ONISΚΟΣ. } *ONISCUS.*

Ἐν καυλοῖς τῆς Δρύος καὶ Ἐλάτης ποντίας ἐνδεκυκοτές οἱ Ονιννοί, καὶ τὸ ὅμοιον Πολυποδί, iv. 7.

ΟΝΟΣ. *Oniscus, Asellus.*

Πολυποῦν τι, καὶ μελάν συσπειρομένον εἰς ἑαυτο, (in se circumvolutum,) frequens in Libyæ arenis, iv. 4.

ὍΜΟΙΟΝ Πολυποδι. (Vid. supr.) Nereis, vel Scolopendra in Nereide Britannica descripta, in caulibus Fuci Tamariscifolii nidulans, iv. 7.

ΠΡΑΣΙΚΟΤΡΙΣ. Cimex, *prasinus* L. 722.

Εν τοις πράσοις, και εν αλλοις πλειοσι αἱ Πρασικουριδες, vii. 5.

N. B. Hinc forsan vox Anglica, “ Lady Cow.”

ΣΗΠΑΙ? }  
ΣΗΤΑΙ. } Genus ignotum.

Animal noxium quoddam mordens cum Εχει et Φαλαγγιω, (Aranea, *Avicularia* L. vel *Tarantula*.) Χρωνται Πανακη Χειρωνειω προς τους Εχεις και τα Φαλαγγια, και τας Σητας, και τ’αλλα ἐρπετα, ix. 12.

N. B. Ex voce ἐρπετα licet conjicere Σητας vel Σηπας reptilia quædam. Animal aliud Σης.

ΣΚΟΛΟΠΙΑ. Scolopendra, *Electrica* L.

Γηθου ριζαις χαιρει, ut colligi potest ex textu corrupto, vii. 11.

ΣΦΟΝΔΥΛΗ. Iulus L.

Ῥιζας δριμειας ουδεν αλλο θηριον ἀπτεται, ἡ δε Σφονδυλη πασων, ix. 14.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ. SCORPIO.

In aridis nascitur. Vid. quæ dicitur de Scorpione et Serpente. v. Οφις, p. 33.

ΦΑΛΑΓΓΙΟΝ. ARANEA.

A. *Avicularia* L. vel A. *Tarantula*, ix. 12. Vid. supr. Σηται.

ΦΘΕΙΡ. Pediculus, *humanus*.

Οἱ Φθειρες συγγενεις εἰσι αίματος· ἐξ οὗ διαφθαρεντος, ἡ γενεσις. de C. Pl. ii.

ΨΗΝ. Cynips, *Pfenes* L. L. S. N. 919.

Οἱ δε Ψηνες εκδυονται εκ του ερινεου· γινονται δε εκ των κεγχραμιδων. σημειον δε τουτου λεγουσι, ὅτι επειδαν εκδυωσιν, ουκ ενεῖσι κεγχραμιδες· εκδυονται δ’ οἱ πολλοι εγκαταλειποντες, η ποδα η πτερον, ii. 9.



ΨΥΛΛΑ. *Tenthredo*, *Rapæ?* L. S. N. 926.

Θηρία δε γινεται ταις μεν 'Ραφανισι, Ψυλλαι, vii. 7.

## CLASSIS SEXTA.

VERMES.

*Molluscæ.*

<sup>14</sup>ΕΛΜΙΣ πλατεια. *Tænia*, *lata*.

Ἡ δε ῥίζα της Πτεριδος (vid.) μονον Ἐλμινδα την πλατειαν εκβαλλει· ἡ δ' Ἐλμις συμφυτον ενιοις εθνεσιν· εχουσι γαρ, ὡς επιπαν, οἱ Αιγυπτιοι, ix. 22.

ΙΝΕΣ? *Afcarides*, *vermiculares?*

Φασι δε μονον (ῥιζαν Ελατηριου) φαρμακον ὑπερ ινων ανω. αυτη μεν ουν ιδιοτης της δυναμews. N. B. *Textus videtur corruptus*, ix. 14. *Alii legunt ὑπερινον una voce.*

ΚΟΧΛΙΑ Συκης.

*Animalculum testaceum in truncis arborum*; frequens in *viridariis*, iv. 16. *Nescio an descriptum.*

ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ Ζωα. TESTACEA.

Mentio fit *Οστρακοδερμων* in apicibus *Fuci*, *Serrati*, et *Vesiculosi*. N. B. *Serpulæ præcipue*, et *juniores Cochleæ illic nidulantur*. iv. 7.

ΠΟΛΥΠΟΥΣ. ASTERIAS.

Ἡ του Πολυποδιου (vid. *Tab. Syft. p. 22.*) ῥίζα δασεια, και εχουσα κοτυληδονας (vid. *Lex. Theophr.*) ὡσπερ αἱ του Πολυποδος πλεκταναι (*Asteriæ tentaculæ*,) ix. 14.

ΠΛΥΣΙΑ. *Laplyfia*, *depilans?*

Ἡ Σπογγια, και αἱ Πλυσαι καλουμεναι εν θαλαττα ἑτεραν εχουσι φυσιν, (i. e. *Zoophytis*, non *Plantis adnumerandæ*,) iv. 7.

ΣΚΩΛΗΞ. *Lumbricus*, *terrestris*.

Ad radices 'Ραφανιδων, vii. 5. N. B. Σκωληξ nomen generale *Vermium* et *Erucarum*, &c. ut Σκωληξ Μεσπιλου, iii. 12. Σκ. Συκης. de C. Pl. v. &c.

ΣΠΟΓΓΙΑ. SPONGIA.

Cum Πλυσια, ut naturæ a plantis diversæ.

ΣΤΚΗ ποντια. *Alcyonium, Ficus* ?

Αφυλλος· μεγεθει ου μεγαλη, χρωματι φοινικω.

ΤΕΡΗΔΩΝ. *Teredo, navalis*.

Ου γινεται Τερηδων αλλ' εν θαλασση, v. 5. φασι δε Πευκην  
Ελατης μαλλον ὑπο Τερηδονος εσθιεσθαι, ib.

ΛΕΠΑΣ. *PATELLA*.

Προσπεφυκυια πετραις· optime, iv. 7.

#### LITHOPHYTA.

ΜΥΚΗΣ λιθινος. *Madrepora, Fungites*.

Suspiciatur Theophr. ότι αφ' Ηλιου απολιθουνται, iv. 8.

#### ZOOPHYTA.

ΔΕΝΔΥΦΙΑ κερατινα. *Gorgoniæ, vel Ifidis species*.

Τοις οξοις τραχεια, και επ' ακρου πυρρὰ· item fragilia, nec igni  
combustibilia, sed in igne candentia, ut ferrum, iv. 8.

N. B. Ex apicibus cortice nudatis, coccineis, Gorgonia, *Nobilis*  
indicari videtur.

ΦΟΙΝΙΞ ποντια. *Gorgonia, flabellum* ?

Βραχυσελεχης σφοδρα· εκφυσεσι των ραβδων ευθειαις· κατω-  
θεν κυκλοθεν ως ραβδων· ακρεμονες δ' ωςπερ εν πλατει, κατα  
μιαν συνεχεις, (apices expansi et complanati, partibus inter sese  
inofculantibus ?)

ΣΧΟΙΝΟΙ λιθινοι. *SERTULARIÆ*.

N. B. Species quædam ramis simplicibus : pluribus ex uno  
disco.





LEXICON THEOPHRASTI.



# LEXICON THEOPHRASTI.

ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΟΣ. Angiospermus, *Bot.* cujus semina perianthio laxo involvuntur.

Vid. Γυμνοσπερμος, vii. 3.

ΑΓΚΥΡΑ. Instrumentum rusticum bi- vel tri-dentatum.

ΑΓΝΩΔΗΣ. Agni, *casti* similis.

Vid. Αγνος, Tab. Syft. p. 14.

ΑΓΟΝΙΟΣ. } Vid. Γωνια.  
ΑΓΩΝΙΟΣ. }

ΑΓΩΓΗ. Ordinatio ramorum arboris, *Angl.* “training,” i. 14.

ΑΔΡΟΣ. Firmus, validus, crassus : opp. τω λεπτῳ, vii. 4.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ. Impossibilitas, δυνασθαι την αδυναμιαν, *Græcismus*, ix. 19.

ΑΕΠΙΣΠΟΡΟΣ. Vid. Επισπορος, vii. 1.

ΑΘΕΡΩΔΗΣ. Aristatus, *Bot.* vii. 10.

ΑΘΡΑΥΣΤΟΣ. Tenax, *Angl.* “tough.” de ligno, i. et pass.

ΑΘΡΙΠΕΔΗΣ. Non erosus vermicibus, a Θριψ. v.

ΑΘΥΡΟΣ. Forf. αχυρος. Paleaceus, *Bot.* de C. Pl. iv.

ΑΙΓΙΣ. Trunci pars in pinu, ad nodos, tabulis pictoriis, vel scriptoriis usitata, iii. 10. etiam ad clypeos, ib. N. B. Quandoque cor totum trunci. *Mold.*

ΑΙΜΑΣΙΑ. Sepes ex spinis, quæ corpus vulnerant, unde nomen. pass.

ΑΙΝΟΣ. Sine fibris (vid. Ινες,) de ligno. hinc ευῖνος. pass.

ΑΙΡΩΔΗΣ. Loliaceus *Bot.* Lolio infestatus. de segete, v. 5.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΝ. Oris palatum. de C. Pl. vi.

ΑΙΤΙΑΙ αἱ. Effectus, proprietates, vel “potestates herbarum.” pass. Hinc titulus Libri Περί Φυτῶν Αἰτιῶν, vel, ut Varro rectius scribit, Περί Φυτικῶν Αἰτιῶν, l. i. 5.

ΑΚΑΝΟΣ. Pericarpium vel capitulum in Carduis, &c. &c. etiam Cardui spec. v. p. 25.

ΑΚΑΝΙΖΩ. supr.



ΑΚΑΡΔΙΟΣ. Vid. Καρδια, Bot.

ΑΚΙΔΩΔΗΣ. Triangulari-acutus : fimilis cuspidis sagittæ ; de forma feminis Σχοινου. Vid. iv. 13.

ΑΚΙΣ. supr.

ΑΚΜΑΙ αἰ. Tempora convenientia. Αἱ ακμαι προς την τομην, "the exact season," v. 1.

ΑΚΝΙΣΟΣ. Scaber, non rufus. Σωμα ακνισον. de C. Pl. ii.

ΑΚΟΝΑΙ αἰ. 1. Rupes calcariae ; ab ακονη, cos, "a whetstone," ix. 16. 2. Nomen loci.

ΑΚΟΠΟΣ. Vermibus intactus. de vestibus, feminibus &c. iv. 4. de C. Pl. iii.

ΑΚΡΑΤΗΣ. 1. Immoderatus, p. 2. immistus, crudus : γη ακρατης. de C. Pl. v.

ΑΚΡΕΜΟΝΕΣ οἱ. Rami majores, vel superiores, i. 4.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ τα. Fructus spec. quæ putamine teguntur Cass. Bass. ξοια, πισαχια, κασανα. de C. Pl. iii.

ΑΚΡΟΥ. ἐξ ακρ. περιττον. de folio pinnato, impari Bot.

ΑΚΡΟΡΡΙΖΟΣ. Radice horizontali Bot.

ΑΚΤΙΝΟΣ. Sambucinus. Vid. Ακτη.

ΑΚΥΔΟΣ. Ilicis glans, ii.

ΑΛΕΑ. Calor Solis. de C. Pl. i.

ΑΛΕΕΙΝΟΣ. Calidus, foli expositus : opp. τῷ ψυχρῷ.

ΑΛΕΠΙΔΟΤΟΣ. Sine tunicis. Vid. Λεπιδες, vii. 4.

ἈΛΙΚΟΙ οἱ. Paludes falsæ, iv.

ἈΛΙΚΩΔΗΣ. Supr. ix. 12.

ἈΛΙΦΛΟΙΟΣ. Cortice, gustu salino ? N. B. Spec. Quercus, ita vocatur, sed forf. error textus pro αλλοφλοιος, pro cortice duplici Q. Suberis L. alii ab ἄλις.

ἈΛΚΥΩΝΙΔΕΣ οἱ. Dies Halcyonis. Vid. Myth. Antiq. ix.

ἈΛΜΑΙ αἰ. Vid. αἱ ἄλικοι, supr.

ΑΛΦΟΣ. Scabies ; morbus cutaneus in pecoribus, div. a ψωρα, ix. 12.

ΑΜΑΞΑ μονοστροφος, vel μονοτροχος. Currus rota unica ; an manibus accommodata, e. g. "a wheel-barrow?" v. 8.

ΑΜΒΛΩΣΙΣ οφθαλμων. Abortio gemmarum, Bot. iv.

ΑΜΒΛΩΨ. Morbus ipse, ib.

ΑΜΕΗΝΟΣ. Debilis, periturus ; αμενηνα σπερματα, iii.

ΑΜΕΡΓΩ. Succo privo ; όταν αμερσωσι τον καρπον, ix. 8.

ΑΜΟΡΓΑ. Amurca : Olei expressi recrementum. de C. Pl. vi.

ΑΜΗΣ. Placenti genus. de C. Pl. vi.

ΑΜΙΣΧΟΣ. Vid. Μισχος.

ΑΜΦΑΤΞΙΣ. } Intumescentia

ΑΜΦΙΦΥΑ. } in trunco Abietis post decacuminationem. Vid. desc. accuratam, iii. 8.

ΑΜΦΙΕΡΓΟΣ. Inutilis ; de solofationi inepto præ humore. de C. Pl. iii.

ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ῥιζῶν. *Hort.* "the uncovering the roots." de C. Pl. iii.

ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΙΣ. Exhalatio.

ΑΝΑΛΟΓΟΝ. adv. Pari ratione, viii. 5.

ΑΝΑΚΛΑΣΙΣ. Actio circumvertendi, ανακλασις προς τον ἥλιον, i. 16.

ΑΝΑΚΑΥΛΟΣ. Caulis secundarius; οἱ του βολβου ανακαυλοι, i. 10.

ΑΝΑΣΤΗΜΑ. Incrementum furfum, vel altitudo plantæ, ix. 10.

ΑΝΑΤΡΕΠΩ. *Agric.* Solum evertō: ανατρεπειν κυαμους, "to plough in the crop," viii. 9.

ΑΝΔΗΡΟΙ οἱ τευχῶν. Propugnacula, "the ramparts," vii. 14.

ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ Inefficiens, ix. 17.

ΑΝΕΠΙΔΟΤΟΣ. Sine incremento. de C. Pl. iv.

ΑΝΘΕΡΙΚΟΝ. 1. Planta. 2. Pericarpium in Liliaceis, vii. 12.

ΑΝΘΗΛΗ. Panicula *Bot.* de Arundine; Cypero, *Papyro*, &c. iv. 11, 12.

ΑΝΘΗΡΑ τα. Tempora florenti. de C. Pl. iii.

ΑΝΘΙΚΩΣ. adv. ab ανθος, viii. 9.

ΑΝΘΡΑΞ. Carbo lignarius, "charcoal." Antiqui artem carbonandi apprime callebant, v. 10.

ΑΝΘΩΔΕΣ ανθος. Flos compo-

situs, *Bot.*

ΑΝΙΜΑΩ. Aquam e puteo haurio, ἱμαντι, (fune coriario,) sc. machina quadam, iv. 17.

ΑΝΙΩΔΗΣ. Gustu ingratus, vel odore. de C. Pl. vi.

ΑΝΟΖΟΣ. Vid. οζος.

ΑΝΤΙΔΙΗΡΗΜΙΝΟΣ. Separatus a se invicem. Plantæ αντιδιηρημεναι καθ' ἑκαστον (quæ sub genere communi specialiter discriminantur.)

ΑΝΤΙΑΜΒΑΝΩ. 1. Succedo. 2. Sustento.

ΑΝΤΙΑΗΨΙΣ. Fulcrum.

ΑΝΤΕΜΒΑΛΛΩ. Pono vice alijus, ix. 9.

ΑΝΤΩΘΕΩ. Vi elastica repello. N. B. Opp. ενδιδοναι, recedere, v.

ΑΝΩ καθαρειν. Vomitum excitare, ix. 10.

ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ αἱ αερος. Vicissitudines aeris, iii.

ΑΞΑΡΙΚΟΙ. Granaria.

ΑΠΑΛΛΑΤΤΩ. Eneco, ix. 15.

ΑΠΑΡΑΒΛΑΣΤΟΣ. Vid. Παραβλαστος.

ΑΠΕΜΦΕΡΗΣ. Diffimilis. Vid. Εμφερης, vii. 8. p.

ΑΠΕΡΑΣΙΣ. Imperfectio. de C. Pl. i.

ΑΠΕΡΥΣΙΒΩΩ. Rubiginem genero. de C. Pl. v.

ΑΠΕΡΙΤΤΩΤΟΣ. Vid. Περιττωμα. de C. Pl. vi.

ΑΠΕΥΚΟΣ. Non refinofus, iii.

ΑΠΕΧΟΜΕΝΟΙ οἱ παρ Ινδοις. Brachmani, iv. 5.

- ΑΠΗΡΩΤΟΣ.** Non mutilatus. de ligno. de C. Pl. iii.  
**ἈΠΛΟΣ.** Simplex. ἅπλον ανθος, an de structura monopetala, vel de flore concolore? Alibi ἅπλον τοις ειδεσι.  
**ΑΠΙΚΜΑΩ.** Exsicco, humorem (ικμαδα) abstergo. de C. Pl. iv.  
**ΑΠΟΚΑΥΛΟΣ.** Non regermi- nans? ut Abies, &c.  
**ΑΠΟΚΛΙΝΩ.** Deorsum tendo, vi. 2.  
**ΑΠΟΚΙΤΤΟΟΜΑΙ.** Habitum hederæ amitto: sc. respectu formæ foliorum.  
**ΑΠΟΚΛΥΖΩ.** Aquam copiose perfundo.  
**ΑΠΟΛΗΨΙΣ.** Absorptio. de C. Pl. ii.  
**ΑΠΟΛΟΧΜΟΩΜΑΙ.** Fruticesco, vi. 6.  
**ΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ.** Secernor; όταν αποκριθῇ το ὕδατῳδες. de C. Pl. vi.  
**ΑΠΟΜΑΓΜΑΤΑ δακτυλιων,** "the paring of the nails." de C. Pl. vi.  
**ΑΠΟΡΙΑΙ αἱ.** Quæstiones sol- vendæ. "Quere's." de C. Pl. iv.  
**ΑΠΟΡΡΟΗ ανθων.** "A blight:" item απ. βλασησεως. de C. Pl. v.  
**ΑΠΟΠΡΕΜΝΟΣ.** Vid. Πρεμνος, ii. 7. ramus minor?  
**ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ αἱ.** Hort. Inter- valla. de C. Pl. iii.  
**ΑΠΟΣΤΑΦΙΔΩΩ.** } De uvis  
**ΑΠΟΣΤΑΦΙΔΟΟΜΑΙ.** } arefac-  
 tis in arbore. de C. Pl. ii. Vid. Ασαφίς.  
**ΑΠΟΣΤΙΦΩ.** Condensio. de C. Pl. ii.  
**ΑΠΟΤΙΚΤΩ.** Demo. Fructum a- mitto. de C. Pl. v.  
**ΑΠΟΤΙΣ γη.** Ubi aqua deficit. de C. Pl. ii.  
**ΑΠΟΦΥΣΙΣ.** Aliquod adnatum extus. αποφυσεις καυλων in Carduis, (pedunculi foliorum decurrentes, amplexicaules Bot.) Vid. Ὑποφυσεις.  
**ΑΠΟΧΥΣΙΣ.** Effluvium, vel jac- tura succi in plantis, όταν ὁ Σκωληξ εσθιει τον καλαμον του Πυρεου, εκβιαζεται την αποχυ- σιν, viii. 10.  
**ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ αἱ,** αμπελου. Hort. "the thinning out the branches."  
**ΑΠΥΡΗΝΟΣ.** Vid. Πυρην.  
**ΑΡΑΧΝΙΟΝ.** Morbus Oleæ pro- prius. N. B. Nidus forsan animalculi cujusdam tex- torii. de C. Pl. v.  
**ΑΡΓΙΛΟΣ.** Argilla, gustu ama- ra. de C. Pl. vi.  
**ΑΡΓΟΣ.** Crudus, ix. 4. de terra, incultus, "fallow" Angl.  
**ΑΡΙΘΜΟΣ.** ὡς αριθμος, Prov. de magno numero, vii. 2.  
**ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.** Arcturus. Stella primæ magn. Sideris Arc- tophylacis vel Bootis: sc. in cauda Uræ majoris. N. B. Tempora anni notantur ortu et occasu hujus stellæ, utpote



et Caniculæ et Pleiadum.

μετ' Αρκτουρον, μετα Κυνα.

Accuratiorem qui velit hujus rei notitiam, adeat Gemini Observationes Astronomicas, vel Calendarium Theophrasti Hist. Plant. accommodatum in Opere miscellaneo<sup>a</sup>, cujus mentionem feci.

ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ. Inter segetes crescens, fativa planta, vii. 7. et passim.

ΑΡΟΤΟΙ. Tempora feminandi. N. B. Τρεις ώραι του σπορου apud Theophrast.

1. περι Πλειαδος δυσιν, (m. Octobri.)

2. Ηρος αρχομενου, (m. Martio.)

3. Αροτος Θερινος, (m. Julio,) viii. 1.

ΑΡΡΑΓΗΣ. Compactus, sine rimis vel fissuris. de ligno, v. 5.

ΑΡΡΗΝ. Mas. N. B. Plantæ a Theophrasto in ἀρρήνας et θηλείας quandoque dividuntur; nulla differentia sexuali: v. g. Ελάτη, Κρανεία. Spec. robustior, et quæ tarde fructificat, ἀρρην vocatur, et contra, θηλεία. Sexualis distinctio occurrit in Φοινικί, et alibi, ii. 8.

ΑΡΤΙΟΣ. de plantis adultis et perfectis.

ΑΡΧΙΝΙΟΝ? Error textûs? v.

Αρχινιον, iv.

ΑΡΧΗ. Principium vitæ, ii. 8. Hinc Bot. Corculum feminis, et plumula, viii. 1, 2. Vid. desc. germinationis feminum diversorum, viii. 1.

ΑΡΩΜΑΤΑ. Odores antiquorum. Catalogum odorum antiquitus in usu εν μυροις fisco. 1. Κασία. 2. Κινναμωμον. (Vid. Tab. Syft.) 3. Καρδαμωμον. 4. Ναρδος. 5. Ναιρον. 6. Βαλσαμον. 7. Ασπαλαθον. 8. Στυραξ. 9. Ίρις. 10. Ναρτη? 11. Καςωρ. 12. Πανακες. 13. Κροκος. 14. Σμυρνη. 15. Κυπειςος. 16. Σχινος. 17. Καλαμος. 18. Αμαρακος. 19. Λωτος. 20. Ανησον, ix. 7.

ΑΣΠΙΣ. Clypeus, olim ex viminibus salignis; ut et ex ligno ejusdem arboris, v. 8.

ΑΣΤΑΦΙΣ. Uva passa, “a raisin.” v. p. 44.

ΑΣΤΡΑΒΗΣ. Non tortuosus, ξυλον αστραβες, “strait-grained wood,” iii. 10.

ΑΣΤΡΑΒΕΩ. id.

ΑΣΤΡΟΒΟΛΗΤΟΣ. } Planta-  
ΑΣΤΡΟΒΟΛΗΣΙΑ. } rum in-  
juria ex cœli intemperie, olim sideribus attributa. de C. Pl. v.

ΑΣΤΡΟΝ το. Sirius, Canicula: περι το αστρον, “the Dog-days,” ii. 7. Plantæ dicuntur ακολουθειν τοις αστροις,

<sup>a</sup> G. Falconer, M. D. Vid. Præf. operis.

(tempora observare in germinando,) vii. 14.  
**ΑΣΠΑΡΑΓΙΑ.** "An asparagus bed," vi. 4.  
**ΑΤΕΡΑΜΝΟΣ.** Vid. *Τεραμων*.  
**ΑΥΛΟΝΙΣΚΟΣ.** Dim. ab *αυλων*. Vallis, ix. 7.  
**ΑΥΣΤΗΡΟΣ.** Astringens : fucci plantarum denominantur *αυσηροι, γλυκεις, οξεις*, respectu gustûs. Ang. "rough."  
**ΑΥΧΜΑΙ** αἱ. "The Droughts."  
**ΑΥΧΜΑΙΟΣ.** Æstivus; *εργα αυχμαια*. de C. Pl. iii.  
**ΑΥΧΜΗΡΟΣ.** De odore; folia *Salviæ ήττον αυχμηρα*. V. *Βαγυς*.  
**ΑΦΑΝΕΣ.** adv. Occulto, ix. 12.  
**ΑΦΑΝΕΣ** το. Vapor, gas, ib.  
**ΑΦΕΛΚΟΩ.** } Penetro, per-  
**ΑΦΕΛΚΟΟΜΑΙ.** } foro? ix. 12.  
*fanor.* de C. Pl. v.  
**ΑΦΟΡΟΣ.** Sterilis. de C. Pl. iii.  
**ΑΦΥΛΛΟΣ.** De flore monopetalô ufurpatur.  
**ΑΧΡΟΥΣΤΕΡΟΣ.** Minus coloratus. Vid. *χεοομαι, κεχρωσμενος*.  
**ΑΧΥΡΟΝ.** 1. Palea, gluma, *Bot.* *αχυρον πυρινον. α κριθινον*, viii. 1.  
 2. Siliqua Fabæ. de C. Pl. iv.  
**ΑΩΡΕΙΑΙ.** Tempora minus propitia, "bad seasons." de C. Pl. v.

## B.

**ΒΑΛΑΝΟΣ** ή. Nux arboris *βαλανου*. Vid. Tab. Syst. p. 11.

et *Μυροβαλανον*.

**ΒΑΛΑΝΗΡΟΣ.** Glandifer.  
**ΒΑΛΛΩ.** Germino, ix. 22.  
**ΒΑΣΙΔΙΚΑ** τα. Nuces Juglandis.  
**ΒΑΛΣΑΜΟΝ** το. "Balsam of Mecca or Tolu," (vid. p. 25.) ix. 7.  
**ΒΑΦΗ** χαλυδος. Acies ferri, cuius manipulatio antiquis haud ignota, v. 4.  
**ΒΕΧΟΣ.** Instrumentum rusticum. de C. Pl. iv.  
**ΒΗΜΑ.** Mensura, Passus, "a pace."  
**ΒΙΟΙ** φυτων. 1. stationes, L. i. 7, 23. 2. effectus foli, aëris, &c. respectu fanitatis et durationis vitæ in arboribus, iv. 1, 13, 14.  
**ΒΛΑΣΤΟΣ.** Surculus primus ex radice, i. 5. *παρελασος*, surculus secundarius ex ramis.  
**ΒΛΑΣΤΗΣΙΣ.** Prima germinatio. Vid. Calendarium *Βλασησιων*, iii.  
**ΒΛΑΣΤΟΛΟΓΙΑ.** Pampinatio in vite. N. B. Tres *αμπελουργιαι*. 1. *τομη*. 2. *διακαθαρσις*. 3. *βλαστολογια*. 1. amputatio generalis hyeme. 2. amputatio furculi teneri. 3. avulsio gemmarum ope manuum, &c.  
**ΒΛΟΣΥΡΟΣ.** 1. Fæculentus. *πιττα βλοσυροτερα*. 2. de furculis; turgidus, *οσαι λιμναιαι, βλοσυροτεραι*. de C. Pl. v.  
**ΒΟΛΒΙΤΟΣ.** Fimus bubulus, v. 7.

ΒΟΛΒΟΣ. Bulbus plantæ.

ΒΟΛΗ. Lapsus uvarum immaturus. de C. Pl. i.

ΒΟΡΒΟΡΩΔΗΣ. Fæce vel terra mixtus.

ΒΟΤΑΝΙΖΩ. Herbas noxias evello, "to weed." de C. Pl. iii.

ΒΟΤΡΥΣ. Racemus uvarum, item racemus quivis, vel collectio baccarum vel florum. Βοτρὺς Πτελεας, fructif. iii. 6. Generatur βοτρὺς ἐν ἀμπέλοις ἐκ μητρᾶς κληματα ἐκ τοῦ περιεχόντος. de C. Pl. iii.

ΒΟΤΡΥΟΝ. id. Βοτρυὸν τῆς Δαφνῆς, iii.

ΒΟΤΡΥΧΙΟΝ. dim. de C. Pl. iii.

ΒΟΤΡΥΟΕΙΔΗΣ. ἀπο μίας κορυφῆς, καὶ πολλῶν μισχῶν. de umbella floris. Bot. iii. 12.

ΒΡΑΓΧΙΟΣ. Branchiæ, "the gills of fishes," iii. 9.

ΒΡΑΔΥΣ εἰς τροφήν. Concoctus difficilis. opp. ἐγγυτέρῳ τῆς τροφῆς. de C. Pl. iv.

ΒΡΑΧΕΙΣ. Madefactus, a βρέχω, "steeped in water," v.

ΒΡΥΟΝ. 1. Amentum Quercus, &c. a βρύω, abundo, iii. 6. 2. Thyrsus florum, ut Thymi Diosc.

ΒΡΥΣΟΔΕΨΙΚΗ. per transp. pro βυρσοδεψικῇ, Ars coriaria.

ΒΡΥΤΟΝ. Cerevisiæ sp. βρυτ. ἀπο Κριθῶν, "Ale." N. B.

Ἄν ζῆθος spec. divers. vel statu effervescenti? Vid.

## Γ.

ΓΑΛΒΑΝΟΝ. Gummi Bubonis, Galbani L.

ΓΑΛΕΑΓΡΑ. Tendicula captandis feris. ex ligno duro Πτελεας, &c. "a hutch trap." v. 8.

ΓΑΝΩΔΗΣ. Fertilis: γῆ γανωδῆς, vi.

ΓΕΛΓΙΣ. Divisio capituli Allii; "a clove of garlick."

ΓΕΛΓΙΟΟΜΑΙ. id.

ΓΕΝΕΣΙΣ. Propagatio plantarum, i. 4.

ΓΕΝΕΣΕΙΣ αἱ. Proventus arborum. de C. Pl. iv.

ΓΕΝΝΩΜΕΝΑ μερῇ τᾷ. In arboribus partes fructiferæ. Mold. i. 4.

ΓΕΝΟΣ, apud Theophr. speciem vel varietatem indicat, pass.

ΓΕΡΑΝΔΡΥΤΑ τᾷ. Annosæ arbores. Quercus nodosæ ætate, iii. 12.

ΓΕΥΟΜΑΙ. Gustu experimentum facere, ix. 2.

ΓΕΥΣΙΣ. id. item morbus fimilis ἀφῆς.

ΓΙΓΑΡΤΟΝ. Acinus uvæ: ἐξ αἰρουμένης τῆς μητρᾶς ἀγιγαρτοῖ. de C. Pl. v.

ΓΛΙΣΧΡΟΣ. Tenax. de ligno, ὅσα γλισχρά εὐκαμπῇ, v. 6.



- de C. Pl. iv. de fructu, τα γλισχρα πλειονος πεψεως δει-  
ται. de C. Pl. iv. differentia  
inter γλισχρος et λιπαρος,  
prior ex humido, posteriore  
ex oleoso? lign. Platani ex-  
emplum γλισχροτητος pecu-  
liare, v. 4.
- ΓΛΙΣΧΡΟΤΗΣ των καρπων. id.  
de C. Pl. iv.
- ΓΛΟΙΟΣ. Debilis, cariofus :  
opp. τρωισχυρῳ. de lignis, v. 5.
- ΓΛΥΚΥΣΤΡΥΦΝΟΣ. Astringens  
cum dulcedine. Vid. Στρυφ-  
νος, ix. 22.
- ΓΛΩΤΤΑ. Lingula in fistulis,  
“the tongue-piece,” iv. 12.
- ΓΟΓΓΡΟΣ. Morbus in truncis et  
ramis majoribus : forsan can-  
cri spec. Radix videtur ig-  
nota, i. 12.
- ΓΟΝΥ. Nodus in caulibus gra-  
mineis, &c. item flexura.
- ΓΟΝΑΤΩΔΗΣ. id. i. 6.
- ΓΡΑΜΜΩΔΗΣ. Linearis, Bot.  
γραμμῶδεις μισχοι (tenues)  
σπερματα γραμμῶδη, iv. 13.
- ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΟΣ. Nudo fe-  
mine, de feminibus umbelli-  
ferarum ; minime Gymnosp-  
pus Linn.
- ΓΥΡΟΙ. Foveæ circulares arbo-  
ribus plantandis destinatae.  
de C. Pl. iii.
- ΓΥΡΩΜΑΤΑ. Venarum cir-  
cumvolutiones, vel gyri in  
ligno ; præcipue ad nodos,  
v. 6.
- ΓΩΝΙΑ. 1. Eminentia acuta, “a  
ridge,” folium κυπείρου (vid.)  
desc. ὡς γωνιοφυλλος· εκ δυοιν  
συνθετον, και το μεσον οιον τρο-  
πις, (carina,) i. 16. 2. an-  
gulus : sic de folio Hederæ,  
γωνιοφυλλος· ουδεν σχημα περι-  
καρπιου γωνιας εχει? i. 18.
- ΓΩΝΙΟΕΙΔΗΣ. id.
- Δ.
- ΔΑΔΟΟΜΑΙ. de pice extra-  
henda. de C. Pl. v. Vid. δαῖς,  
δας, tæda.
- ΔΑΔΟΦΟΡΕΩ. Picem genero,  
ix. 2.
- ΔΑΔΩΔΗΣ et ενδαδος. de ligno  
et radicibus, Gen. Pinus L.  
refinosum, ib.
- ΔΑΙΣ, δας. Lignum fissile Pinus ;  
εξαιρουμενης της δαδος, και καιο-  
μενης, ἢ της πιττας εκροη, ix.  
2. Vid. manipulationem ibi  
exacte descriptam.
- ΔΑΚΡΥΑ τα. Refina in globu-  
los concreta, ii. 16. vi. gum-  
mi etiam sponte fluens.
- ΔΑΚΕΤΑ τα. Morfus veneno-  
si Viperæ &c. ix. 21.
- ΔΑΦΝΙΣ. Lauri bacca ; drupa,  
Bot.
- ΔΑΦΝΩΔΗΣ. Sature viridis.  
N. B. Tres occurrunt colo-  
ris viridis varietates ; Angl.  
“ shades of green.” 1. δαφνω-  
δης. 2. πρασωδης. 3. χλοερος.  
Vid. ix. 11.
- ΔΕΙΝΟΣ. Efficax, “strong,” οἱ

χυλοι των ριζων δεινότεροι του των φυτων, i. 11.

ΔΕΝΔΡΑ τα. Vegetabilium divisio quadruplex. 1. Δενδρα. 2. Φρυγανικα. 3. Θαμνοι. 4. Πωδεις. N. B. Distinctio inter 2dam et 3tiam haud satis constat: an θαμνοι idem quod επετειοι, perennes? Aliibi λοχυμωδης occurrit, de calamo, &c. Frutex paludofus? (vid.)

ΔΕΝΔΡΑΔΗΣ. fyn. δενδρωδης. de C. Pl. iii.

ΔΕΝΔΡΥΦΙΟΝ. Arbusculum. Dim. Corallinis applicatur, iv. 8.

ΔΕΧΟΜΕΝΟΣ. Proxime succedens; εν τῷ δεχομενω ετει, και τῷ τριτω, vii. 1.

ΔΗΚΤΙΚΟΣ. Pungens: de fucco, vi.

ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ. Cerealis. δημητριος καρπος. de C. Pl. iii.

ΔΙΑΔΥΝΑΜΑΙ. Valde efficio, iii.

ΔΙΑΚΑΘΑΡΣΙΣ. Operatio, horticulturæ. Vid. Βλαστολογία.

ΔΙΑΚΟΡΗΣ. Satureus valde, i.

ΔΙΑΚΤΟΡΙΑ. Cantus vehementior, vel acutior. Hinc Mercurius apud Homerum διακτορος Αργειφοντης. Tibiæ γλωττα συμμυει τῷ χρονῳ, (per ætatem contrahitur,) et inde χρησιμος προς την διακτοριαν. N. B. Forf. ἡ διακτορια in scena antiqua cantus prælu-

dens, Angl. "overture," iv. 12.

ΔΙΑΠΑΤΤΟΜΕΝΟΣ. Conculcatus, viii. 11.

ΔΙΑΠΑΛΗΣ. Saturè plenus. de C. Pl. ii.

ΔΙΑΠΙΑΙΝΟΜΑΙ. Saturor ex omni parte. de C. Pl. vi.

ΔΙΑΠΝΟΗ. Evaporatio. Vid. Διατμιζω. de C. Pl. vi.

ΔΙΑΠΤΥΣΣΩ. Expando. κοπτοντες εν τῷ ὀλμῳ, και διαπτυσαντες λεπτα, και επιπαττοντες εφ' ὕδωρ. Methodus præparandi Cicutam, ix. 17.

ΔΙΑΠΥΡΟΣ. Fervidè candens, "red hot," iv. 8.

ΔΙΑΡΡΕΩ. Late evagor. de Nilo. de C. Pl. vi.

ΔΙΑΣΤΟΛΗ. Intervallum, *bot.* de C. Pl. iii.

ΔΙΑΤΜΙΖΩ. Evaporare facio. τα μεν χυλων εκκρινει, η διατμιζει· τα δε παχυνει και συνησησι. de C. Pl. vi.

ΔΙΑΦΕΡΟΝ το. Excellens quoddam, ix. 14.

ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΣ. Eximie.

ΔΙΑΦΟΡΗ. Excellentia, iv. 4.

ΔΙΑΦΟΡΟΝ. id. si non error textus.

ΔΙΑΦΥΣΕΙΣ αι. Internodia caulina, *Bot.* iv. 10.

ΔΙΑΦΥΩ. *act.* Penetro. de C. Pl. v.

ΔΙΑΦΥΩ. *pass.* Minus apte, vel loco alieno nascor, de C. Pl. iii.

ΔΙΑΦΩΝΕΩ. Discrepo, iii. 10.

ΔΙΑΧΕΩ. de diffusionem, ix. 15. opp. τῷ συναγειν, "to coagulate."

ΔΙΑΧΥΣΙΣ. Diffusio æqualis: de coctione fabarum et pisorum, "when they are reduced to a smooth paste."

ΔΙΕΝΝΑΘΗΡΙΣ. Novennium, iv. 12.

ΔΙΕΝΝΑΕΘΗΡΗΣ. Novennis.

ΔΙΕΤΡΥΝΟ. Dilato. de C. Pl. v.

ΔΙΗΘΗΣΙΣ. Percolatio, ib.

ΔΙΗΚΩΝ. Quod transversim pervadit? ἐν τῷ διηκοντι. τῆς γελγίδος. Vid. de C. Pl. vi.

ΔΙΗΡΘΡΩΜΕΝΟΣ. Nodos transiens, permeans.

ΔΙΘΥΡΟΙ. Januæ bivalves, viii. 2.

ΔΙΚΑΡΙΟΣ. Fructus duorum annorum simul gerens. de arb. quibusdam, iii. 6.

ΔΙΚΕΛΛΑ. Instrumentum rusticum: ligo biceps. Angl. "a double hoe." de C. Pl. iii.

ΔΙΚΡΑΝΗΣ. Biceps, cacumine fissio, ix. 12.

ΔΙΜΕΡΗΣ. Bi-partitus, viii. 2.

ΔΙΞΟΟΣ. Duplici venarum cursu. Vid. μονοξοος et κτηδων, v. 2.

ΔΙΠΑΛΑΙΣΤΗΣ. Duas palmas altus, iv. 12.

ΔΙΦΟΡΟΣ. Vid. διακρος.

ΔΙΩΚΩ. simpl. (pro διωκω βιον) Vivo. πρὸς ἕτερον διωκει, de pl. scandente, Bot. de C. Pl. ii.

ΔΟΡΑ. Cortex arboris, ix. 2.

ΔΟΧΟΣ. Facile suscipiens: δοχος ουσια ὑγρου: δερμου. de C. Pl. ii.

ΔΡΙΜΥΣ. Acris, pungens. de odore, vi. 7.

ΔΡΟΣΟΒΟΛΟΣ. Roridus: ubi rores abundant. δροσοβολαι χωραι. de C. Pl. vi.

ΔΡΥΠΕΤΗΣ. Vid. δρυπεψ. de C. Pl. ii.

ΔΡΥΠΕΨ. 1. Fructus maturus et deciduus, παρ. N. B. Δρυς pro quavis arbore. 2. Bacca Oleæ, iv. 17.

ΔΡΥΠΗΣ. Fructus quidam. (Hinc forsitan Drupa Linn.) ακατος, δρυπης.

ΔΡΥΦΑΚΤΟΝ. Ager sepibus cinctus? iv. 5.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ αἱ. Vires plantarum.

ΔΥΣΜΟΙ οἱ. Occidens, ανεμος απο δυσμων, κλαυθμος dict. (for. καυθμος,) "the Sirocco." de C. Pl. v.

ΔΥΣΡΙΤΟΣ. Frigoris impatiens, vi. 7.

ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ. Aliquod ingratum respectu saporis. de C. Pl. vi.

## E.

ΕΓΓΕΙΟΣ. de terra; opp. τῇ ἐνυδρῳ, iv. 7.

ΕΓΓΥΣ πρὸς. Proxime accedens ad: κατ' ευωδιαν οὐκ ἐγγυς πρὸς ἐκείνον, "not near so fragrant as." de C. Pl. vi.



ΕΓΚΕΝΤΡΙΖΩ. Perforo: dicitur de actione succum vel refinam extrahendi e truncis arborum, ii. 3.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΟΜΑΙ. Ramis luxurio. de C. Pl. iii.

ΕΓΧΥΛΟΣ. Succulentus; opp. τῷ δυσχυλῶ. de C. Pl. vi.

ΕΔΑΦΗ. Varietates foli; *Agricult.* de C. Pl. ii.

ΕΔΑΦΙΕΩ. Solum complano, ix. 4.

ΕΔΡΑ. Εκπιπτειν την εδραν. de prolapsu ani, ix. 9.

ΕΙΛΗΘΥΙΑ. Σφαιριωδες τι, vel forsan pistilliforme in trunco Abietis: in magicis usitatur. de C. Pl. v.

ΕΚΑΤΕΡΟΙ. Utrique; (dicitur de duobus paribus.)

ΕΚΑΤΕΡΩΤΗΣ? Qualitas; forsan error. de C. Pl. vi. vid. sup.

ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΙΣ. Secunda germinatio; "Michaelmas shoot." iii. 7.

ΕΚΒΛΟΣΥΡΟΣ. Vid. βλοσυρος.

ΕΚΘΑΜΝΕΟΜΑΙ. Fruticesco.

ΕΚΙΔΟΝ. Oblique, iii. 13.

ΕΚΚΟΛΑΠΤΩ. Tundendo evacuο, ὡν ἐκκεκολληµενον, iii. 16.

ΕΚΚΡΙΝΩ. Secerno.

ΕΚΚΡΙΝΟΜΑΙ. Secernor.

ΕΚΚΡΙΤΙΚΟΝ το. id.

de C. Pl. v. vi.

ΕΚΛΥΤΟΣ. Languidus: succo privatus. de C. Pl. iv.

ΕΚΜΑΣΣΟΜΑΙ. Abstergor, aridus fio. de C. Pl. v.

ΕΚΠΑΠΠΟΟΜΑΙ. In pappum abeo. *Bot.* iii. 18.

ΕΚΠΑΗΞΙΣ. De arboribus; Sideratio. Vid. ασηροβολησις, ib.

ΕΚΠΝΕΥΣΙΣ φλεγμονων. Exhalationes ulcerum, i. e. ad virus extrahendum, ix. 10.

ΕΚΣΤΑΣΙΣ. Degeneratio, ab εξιστημι, infr.

ΕΚΤΗΚΩ. Emacero, ix. 3.

ΕΚΤΟΠΟΣ. Climati proprius: χειμων εκτοπος εν Θρακη. de C. Pl. vi. N. B. Forf. legendum εντοπος.

ΕΚΦΥΣΑΩ. Tumescō. de C. Pl. iii.

ΕΚΦΥΣΗ ἡ. Tumor. de C. Pl. iii.

ΕΚΦΥΣΙΣ. Degeneratio plantæ. de C. Pl.

ΕΚΧΥΛΟΣ. Subtilis, tenuis: de succo. de C. Pl. vi.

ΕΛΑΙΟΝ. N. B. Usus Olei occurrit in maturandis Ficubus. de C. Pl. ii. item ad enecandas radices arborum, ib.

ΕΛΙΞ. Cirrus; *Bot.* i. 3.

ΕΛΚΗΘΡΟΝ. Buris aratri, vi.

ΕΛΚΟΜΑΙ. Distorqueor, "to be warped." de ligno, v. 7.

ΕΛΚΟΟΜΑΙ. Perforor. N. B. ἑλκος foramen in trunco Abietis, per quod refina fluit, iv. 19.

ΕΛΛΟΒΟΣ. Siliquosus, viii. 1.

ΕΛΜΙΣ πλατεια. Tænia lata: Angl. "tape-worm," ix.

ΕΜΒΙΩΣΑΣ. Vitam pertrahens, vi. 7.

ΕΜΒΟΘΡΟΝ. adv. plane? in

puteo. οὐκ ἐμβοθρον (τιθεασι)  
ἀλλὰ τὰς σχιζὰς "the bil-  
lets," ὀρθὰς πρὸς ἀλλήλας, (fur-  
fum inclinantes,) ix. 3. sed  
forsan textus corruptus.

ΕΜΒΟΛΗΤΟΣ. Gleba involutus.  
de C. Pl. v.

ΕΜΒΟΛΟΣ. Navis rostrum æra-  
tum, vi. 8. ab ἐμβάλλω, ex  
modo pugnae navalis.

ΕΜΒΡΥΟΝ, in plantis τὸ μέλλον  
βλαστειν. N. B. Vox βρυον  
(amentum Bot.) de racemo  
flosculorum fugacium. de C.  
Pl. i.

ΕΜΜΗΤΡΟΣ. Medullam ha-  
bens, i. 9.

ΕΜΦΥΤΕΙΑ. Infitio, *borticult.*  
"grafting." de C. Pl. i. vid.  
ἐνοφθαλμισμός.

ΕΜΦΥΤΕΥΩ. ii. 1.

ΕΝΑΕΝΑ τὰ. Annua: διενα, bi-  
ennia.

ΕΝΔΑΔΟΣ. Pice abundans, ix.  
4.

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ. imperf. οὐκ ἐνδε-  
χεται λαβεῖν, non admittit  
convenienter, iv.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΝ τὸ, quod con-  
venit, ii. ib.

ΕΝΔΙΔΩΜΙ. Cedo: κλινὰρξια ἐν-  
διδόντα, an lectuli elastici?

ΕΝΕΙΛΕΩ. Obvolvo? ἐνεῖλαντες  
ἐν γλυκεῖ, ix. 9.

ΕΝΙΑΥΤΟΦΟΡΟΣ. De arbore  
cujus fructus annum durat in  
arbore; aliter δικάρπος.

ΕΝΟΦΘΑΛΜΙΣΜΟΣ. Infitio  
gemmæ (οφθαλμου) in arbo-

ribus; Ang. "budding?"  
Vid. ἐμφυτεία. de C. Pl. i,  
N. B. Ex descr. apud Theo-  
phr. l. c. ἐμφυτεία videtur in-  
fitio per incisionem, καὶ ξυ-  
λου σχισιν, "cleft-grafting;"  
ἐνοφθαλμισμός infitio, per re-  
laxationem corticis, "rind-  
grafting."

ΕΝΤΑΥΘΑ. Hac de causa, *pass.*

ΕΝΤΕΡΙΩΝΗ. Pars interior,  
five medulla ligni, iii. 8.

ΕΝΤΟΜΑ τὰ. Insecta: hinc ἐν-  
τομολογία. de C. Pl. vi.

ΕΝΤΟΜΗ. Folii incisura, vel di-  
visio in lobos, i. 16.

ΕΝΤΜΕΝΟΣΠΕΡΜΑ. Hymeno-  
sperma L. femine membrana  
incluso, vel pericarpio laxo,  
viii. 7.

ΕΞΑΔΥΝΑΤΕΩ. Elanguesco, iv.

ΕΞΑΙΓΕΙΡΟΜΑΙ. De Populo,  
(Αιγείρω) habitum mutare,  
de C. Pl. ii.

ΕΞΑΜΒΛΩΣΙΣ. Abortio, ix. 9.

ΕΞΑΝΘΗΣΙΣ. Deflorescentia.

ΕΞΕΛΑΙΟΟΜΑΙ. Super satura-  
tus sum Oleo: unde efflu-  
vium fit; de C. Pl. vi.

ΕΞΕΠΙΘΔΕΣ. Consulto. de C.  
Pl. v.

ΕΞΕΣΜΕΝΟΣ. Rafus, a ξέω, ib.  
iii.

ΕΞΙΚΜΑΩ. Humorem perdo,  
vii. 5.

ΕΞΙΝΩΩ? Evacuo.

ΕΞΙΣΤΗΜΙ. Degenero. de C.  
Pl. v.

ΕΞΥΒΡΙΖΩ. Luxurio. de arb. ii.

- ΕΠΑΚΑΝΘΙΖΩ. Leviter spinosus sum, ix. 4.
- ΕΠΑΛΛΟΚΑΥΛΟΣ. Caule scandenti, *Bot.* iii. 8.
- ΕΠΑΜΑΟΜΑΙ. Accumulo, iv. 15.
- ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ. Recupero. de C. Pl. iii.
- ΕΠΑΦΗΣ. Tactu sensibilis.
- ΕΠΕΣΘΙΩ. Edo post aliquod, insuper edo.
- ΕΠΕΤΕΙΟΚΑΥΛΟΣ. Planta caule caduco, radice perenni, Angl. "a perennial plant," vii. 7.
- ΕΠΕΤΕΙΟΚΑΥΛΕΩ. id.
- ΕΠΕΧΩ. Duro, continuo. de C. Pl. iii.
- ΕΠΙΒΑΛΛΩ. Attribuo. καὶ ὅσον ἐπιβάλλειν τοῖς γενεσίν, viii. 5.
- ΕΠΙΒΛΑΣΤΑΝΕΙ. De germinatione Autumnali, vii. 2.
- ΕΠΙΒΡΟΧΟΣ. Madidus. γῆ ἐπιβροχος, viii. 6.
- ΕΠΙΓΕΙΟΚΑΥΛΟΣ. Caule prostrato. *Bot.*
- ΕΠΙΓΕΙΟΦΥΛΛΟΣ. Foliis radicalibus, *Bot.* vii.
- ΕΠΙΔΟΞΑΖΟΜΕΝΟΣ. Suspiciatus; per conjecturam. de C. Pl. i.
- ΕΠΙΔΟΣΙΣ. Incrementum, proventus, i. 5. de C. Pl. iii.
- ΕΠΙΘΕΤΑ τα. Commentitia. τα ἐπιθετα, καὶ πορῶθεν, "far fetched, and with additions," ix. 9.
- ΕΠΙΚΑΥΛΟΦΥΛΛΟΣ. Folioso caule, vii.
- ΕΠΙΚΑΩ. Inuro. N. B. Vox καίω usitatur de effectu frigoris, utpote et caloris; item de morfu venenoso pecorum. de C. Pl. v.
- ΕΠΙΚΗΡΟΣ. Morbo obnoxius. Angl. "tender," vi. 7.
- ΕΠΙΚΝΙΖΩ. Unguibus vello, "to nip off." de C. Pl. iii.
- ΕΠΙΚΟΠΗ. Succisio, decacuminatio. de C. Pl. v.
- ΕΠΙΚΥΙΣΚΟΜΑΙ. Actus superfætationis; utpote in leporibus. de C. Pl. i.
- ΕΠΙΚΥΠΤΩ. Declinare facio, "to weigh down." de C. Pl. iii.
- ΕΠΙΝΕΩ. Supernato, ut lignum. in aqua, vi. 3.
- ΕΠΙΞΥΝΔΕΩ. Strictius alligo. de C. Pl. ii.
- ΕΠΙΠΑΤΤΩ ἐφ' ὕδαρ. Sensim in aqua tractando, manibus miscere, ix. 17.
- ΕΠΙΠΟΛΑΖΩ. In superficie fluito.
- ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΣ, ab ἐπιπολής, superficialis; de radicibus opp. βαθεῖ.
- ΕΠΙΡΡΥΤΟΣ. Inundatus: γῆ ἐπιρῦτος, *Agric.* "flooded ground."
- ΕΠΙΣΙΝΗΣ. Noxius.
- ΕΠΙΣΠΑΣΙΣ. Attractio. de C. Pl. v.
- ΕΠΙΣΠΟΡΑ. Secunda satio. ἐπισπορα τα de plantis quæ sæpius in anno feruntur, vii. 1.



ΕΠΙΣΤΑΣΙΣ. Continuatio habitus : opp. *εκστασει*. de C. Pl. v.

ΕΠΙΣΥΝΑΓΚΑΙ. Valles quædam Aficæ. de C. Pl. v.

ΕΠΙΣΧΙΖΩΝ. Ab imo divisus. de C. Pl. v. N.B. *Δενδρα επισχιζοντα* opp. *μονοσελεκεσι*.

ΕΠΙΤΑΣΙΣ. Impulsus. de C. Pl. ii.

ΕΠΙΦΑΝΗΣ. Violens. *αηρ θολερος και επιφανης*. de C. Pl. v. sic *χειμων επιφανεστατος*. Polyb.

ΕΠΙΦΟΡΑ. Proventus secundus. de C. Pl. v.

ΕΠΙΧΡΟΙΣΙΣ. Levis coloratio, "a light staining." de C. Pl. ii.

ΕΠΟΥΛΟΣ. Vid. *ουλος*, iii. 10.

ΕΠΩΤΙΔΕΣ. Prominentiæ laterales utrinque ex puppi, ubi navis nomen inscribebatur. *Poll.* v. 7.

ΕΡΤΑΣΙΑ. Manipulatio. *ε. της πιττης*, ix. 2.

ΕΡΕΨΙΜΟΣ. Ad tecta facienda. *ξύλον ερεψιμον*, "roof timber," v. 4.

ΕΡΙΝΟΝ το. Fructus Ficûs, *sylvestris*.

ΕΡΙΟΛΑΜΒΑΝΩ. Percolare ope lanæ; "to strain through wool," ix. 8.

ΕΡΥΣΙΒΗ. Robigo; morb. Forf. Uredo, Perfoonii. Fungi species. de C. Pl. iii.

ΕΣΧΑΡΑ. Pars plana Πυρρειας, (vid.) fovea circularis, ubi circumagitur το τερετριον ad

accendendum ignem, v. 10.

ΕΣΧΑΤΕΤΟΝΤΑ τα. Apices ramorum, &c. de C. Pl. v.

ΕΤΟΣ φερει ουκ αρουρα. Adagium vetus: plus cælo quam terræ tribuendum, viii. 8.

ΕΥΑΤΜΩΤΟΣ. Volatilis. de C. Pl. ii.

ΕΥΑΥΡΟΣ. Bene fitus, bene ventilatus, viii. 11.

ΕΥΑΦΗΣ. Tractabilis. *γη ευαφης*. de C. Pl. ii.

ΕΥΔΙΑΙΝΟΣ. τοπος κοιλος και ευδαινος, "a well sheltered mild situation," iii. 4.

ΕΥΕΜΕΩ. Vomitus ciere fine dolore, ix. 11.

ΕΥΕΤΗΡΙΑ. Anni prosperitas, viii. 8.

ΕΥΗΚΩΣ. Facilis, pronus; ab *ακουω*. *ευηκοτα προς μεταβολην*. de C. Pl. ii.

ΕΥΘΥΠΟΡΕΩ. De arboribus, "to grow straight."

ΕΥΚΤΗΔΩΝ. Vid. *κτηδων*.

ΕΥΟΓΚΟΣ. Levis, portatu facilis, ix. 17.

ΕΥΟΔΕΩ. Luxurio, i. 9.

ΕΥΣΤΟΜΟΣ. Gratus palato, "relishing."

ΕΥΤΟΝΟΣ προς. Aptus ad. de C. Pl. v.

ΕΥΧΥΛΟΣ. Succulentus, viii. 10.

ΕΥΩΔΙΑ. Gratus odor. N.B. *Γυπες averfantur odores; apibus etiam nocivi sunt; nec datur animal, homine excepto, εωδια gaudens αυτης χαριν*. de C. Pl. vi.

ΕΦΑΛΜΑ το. Morbus arb. ex nimio sale? de C. Pl. v.

ΕΦΗΛΙΔΕΣ. Solis maculæ, "freckles," ix. 22.

ΕΦΗΜΕΡΟΝ φαρμακον. Venum quod cito enecat (eodem die,) ix. 6.

ΕΧΙΝΟΣ. 1. Placentæ genus ex farina cruda. 2. morbus ex ejus usu. de C. Pl. iv.

ΕΧΟΜΕΝΑ τα. Quæ succedunt, i. 1.

ΕΩΜΕΝΟΣ. "Left to itself," vi. 6.

## Z.

ΖΗΘΟΣ. Cerevisia (a ζεω ferveo, "to mantle." Αρχαιοινου φυσικως ζηθου εκ τεχνης. de C. Pl. vi. N. B. An differentia inter ζηθον et βρυτον? Vid.

ΖΥΓΙΝΟΣ. Carpineus, v. 6.

## H.

ΗΘΙΚΟΣ. Percolatus. οινοι ηθικοι. de C. Pl. vi.

ΗΛΟΣ. 1. Clavus; 2. Innatum quoddam in trunco Oleæ coni instar acuti? An Schlerotium, vel Hypoxylon? Bot. N. B. Semel vidi specimen ex Portugallia, iv. 16.

ΗΛΙΟΣ εκνεφελος. (fine nubibus) Obstat aliquando arboribus,

viii. 10.

ΗΜΕΡΟΥΝΤΕΣ οι. Qui terras incultas subigunt. de C. Pl. v.

ΗΜΕΡΩΜΑΤΑ τα. Animalia mansuefacta, pecora, ib.

ΗΜΙΒΡΑΧΗΣ. Sub-madidus. de C. Pl. iii.

ΗΜΙΗΛΟΣ. Sub-solanus, ib.

ΗΡΙΝΟΣ. id. q. ιρινος, ab ιρις, Iris, viii. 7.

## Θ.

ΘΑΛΑΜΩΔΗΣ. Foraminofus. N. B. Vox θαλαμος, apertura narium; λιθοι θαλαμωδεις (porosi.) de C. Pl. vi.

ΘΑΛΕΙΑ. } 1. Ramulus tener  
ΘΑΛΛΙΑ. } herbaceus. de C. Pl. v. 2. Frondescentia, vel frondosus rami vestitus.

ΘΑΜΝΟΙ. Plantarum divisio. Vid. δενδρον.

ΘΕΡΜΟΣ συμφυτος. Calor innatus; vitalis Mold. i. 3. ξυλα δερμα. Vid. ξυλον, πυρεια.

ΘΗΛΥΣ. Vid. αρξην supr. N. B. Non semper de sexu in Diæciis pl. N. B. Hinc ελατης spec. θηλεια vocatur, i. e. minus robusta. Alibi vox ut distinctio sexualis occurrit.

ΘΗΡΙΑΔΙΑ. Animalcula.

ΘΟΛΕΡΟΣ. Turbidus. H. de differentia inter animalia et plantas dicitur ὅσω θαλερωτε-

ρα και ψυχροτερα, (τα φυτα,) τοσσητον απεχειν του ζωα ειναι : forsan minus cocti.

ΘΟΛΟΕΙΔΗΣ. Cancellatus, clathratus. (Vid. Præfat. operis.) iii. 10.

ΘΟΡΟΣ. Piscis masculi lac feminine ; " the milt." 'Ο αρ-  
ήν ιχθυς επιρῥαινει τοις ωοις  
αποτικτομενοις τον θορον. de C.  
Pl. ii.

ΘΡΑΥΟΜΑΙ. Lacero : de ef-  
fectu falis in enecandis plan-  
tis. de C. Pl. vi.

ΘΡΙΟΝ. Folium ficulneum. de  
C. Pl. v.

ΘΥΣΑΝΟΙ. fimbriæ ; filamen-  
torum fasciculi, " a fringed  
edge," " tassels."

ΘΥΣΑΝΩΔΗΣ. Fimbriatus.

## I.

ΙΑΙΟΣ. Peculiaris, extraordina-  
rius, *pass.*

ΙΑΙΟΤΗΣ. *supr.*

ΙΘΜΟΣ. forf. diversus ab ιθμα-  
τι ? διεισιν ὡς ιθμος, (transit  
per aquam ut atomus ?) ουκ  
εχον ὃ γεγει, (non inveniens  
unde suspendatur.) de C. Pl.  
vi.

ΙΚΜΑΣ. Succus feminalis, vel  
simpliciter humor, vi. 4.

ΙΚΡΙΑ τα. Opera sculptilia in  
navibus ; ornamenta lignea  
domuum. Συκαμινου ξυλον εις  
τα ικρια, και τας σεφανας, και  
ὅλως προς τον κοσμον, V. 7.

ΙΝΕΣ. 1. ξυλου. Fibræ. N.B. Li-  
bro i<sup>mo</sup>. c. 3, 4. comparatio  
instituitur inter animalia et  
vegetabilia : ut in prioribus  
ινες και φλεβες, (arteriæ et ve-  
næ,) sic in posterioribus ὡς-  
περ ινες, &c. Ινες describuntur  
συνεχεις, σχιστοι, επιμηκεις  
(congesti, vel fasciculati ; di-  
visibiles ; in longitudinem  
procurrentes ;) απαραβλητοι,  
(non confusi inter sese) αβλα-  
στοι, (non ramosi.) Congruunt  
hi cum canalibus capillaceis,  
vel lymphæductibus Grew-  
ii, Lewenhoeck, aliorumque.  
Quod ad φλεβας, vel vasa spi-  
ralia, vid. φλεψ. 2. Vermes.  
Ascarides in corp. humano,  
ix. 14.

ΙΝΩΔΗΣ. *supr.*

ΙΟΣ το. Gas, vapor ex fermen-  
tatione. τοσουτον ιος ὑφισταται  
τω οινω σακκιζομενω, ὡς και-  
εσθαι ὑπο των λυχνων. De C.  
Pl. vi.

ΙΟΥΛΟΣ. Iulus, amentum, *Bot.*  
iii. 6.

ΊΠΠΙΟΜΑΝΕΣ. Succus lethalis  
του Τιθυμαλλου, (vid. p. 12.)  
ix. 15.

ΙΣΟΠΟΔΙΑΙΟΝ. de triangulo  
æquilaterali. de C. Pl. vi.

ΙΣΧΑΣ. Fructus Απιου ισχαδος,  
ix. 10.

ΙΩΝΙΑ. Violetum ; N.B. A  
Theophrasto aliquando Vio-  
læ planta ; utpote ιον flos  
ejus, vi. 6.



Κ.

ΚΑΘΑΙΡΩ. *Pbarm.* Purgo. κ. κατω, per alvum. κ. ανω, vomitum cieo.

ΚΑΘΑΣΤΩΣ δ. Oppositum aliquod. de C. Pl. iii.

ΚΑΘΥΓΡΟΣ. Sub-madidus, i. 7. opp. καταξηρω: forf. intentionem indicat.

ΚΑΜΠΗ. Larva, Linn. vid. Tab. Systematicam; ubi transformationes insectorum accurate notantur a Theophrasto, sc. Καμπη, Χρυσάλλις, Ψυχή, Larva, Pupa, Imago L. de C. Pl. v. N. B. Σκωληξ etiam Larva quandoque ὅς εἰς ἄλλο μεταβάλλει Ζῶον πτηνόν, vii. 12.

ΚΑΝΑ. pr. κανης. Canistrum, v. 8.

ΚΑΠΤΗΡ. } Corbis spec. vas  
ΚΑΜΠΤΗΡ. } ex ligno flexili.  
de C. Pl. v.

ΚΑΠΝΙΟΣ. "Smoaky coloured;" "grey." Αμπελος καπνιος, vitis helvola, Columella. Varro de Re Rustica. Apud nos extat spec. "grey Frongnignac" dicta, ii. 4.

ΚΑΡΔΙΑ ξυλου. Pars interna trunci dura: "the heart of wood." opp. τῷ περιεὶληφоти, "the Alburnum," Bot.

ΚΑΡΚΙΝΟΟΜΑΙ. De ramis, et radicibus; implicor instar pedum cancri? "to tiller." Agric. i. 9. de C. Pl. i. 2.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Cancer, morbus arb. de C. Pl. i.

ΚΑΡΝΕΙΟΣ. Pila lanæ? iii. 16.

ΚΑΡΠΙΖΟΜΑΙ. Exhaustio, viii. 9.

ΚΑΡΥΗΡΟΣ. Nucifer, i. 16.

ΚΑΣΤΑΝΑΙΚΟΝ καρυν. Nux. Castaneæ, iv. 10.

ΚΑΣΤΟΣ? Occurrit inter aromata, ix. 7. Forf. legend. Κοστος. Tab. Syst. p. 3.

ΚΑΤΑΒΑΛΛΩ. Semino, viii. 5. 11.

ΚΑΤΑΒΟΡΟΣ. Edax: de sterili solo, "hungry land." de C. Pl. v.

ΚΑΤΑΔΕΩ. Incanto, vi. 2.

ΚΑΤΑΚΑΡΠΙΟΝ. Syn. περικαρπίου, iv. 11.

ΚΑΤΑΚΟΡΗΣ. Satureus; de colore, iv. 10.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Congruens. ουδεν καταλογον τουτων, το ανω προς το κατω, vii. 3.

ΚΑΤΑΠΑΤΕΩ. Pedibus conculco: καταπατουμενος, και συμπατουμενος, (N. B. Vox posterior conculcationem plurimorum indicat) viii. 7.

ΚΑΤΑΠΟΘΕΙΣ αἰ. Voragines cænosæ: α καταπινω. de C. Pl. v.

ΚΑΤΑΡΡΥΗΚΩΣ. Delapsus. ib. ii.

ΚΑΤΑΣΚΛΗΜΙ. Areisco, flaccidus fio. τα ανθη κατεσκληκε, πως, εκλελειπτος του οικειου θερμου. de C. Pl. vi.

ΚΑΤΑΣΠΑΣΜΑΤΑ. Vibratio-

- nes. κατασπασματα τας γλωτ-  
τας εχειν, de lingulis fistulæ,  
iv. 12.
- ΚΑΤΑΣΤΑΜΝΙΣΜΕΝΟΣ. In ur-  
ceolis fervatus: de vino; vid.  
ζαμνισκος. de C. Pl. ii.
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. Temperamen-  
tum. καταστασις ετους, viii. 8.
- ΚΑΤΑΤΡΑΓΩ. id. q. κατατρωγω.  
Comedo, ix. 12.
- ΚΑΤΑΦΕΡΟΜΑΙ. Deorsum fe-  
ror, deterior fio, iv. 15.
- ΚΑΤΑΧΑΣΜΩΜΕΝΟΣ. Hians,  
ringens, Bot. de C. Pl. vi.
- ΚΑΤΕΡΓΟΣ γη. Terra bene  
subacta: opp. γη αργη. de C.  
Pl. v.
- ΚΑΥΘΟΜΟΣ. 1. Uredo, Scal.  
morbus arborum ex nimio  
calore. 2. Ventus calidus,  
"Sirrocco," iv. 17.
- ΚΑΧΡΥΤΑΙΟΝ. } Oleum aqua  
ΚΑΧΡΥΑΙΟΝ. } mistum. de  
C. Pl. v. Forſan fæces olei.
- ΚΑΧΡΥΣ. Amentum, Bot. "Cat-  
kin," vi. 1. ix. 12.
- ΚΕΓΧΡΑΜΙΣ. Semen Ficûs, ii.  
3.
- ΚΕΔΡΙΣ. Juniperis, Cedri, L.  
bacca. de C. Pl. vi.
- ΚΕΚΛΙΜΜΕΝΟΣ. Flaccidus,  
procumbens; de foliis, iii. 10.
- ΚΕΛΥΦΑΝΩΔΗΣ. An α κελυφας,  
ανος? vel error pro κελυφω-  
δης? de C. Pl. i.
- ΚΕΛΥΦΟΣ. Putamen nucis, te-  
gumentum filiquæ, iii. et  
pass.
- ΚΕΝΤΡΑ τα. Nuclei in lapil-  
lis, v. 3.
- ΚΕΡΑΙΑ τα. Antennæ navium.  
iv. 1.
- ΚΕΡΑΜΙΟΝ. Amphora figulina.  
de C. Pl. vi.
- ΚΕΡΜΗΣΤΙ. Minutatim, v. 3.
- ΚΕΦΑΛΟΡΡΙΖΟΣ. Radice bul-  
boſâ, vii. 2. vel forſ. fuſifor-  
mi. Bot. vid. infr.
- ΚΕΦΑΛΩΔΗΣ. Radice fuſifor-  
mi, Bot. cujus apex κεφαλη  
vocatur, ix. 8.
- ΚΗΡΙΩΔΗΣ. Alveolatus; ex fi-  
militudine alveolarum favi.  
N.B. Dicitur de fitu florum,  
in plana ſuperficie pl. um-  
belliferarum, iii. 12.
- ΚΙΒΛΟΣ? ſyn. Βιβλου. ſed forſ.  
error textus, iv. 9.
- ΚΙΒΩΤΙΟΝ. Dim. cymbula, v.
- ΚΙΝΕΩ. De aſcenſu fuccûs. de  
C. Pl. i.
- ΚΙΣΣΗΡΙΣ. Pumex; lapidis ge-  
nus, ix. 19.
- ΚΙΣΣΗΡΟΙΔΕΣ. id.
- ΚΛΑΣΙΣ. Methodus ordinandi  
vites; vid. διακαρις, βλαστο-  
λογία.
- ΚΛΑΥΘΜΟΣ. Ventus calidus,  
forſan pr. καυθμος, ſupr.  
N.B. Aliter Olympias ven-  
tus: ex ambiguo ſenſu vocis  
καιω forſan ventus frigidus  
ex monte niveſo, "Vent de  
Biſe." Fr.
- ΚΛΗΜΑΤΙΔΕΣ. Dim. ramuli.  
de C. Pl. iii.
- ΚΛΙΝΑΡΙΑ ενδιδοντα. Lectuli e-  
laſtici ex ligno flexili, v. 8.

ΚΛΙΝΗ. Receptaculum in floribus compositis. *Bot.* ii. 8.

ΚΛΙΝΗΣ. Pronus, declivis: opp. *ορθῶς*. de C. Pl.

ΚΛΩΝ. Ramus major: an *κλημα* id. vel ramus secundarius? i. 1.

ΚΝΗΜΗ. Flexura, genuflectio in caule, ix. 14.

ΚΝΗΜΟΠΑΧΗΣ. Suræ crassitudine, ix. 4.

ΚΝΙΠΕΡΙΣ. Folliculus, *Bot.* a *κνίψ*, qui ibi nidulatur, ii. 9.

ΚΟΓΧΗ. 1. Mensura 2 cochlearium. 2. Bivalvis cujusdam testæ ad mensuram usitata, ix. 6.

ΚΟΚΚΟΣ. Granum: semen Mali Punici. de C. Pl. v.

ΚΟΛΟΒΟΣ. Curtus, imperfectus. *ανδρὸς κολοβόν*, alias *κολοβοανθής*, flos papilionaceus, *Bot.* viii. 3.

ΚΟΛΟΥΣΙΣ. Amputatio: *κολων ἔξω* Ἀμυγδαλῆς πρὸς τὸ γλυκαίνειν. de C. Pl. ii.

ΚΟΜΗ ἢ. 1. Pappus Tragopogonis, vii. 7. 2. Caput frondosum arboris. de C. Pl. iii. 3. Frondes in genere.

ΚΟΝΙΑΣΙΣ *τευχούς*. Dealbatio muris calce soluta, "white-washing," iv. 11.

ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ. 1. Pollen, *Bot.* ii. 8. ubi fœcundatio Palmæ fœminæ accurate describitur. 2. Collectio staminum in flore; hinc *κονιορτώδεις ανδρὸς*, de flore stamineo. vid. *χνοὺς*,

ΚΟΠΑΔΕΣ αἰ. "Coppices of wood," voce retenta.

ΚΟΠΡΟΣ. Fimus. *Agric.* Qualitates et genera *κοπρου* accurate discriminantur. de C. Pl. v.

ΚΟΠΤΟΜΑΙ. Corroder a vermibus, viii. 10.

ΚΟΡΜΟΣ. Truncus ligni: *κορμοὶ οἱ*, "Billets."

ΚΟΡΣΙΟΝ. Radix Loti, sic dicta, iv. 10. Vox Ægyptiaca.

ΚΟΡΥΜΒΑ. Corymbus, *Bot.* *Κίττε κορυμβὰ εἰς σφαίραν*, iii. 18.

ΚΟΡΥΝΗ. Inflorescentia thyrsiformis; ut Pruni, *Lauro cerasi* L.

ΚΟΡΥΝΑΩ. id.

ΚΟΥΤΛΗΔΩΝ. 1. Umbilicus 2. Cavities in radice Poly-podii; vel potius tentacula, ix. 14.

ΚΟΥΡΑ. } De tonsuris arbo-  
ΚΟΥΡΙΖΩ. } rum, ii. 2.

ΚΟΧΛΑΚΩΔΗΣ. Terra cochleis abundans; de fratribus terræ, testaceis fossilibus, ix. 10.

ΚΡΑΔΑΙ αἰ. Verrucosæ intumescentiæ magnæ molis, in truncis arborum, i. 13.

ΚΡΑΔΑΩ. id.

ΚΡΑΔΗ. Ramus major. vid. *κλων*. de C. Pl. vi.

ΚΡΑΔΟΣ. Morbus in truncis vel ramis, *ὅταν μελανθῶσι*, iv. 16.

ΚΡΑΜΒΟΣ. Morbus Oleæ, vid. desc. de C. Pl. v.



ΚΡΑΣΙΣ. Temperamentum ex mixtura: κρασὶς αἰρος, temperamentum aeris. de C. Pl. iv.  
 ΚΡΑΥΡΟΣ. Fragilis: opp. τῷ γλισχρῷ. i. 8.  
 ΚΡΕΙΤΤΩΣΙΣ. Morbus affinis ερυσιῆς.  
 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ τα. Pedunculi penfiles florum Arbuti, iii. 16.  
 ΚΡΙΝΙΟΣ. Liliaceus, α κρινον, iv. 10.  
 ΚΡΟΤΗΤΟΙ οἱ. Viæ tritæ, vi. 6.  
 ΚΤΑΝΕΑ? Pectinis spec. (vid. Præf.) iii. 10.  
 ΚΤΗΔΩΝ. Cursus venarum in ligno, v. 2. vid. μονοξοος.  
 ΚΥΑΜΟΝ το. Fructus Κυαμου, iv. 10.  
 ΚΥΕΩ. Fructifico.  
 ΚΥΗΜΑ. Pericarpium, Bot. vi. 4.  
 ΚΥΡΙΟΝ το. Principium: hinc κυριον του ζην. de C. Pl. v.  
 ΚΥΤΙΝΟΣ. Pericarpium globosum Punicæ; vel potius Calyx carnosus, εν τῷ κυτινῷ το ανθος Ποιας, i. 22.  
 ΚΥΤΤΑΡΟΝ. 1. Strobilus in Pinu. 2 Cavea in receptaculo Loti, Heleotropii, &c. iii. 6.  
 ΚΥΩΝ δ. Canis major, fidus, i. 15.  
 ΚΩΔΙΑ. Papaveris pericarpium, ix. 13.  
 ΚΩΜΥΘΕΣ. "Beds of reeds,"

vox Ægypt. iv. 2.

ΚΩΝΟΣ. Strobilus. vid. κυτταρος, i. 18.

ΚΩΡΥΚΗ. Folliculus. De floribus Ulmi, iii. 14, 15.

# Λ.

ΛΑΒΗ. Manubrium: αἱ λαβαί των εγχειριδίων, vi. 4.

ΛΑΓΑΡΟΣ. Laxus. Pharm. de alvo, ix. 11.

ΛΑΧΑΝΑ. Olera: τα προς ἡμετέραν χρεῖαν, vii. 7.

ΛΑΧΑΝΗΡΟΣ. } Divisio plantarum esculentarum in λαχανῶδη, καὶ σιτωδῆ, vii. 1.

ΛΕΑΝΤΙΚΟΣ. Lævis: item de succo molli, oleoso. Χυμος λεαντικός ἢ λεπτός, ἢ λείος. de C. Pl. vi.

ΛΕΙΜΩΝΙΟΣ. Pratenfis? Distinguitur solum in λειμωνιον, pratense; ελειον, palustre; λιμνωδῆ inundatum: γῆ λειμωνία. de C. Pl. ii.

ΛΕΙΟΚΑΥΛΟΣ. Caule lævi: opp. τῷ νευροκαυλῷ, vii. 2.

ΛΕΙΡΙΩΔΗΣ. Respectu odoris, iii. 12.

ΛΕΙΧΗΝΙΑΩ. Lichenibus infestor; de truncis arborum; "to grow mossy." de C. Pl. v.

ΛΕΚΙΘΩΔΗΣ. Instar pulmenti, iv. 10. α λεκιδος.

ΛΕΜΜΑ. Cortex arundinis, iv. 11.

ΛΕΠΙΔΕΣ αἱ. Ramenta: particulæ minutæ in aëre, "motes."

iv. 19. ὅταν αἰθρίας οὐσης (hyemis tempore) αἱ λεπίδες καταφέρονται, ὥσπερ ξυσματα, πλὴν πλατυτέρα. N. B. Forf. particulæ glaciales, ib.

ΛΕΠΤΟΓΕΩΝ. Terra levis: de qualitate foli. Angl. "a light foil."

ΛΕΠΤΟΙΝΟΣ. Fibris tenuibus, de ligno, "fine grained." vid. ius, iii. 10.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ. De particulis primordiis. Aqua pura sic dicta. de C. Pl. vi.

ΛΕΠΤΥΝΩ. Lævigo: Differt ab ἀληθεύω, molo. de C. Pl. iv.

ΛΕΠΥΡΙΑ τα. 1. Squamæ piscium; 2. Squamæ in corticibus et frondibus Fucorum, iv. 7.

ΛΕΠΥΡΩΔΗΣ. id. vii. 9.

ΛΕΥΚΑ τα. In ligno; alburnum, Bot. iii. 10.

ΛΕΥΚΟΓΑΙΟΣ. Inter foli varietates: opp. μελαγγειφ. de C. Pl. ii.

ΛΙΘΙΑΩ. Pharm. calculo laboro, vii. 6.

ΛΙΘΟΣ ἡ. Magnes. Forf. Lapis Lydius, "touch-stone." ix. 19.

ΛΙΠΑΡΟΣ. Oleofus, nitens; vid. γλισχρος. de C. Pl. iv.

ΛΙΠΑΩ. De fluxu, vel ascensu succi in arboribus: παν το δένδρον, ὅταν βλαστάνῃ, λιπαῖ,

iii. 6. δια το λιπαῖν υπεραιρετός ὁ φλοιός. ib.

ΛΙΠΟΣ. Fluxus succi.

ΛΙΠΟΤΗΣ. Morbus ex nimio fluxu. de C. Pl. v.

ΛΟΒΟΣ. Siliqua: hinc ελλοβός lobatus, μακρολόβος, &c. &c.

ΛΟΓΟΥ δεομαι. phrasís; Solutione egeo. de C. Pl. v.

ΛΟΠΑΣ. Morbus in radicibus ex nimio humore; οἶον μαδισίς, vid. λιπαῶ: præcipue in Ficu. de C. Pl. v.

ΛΟΠΕΩ. Vid. infr. λοπος, iv. 18.

ΛΟΠΙΑ. } Tempus decorticationis  
ΛΟΠΗΤΑΣ. } candi, v. 1.

ΛΟΠΙΟΣ. Tunica corticis: hinc cortex μονολοπος, πολυλοπος, i. 8.

ΛΟΥΣΣΟΝ το. In trunco Abietis nodus similis αἰγίδος: (vid.) sed albus, το λευκον λουσσον: Αἰγίς autem ευχρως δια το ενδαν, iii. 10. N. B. id. q. αἰγίς in Pinu.

ΛΟΦΟΥΡΟΙ οἱ. Equi, Afini? Vox λοφερος, crista-caudatus, ex usu caudæ equinæ ad galearum cristas: opp. τοις γελεφεροις, Ovibus, Capreis, Damis, &c. quorum cauda cylindrico-æqualis, instar stipitis, iii. 10. p.

ΛΟΧΕΙΑ. Parturitio, item met. in arboribus. de C. Pl. iii.

ΛΟΧΜΗ. Dumetum paludosum: "a jungle."

ΛΟΧΜΩΔΗ τα. Frutices ibi crescentes, iv. 9.

ΛΥΠΡΟΤΗΣ. Ariditas, macies :  
forſan a λυπηρος, triftis. de  
C. Pl. v.

ΛΥΤΙΚΟΣ. Φαρμακον λυτικον, an-  
tidotum, ix. 16.

## M.

ΜΑΔΑΩ. infr.

ΜΑΔΙΣΙΣ. Morbus Ficûs ad ra-  
dices, ex nimio humore, iv.  
16.

ΜΑΚΕΔΩΝΙΑ. Montes hujus  
regionis arboribus variis ſca-  
tent: Ελάη, Πευκη, Πίπυς, Π.  
αγρία, Φιλυρα, Φηγος, Πυξος,  
Ζυγία, Ανδραχνη, Μίλος, Αρ-  
κευδος, Τερμινδος, Ερινεος, Φι-  
λυκη, Αφαρκη, Καρυα, Διος βα-  
λανος, Πρίνος, iii. 4.

ΜΑΛΑΚΟΣ. Reſpectu temperi-  
ei cœli: αης μαλακος, “a ſoft  
air,” vi. 7. reſpectu ſaporis  
vini: opp. αυτηρω. de C. Pl.  
ii.

ΜΑΛΑΣΣΩ. Tundendo mollio,  
de C. Pl. v.

ΜΑΝΟΣ. 1. Rarus reſpectu fi-  
tûs: φυλλα μανα opp. πυκ-  
νοις, v. 3. 2. laxus, poroſus ;  
γη μανα, και ευδιοδος, i. 8.  
ξύλον μανον, i. 6.

ΜΑΝΟΤΗΣ, id.

ΜΑΣΑΩ. } De actione man-  
ΜΑΣΗΜΑ. } ducandi: “chew-  
ΜΑΣΗΣΙΣ. } ing,” iv. 9.

ΜΑΣΠΕΤΟΣ. Folium Silphii,  
vi. 3. N.B. Vox Syriaca ?

ΜΑΣΧΑΛΗ. Axilla rami, vel  
folii, Bot. iii. 9.

ΜΑΤΙΑΙΟΣ. Per contractionem  
pr. ναματιαιος· ὕδωρ ματιαιον,  
aqua fontinalis, ii. 8.

ΜΕΛΑΓΓΕΙΟΣ. } Soli ſpec. Α-  
ΜΕΛΑΓΓΕΩΣ. } gric. γη πιειρα  
και μελαγγειος, “a rich black  
mould.” de C. Pl. ii.

ΜΕΛΑΝΔΡΥΟΝ. Cor ligni quer-  
cûs, vel generaliter; Δρυς  
enim vox generalis: opp. τοις  
λευκοις. (vid. τα λευκα) i. 9.

ΜΕΛΑΣ. } De colore; ob-  
ΜΕΛΑΝΙΑ. } ſcuritatem quan-  
dam indicat; ita apud nos,  
“dark coloured,” v. 4. et paſſ.

ΜΕΛΙ. Methodus edulcorandi  
ſpecies quaſdam infuſione  
ſeminum in melle. de C.  
Pl. v.

ΜΕΛΙΤΤΑ. Averſatur unguenta  
pretioſa. de C. Pl. vi.

ΜΕΛΙΤΤΟΥΤΑ. Placenta farrea  
melle condita: παγκαρπος  
μελιττουτα, in qua ſαφιδες,  
aliique fructus paſſi: “a  
plum cake.”

ΜΕΡΟΣ· κατα μέρος· ανα μέρος,  
ſucceſſive, vii. 3. et p.

ΜΕΣΟΓΟΝΙΟΝ. Internodium,  
iv. 12.

ΜΕΤΑΒΛΑΣΤΑΝΩ. Iterum  
germino: δένδρα αυτοματως  
μεταβλαſτανει, μεταβολης τινος  
γινομενης εκ των ουρανιων, ii. 7.

ΜΕΤΑΛΛΑ τα. Fodinæ metal-  
licæ, ix. 13.

ΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΑ τα. Mi-



neræ crudæ; “Ores.” de C. Pl. vi.

ΜΕΤΕΩΡΟΣ. Superficialis; de radicibus, iii. 11.

ΜΗΛΙΝΟΕΙΣ. Subflavus, iii. 11.

ΜΗΛΙΝΟΣ, α μηλον. Flavus. de C. Pl. ii.

ΜΗΡΙΚΑΖΩ. } Rumino. N. B.

ΜΗΡΥΚΑΖΩ. } Animalia distinguuntur in μηρυκαζονία, et λοφουρα, (vid.)

ΜΗΤΡΑ. 1. Medulla, pars cava, vasculosa in truncis et ramis: το μεταξύ του ξυλου, τριτον απο φλοιου, i. 3. 2. Interior pars trunci in adultis, aliter καρδια, εγκαρδιον, εντερικωνη. N. B. evanescit ætate ἡ μητρα. In quibusdam, ut observat Theoph. est ὑμενωδης, (vasculosus,) in aliis σαρκωδης, in aliis ξυλωδης, i. 9. Μητρα μαλιστα ξωτικον. de C. Pl. v. Hinc cel. Linn. in Amœnit. “vita plantarum in substantia medullari consistit;” forf. in junioribus: sed de hoc inquirendum.

ΜΙΔΑΣ. Morbus in Fabis, Pis, &c. Forf. Puccinea, *Pbafseolorum* Hedw. fil. Fung. ined. t. 19. vel Uredo, *ap-pendiculata* var. β, Perfoon, Syn. 222. Fungi hi minutissimi folia et plantas totas quandoque cooperiunt, unde ex aureo colore nomen forsitan a fabula inditum.

ΜΙΚΡΟΠΗΡΗΝΟΣ. Per contract.

α πυρην, nucleo parvo. de C. Pl. i.

ΜΙΣΧΟΣ. 1. Pedunculus, Bot.

p. ὃ συνηρτηται το φυλλον. 2.

Ligonis spec. forf. tridens quoddam. vid. δικελλω. de C. Pl. iii.

ΜΟΛΥΝΣΙΣ. Tarda concoctio. de C. Pl. iv.

ΜΟΝΑΧΟΥ. Uno in loco, ix. 10.

ΜΟΝΟΚΩΛΟΣ. Simplex, Bot. non lobatus, de folio, ix. 20.

ΜΟΝΟΞΟΣ. De cursu venarum in ligno; “the grain.”

N. B. Haud facile intelligendus sensus auctoris respectu κτηδονων in ligno; (vid.) 1.

μονοξοα, vel μονοζοα, (Bot.) πλειω εισι των αλλων ξυλων.

(v. 2.) 2. Διξοα εχουσι κτηδονα μιαν εφ’ ἐκατερα της εντερικωνης· και ταυτας εναντιας αλλη-

λαις, ib. 3. Δενδρα τετραξοα, ὅσοις εφ’ ἐκατερα της εντερικωνης δυο κτηδονες εισι εναντιαν εχου-

σαι την φυσιν. ib. N. B. Lign. Pinus exemplum præbet posterioris, ex singulari modo

crescendi, sc. quatuor ramis horizontalibus; hinc κληδονων, vel cursuum venarum in lig-

no dispositio.

ΜΟΝΟΠΠΙΖΟΣ τη παχεια. Radix fusiformis. Bot. vi. 7.

ΜΟΝΟΣΤΡΟΦΟΣ. Rota simplici; μονοστροφος αμαξα, v. 8.

ΜΟΝΟΦΥΗΣ. Homogeneous. de C. Pl. i.

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΣ. Respectu germinationis feminum; Monocotyledonus. *Bot.* viii. 2.

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ τα. Surculi: opp. φυτευμασι, plantis ex femine. de C. Pl. vi.

ΜΟΣΧΕΥΩ. Propago per furculos. 1. simpl. "to plant cuttings or suckers;" 2. μοσχευειν vel προμοσχευειν ἐπ' αὐτοῦ τοῦ δένδρου, "to graff." ii. 7. et p.

ΜΟΧΘΗΡΟΣ. Met. sterilis; γη μοχθηρα, ii. 3.

ΜΥΡΙΟΠΟΥΣ? Leg. αμαυροπους, de Triangulo inæquilaterali. opp. ισοποδιαυ. de C. Pl. vi.

ΜΥΡΙΣ. Vas unguentarium: "a perfume pot."

ΜΥΟΧΟΔΟΙ. Rectius Μυοδοχοι. 1. Cavitates murium. 2. Terebrellum, "a gimlet;" cujus actio denotatur δια το περιστραφεσθαι, v. 5.

## N.

ΝΑΙΡΟΝ. Unguenti pretiosi spec. ix. 7.

ΝΑΜΑΤΙΟΣ. } Fontinalis. vid.  
ΝΑΜΑΤΙΑΙΟΣ. } per contractionem ματιαιος, supr. N. B. γαμ. ὕδωρ, opp. ὕδατι ἐκ διος, ("rain water,") viii. 7.

ΝΑΡΔΟΣ. Ung. Vid. Ναρδος, *Tab. Syst.* p. 22. "spike-nard," ib. N. B. Andropo-

gon *Schoenantbus* L. accurate delineatur et describitur in opere egregio apud Gallos "Jardin de Cels" dicto. *Tab.* 89.

ΝΑΡΘΗΞ. Internodium. 1. Ferula pl. (v. *Syst.*) 2. Internodium caulinum. N. B. Το κοιλόν ναρθηκος, vice phialæ apud antiquos in usu, ix. 16.

ΝΑΡΤΗ. Forsan præparatio diversa ναρδου, supr. separatim enumeratur in *Cat.* ix. 7.

ΝΕΑΩ. De actione novandi agros: "to fallow."

ΝΕΙΟΣ. } Novale. νειος εαρινος.

ΝΕΙΟΝ. } νειος χειμερινος, viii. 6.

ΝΕΜΟΜΕΝΟΣ. Excavatus: νεμομενα ἔλκη, ulcera profunda, inveterata, ix. 12.

ΝΕΟΔΕΡΟΣ. Recens excoriatus, ix. 15. met. de cortice in arboribus.

ΝΕΩΤΑ. Εἰς νεωτα, in annum proximum.

ΝΗΠΙΟΣ. *metaph.* de plantis junioribus, viii. 1.

ΝΗΣΟΙ πλοαδες. Fluitantes. Frequens mentio in lacubus et fluviis. L. Orchomeni, ix. 13.

ΝΙΤΡΟΝ. Sal nitrum: singularis usus ejus ad edulcorandos Raphanos. de C. Pl. iii.

ΝΟΣΤΙΜΟΣ. Gustu dulcis, a νοσος. *Phav.* σπερματα εὐχλοτερα, νοσιμότερα. de C. Pl. iv.

## Ξ.

**ΞΥΛΟΝ.** Pars solida trunci et ramorum, constans ex partibus quæ *ινες, φλεβες, σαρξ* vocantur. (vid.) N.B. Ξύλα antiquitus in *δερμα και ψυχρα* dividebantur respectu usus in *πυρραις*. Ξύλα *δερμα* frictione, calida evadunt, et hebetant aciem telorum; hujus generis *Κιττος, Δαφνη, Συκαμινος*, v. 4.

**ΞΥΝΑΝΘΡΩΠΕΥΟΜΑΙ.** *Met.* Manufectus sum, de plantis cultura amelioratis. de C. Pl. i.

**ΞΥΝΕΙΣΤΗΚΩΣ.** Compressus, vi. 2.

**ΞΥΡΟΣ?** An error pro *ξηρος*? *ξηρος και ξυλωδης*.

**ΞΥΩ.** Rado: *ξυειν εν οινω*, "scraping a root into wine," ix. 12.

## Ο.

**ΟΓΚΟΣ.** 1. Tumor. 2. Pericarpium globosum rosæ, i. 22.

**ΟΖΟΣ.** Nodus in arbore, ubi ramus oritur. N.B. Fibræ (*ινες*) ibi deflectuntur, et in orbem circumferuntur: (vid. *κτηδων, μονοξοος*.) *εστι γαρ οζος αρχη τις του κλαδου*. Hinc *τριοζα δενδρα, τετροζα, πενταοζα*, i. 13. N.B. Οζοι præcipue conspiciuntur in Pinu et Abiete L.

**ΟΙΚΕΙΟΣ.** Conveniens, moderatus, consentaneus.

**ΟΙΚΗΜΑ.** Receptaculum in Compositis. *Bot.* de C. Pl. iv.

**ΟΙΝΑΡΟΝ.** Vitis folium. de C. Pl. vi.

**ΟΙΝΟΣ.** Vinum: potestates variae in diversis vini generibus. *οινος αγονος*, (sterilitatem inducens,) ix. 12. *οινος υπνωτικός* *οινος εκστατικός*. N.B. Vini usus ad arcendos vermes ex feminibus. de C. Pl. iii.

**ΟΙΝΩΔΗΣ.** Purpureo-ruber respectu coloris; *υγρασια οινωδης τη οψει*, iii. 13.

**ΟΙΝΩΨ.** } Id. N.B. *Λιγα*  
**ΟΙΝΟΧΡΩΣ.** } *num Αριας λευκοτερον του Περιου, οινωποτερον της Δρυος*, "darker coloured," iii. 16. *υνα οινωχρωτες, και ερυθροι*, ix. 3.

**ΟΛΙΒΑΝΟΝ.** Fructus vel gummi *ολιβανου*. Vid. *Tab. Syst.* p. 28.

**ΟΛΙΓΟΧΟΟΣ.** Parcius fructum ferens: opp. *πολυχωρ*, viii. 4.

**ΟΛΚΗ.** Pondus: ab *ελκω*, (vergo,) ix. 17.

**ΟΛΚΟΝ το.** Vis attractiva, ab *ελκω*, (traho): *τουτο το ολκον της τροφης*. de C. Pl. iv.

**ΟΛΜΟΣ.** Mortarium: *κοπτοντες εν ολμω*, "pounding in a mortar," ix. 16.

**ΟΛΥΜΠΙΑΣ.** Ventus ex M. Olymbo, iv. 17. vid. *καυθμος*.



ΟΛΥΝΘΑΖΩ. Ab ολυνθος, caprifico. N. B. Caprificationis methodus et notitia sexûs plantarum Theophrasto cognitæ. Investigatione instituta de influentia aëris respectu fructificationis, de C. Pl. ii. ita pergit Auctor: και των τοιούτων εν τη προσαρτησει τε, και τοις ογκοις (in appendice florali et pericarpis) ή αιτια (causa vel modus impregnationis:) των δε Συκων και Φοινικων ουκ εν τουτοις εστι μονον, αλλα και εν τη διαστασει αυτων, (etiam quando arbores ipsæ situ separentur,) διο και εριναζουσι τας Συκας· τουτο δε ποιουσι ὅπως οἱ Ψηνες (Cynips Pfenes) οἱ εκ των Ερινων (vid.) επικρεμαννυμενων γινομενοι διοιγωσι τα επι της Συκης.

ΟΜΑΛΗΣ. Lævis, homogeneus; texturæ simplicis: opp. λεπυρωδει, tunicato, vii. 9.

ΟΜΟΙΟΜΕΡΗΣ. In partes similes divisibilis, ut aqua &c. N. B. Opp. ανομοιομερει, ut truncus arboris in corticem, lignum, fibras, succum, i. 2.

ΟΜΟΣΤΙΧΟΣ. Serie simplici: vid. διςιχος, &c. de C. Pl. vi.

ΟΜΦΑΚΩΔΗΣ. Color fature purpureus: hinc bacca Sambuci, nigri L. ita vocatur, iii. 12.

ΟΜΦΑΞ. Succus uvæ inspissatus.

ΟΜΩΝΥΜΙΑ. Synonymia.

ΟΜΩΝΥΜΟΣ. Synonymus, Bot. vii. 14. id.

ΟΞΥΒΑΦΟΝ. Acetabulum, menfura, ix. 12.

ΟΟΝ. } Fructus Sorbi, ii. 3.  
ΟΟΝ. }

ΟΠΟΒΑΛΣΑΜΟΝ. Gummi Amyridis, *Giliadensis* L. Vid. Tab. Syft.

ΟΠΙΣΜΟΣ. Collectio succi sponte fluentis: - opp. χυλισμω, succo expresso. vid.

ΟΠΟΚΙΝΝΑΜΩΜΟΝ. Oleum Cinnamomi, iv.

ΟΠΟΣ. Succus sponte fluens: opp. χυλω, succo expresso. N. B. Οπος coagulatus aliquando δακρυον vocatur, i. 3.

ΟΠΩΔΗΣ. Aqueus: opp. γαλακτωδει, πιπτωδει, i. 19.

ΟΡΓΑΩ. Intumesco: όταν οργάτα σπερματα, antequam germinent. de C. Pl. ii. γη ὀργωσα, ενιχυμος, ib. iii.

ΟΡΕΟΤΥΠΟΙ. Lignarii, ib. vi.

ΟΡΜΗ. Excitatio, tendentia: opp. τη φθορα respectu odorum. de C. Pl. vi.

ΟΡΝΙΘΕΣ. Ætate progrediente dissimiles sibi, plumarum colore mutato. de C. Pl. v.

ΟΡΟΣ. } 1. Serum lactis,  
ΟΡΡΟΣ. } "whey." 2. Serum sanguinis. 3. Succus tenuis ferofus, iii. 10. ix. 2.

ΟΡΡΩΔΗΣ. Serosus.

ΟΣΜΗ. Δηδησις του ξηρου δια τα υγρη, de C. Pl. vi. ubi sub-

tilis admodum Demetrii Philosophi occurrit disquisitio de differentiis odorum ex forma particularum.

ΟΣΤΑΥΤΞ. } 1. Tentaculum.  
ΟΣΤΑΙΓΞ. } Nat. Hist. 2. Cirrhus, *Bot.*

ΟΥΛΟΣ. 1. Crispus, cirrhatus; de coma capitis apud Afros. 2. Fibrarum distorsiones in ligno, (αἱ συσφαίτων ξύλων, v. 6.) 3. Curvitates ramorum, iii. 17. 4. De rugoso Brassicæ folio. (vid. ῥαφανός, *Tab. Syst.* p. 15.)

ΟΥΛΟΤΗΣ. *Id.*

ΟΥΡΟΝ. Ufus urinæ in edulcorandis amygdalis. de C. Pl. iii.

ΟΥΟΝ. *Vid.* Οον.

ΟΦΘΑΛΜΟΣ. Gemma. *Bot.* Hinc οφθαλμιζω, *Hort.* et εν-οφθαλμισμος. (vid.)

ΟΥΙΟΣ. ὕδατα οψία in calidis regionibus, "Tropical rains" dict.

## Π.

ΠΑΓΚΑΡΠΙΟΣ. Fructibus omnigenis farctus. παγκ. μελιτόντα. *vid.*

ΠΑΓΟΙ οἱ. Tempus glaciale, iv. 17.

ΠΑΘΗ τα. Proprietates, vires, respectu plantarum; sic apud Virg. "Scire potestates herbarum," i. 1.

ΠΑΙΔΕΙΑ φυτών. *Hort.* "the training of trees." de C. Pl. iii.

ΠΑΛΑΘΗ. Massa fructuum conditorum, præcipue Ficum; hoc modo facta; ξηραίνοντες τον καρπον, (της Κοκκυμηλίας) και τους πυρηνας εξαίρουντες κοππουσι, (tundunt) και ποιουσιν παλαδας. *Angl.* "Marmalade." iv. 9.

ΠΑΛΙΒΛΑΣΤΟΣ. Iterum germinans: de germ. autumnali, "the autumn shoots," *hort.*

ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΣ. Reciprocus; sibi invicem succedens. de C. Pl. iii.

ΠΑΝΑΞ το. Succus inspissatus Πανακειας. *vid.*

ΠΑΠΠΟΣ. Lanugo; pappus, *Bot.*

ΠΑΠΠΩΔΗ σπερματα. Papposa; pappo coronata. *Bot.* vi. 4.

ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΑΝΩ. Germino ex radice: i. e. "by the side of the trunk."

ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΟΣ. *Ang.* "a sucker," i. 9.

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ. Apud Orientes. Septa spatiosa arboribus confita, feris omnigenis servandis. *vid.* Desc. v. 9. ix. 6.

ΠΑΡΑΚΑΘΙΗΜΙ. *vid.* παραβλασανω, viii. 2.

ΠΑΡΑΚΑΝΘΙΖΩ. Juxta folium spinosus sum? vel forf. spinulis, ex margine vel rachi folii, i. 17.

ΠΑΡΑΚΑΥΔΙΖΩ. De fruticibus  
ab imo caulescentibus : opp.

μονοκαυλιζω. *Bot.* vi. 2.

ΠΑΡΑΚΙΝΕΩ. Infanire facio,  
ix. 20.

ΠΑΡΑΛΙΘΑΖΩ. Lapidescō : de  
concretionē in fructu Pyri,  
iii. 10.

ΠΑΡΑΛΛΑΞ. Alternatim.

ΠΑΡΑΛΛΑΤΤΩΝ. Alternans.  
*Bot.*

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ. Oppositus. *Bot.*

ΠΑΡΑΠΛΗΓΩ. Distorqueo, v.  
3.

ΠΑΡΑΠΛΗΘΙΑ. Abundantia.  
de C. Pl. iii.

ΠΑΡΑΠΟΙΕΩ. Perperam facio.  
de C. Pl. iii.

ΠΑΡΑΣΠΑΔΕΣ. Rami avulsi ad  
propagandum : "sets." N.B.  
Rami abscissi apud nos voc.  
"cuttings," ii. 2.

ΠΑΡΑΤΕΜΝΩ. Intempestive  
cædo, vi. 3.

ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ. id. q. παρα-  
βλαστοι.

ΠΑΡΑΦΥΩ. Pullulo eodem tem-  
pore; vel act. emitto radices,  
furculos, &c. vii. 2.

ΠΑΡΙΗΜΙ. Debilitor. de C. Pl.  
iii.

ΠΑΡΙΣΤΗΜΙ. id. quod εξιστημι,  
de vino. de C. Pl. vi. "to  
turn four." Οἱ λεπτοὶ οἶνοι  
ευωδεῖς, καὶ θάπτον παρισταμ-  
μενοι. ib.

ΠΑΡΥΔΡΟΣ. Juxta aquas cres-  
cens : ευδρὸς; in aquis, iv.  
13.

ΠΑΡΩΡΟΣ. Intempestivus. de  
C. Pl. iii.

ΠΑΤΤΑΛΟΣ. Paxillum : "a  
peg." π. σιδηρος, ii. 3.

ΠΑΤΤΩ. Complano, premo.  
de C. Pl. vi. Calco pedibus.  
Hinc

ΠΑΤΟΣ. Via calcata : Angl.  
voce fere retenta, "a path,"  
vi. 6.

ΠΕΠΕΙΡΟΣ. fyn. πεπαινός, ma-  
turus. de C. Pl. iii.

ΠΕΡΙΑΔΕΙΦΩ. Circumluto, v.  
9.

ΠΕΡΙΑΛΛΟΚΑΥΛΟΣ. Caule  
scandente. *Bot.* viii. 8.

ΠΕΡΙΒΩΘΡΩΜΕΝΟΣ. *Hort.*  
"trenched round." de C.  
Pl. v.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ. Circumscindo;  
notas circum incido, ix. 9.

ΠΕΡΙΚΑΘΑΙΡΩ. *Hort.* vid. κα-  
θαίρω.

ΠΕΡΙΚΑΤΑΛΗΨΙΣ. Successio  
continuata florum vel fruc-  
tuum.

ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΟΣ. Ambitus  
capitis; mensura, iii. 13.

ΠΕΡΙΚΟΜΟΣ. Frondosus val-  
de, iii.

ΠΕΡΙΜΗΤΡΙΟΣ. De ligno. vid.  
μητρα, iii. 10.

ΠΕΡΙΟΧΗ. Tegmen; cuticula  
pericarpii. *Bot.* de C. Pl. i.

ΠΕΡΙΠΑΤΤΩ. vid. παττω, ii. 8.

ΠΕΡΙΠΠΩ. Undique decido;  
de cortice arbuti, i. 8.

ΠΕΡΙΠΝΟΥΣ. "An eddy of  
wind," v. 2.



ΠΕΡΙΣΑΤΤΩ. } Circumfuso.  
ΠΕΡΙΣΑΞΙΣ. } Vid. σαττω. de  
C. Pl. v.

ΠΕΡΙΣΚΕΛΗΣ, α σκελλω. Aridus, durus: de radice Hellebori: σκληρον και περισκελη, ix. 11. item de vento, Angl. "a dry parching wind." de C. Pl. ii.

ΠΕΡΙΤΤΟΣ. 1. Extraordinarius, excellens, ix. 7. 2. Superfluous, ἐξ ακρου περιττος, de folio pinnato, extremo impari. Bot. iii. 15.

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ. Superflua; excrementa: N.B. Animalia, τα περιττωματα, per alvum ejiciunt, non tamen plantæ, quæ idcirco απεριττωτοι, i. 4. de C. Pl. vi.

ΠΕΡΙΦΕΡΩ. Sustineo: de viribus stomachi ad digerendum, ix. 13.

ΠΕΡΝΙΞ. Pars fructifera Cacti, opuntia L. vi. 4.

ΠΕΡΥΣΙΝΟΣ. Prioris anni; de fructu. ὁ καρπος (Juniperi) διαμενει εις ενιαυτον· ειθ' ὅταν ὁ αλλος επιφυη, ὁ περυσινος αποπιπτει, iii. 12.

ΠΕΣΣΟΣ. Pharm. "a tent for a wound," ix. 22.

ΠΕΤΑΣΟΙ οἱ. Folia Ari, colocasia, ex similitudine.

ΠΗΓΝΥΩ. Planto manibus. Bot. vii. 1.

ΠΗΚΤΙΚΟΣ. Congelans.

ΠΗΞΙΣ. Concretio gummosa, ix. 1. αἱ Πηξεις de tempore

pruinoso.

ΠΗΝΙΟΝ. Fufus: "spindle." forf. ex voc. Græc. vii. 3.

ΠΗΡΩΣΙΣ. met. οφθαλμων, in arboribus, "a blight," iv. 16.

ΠΙΕΣΑΓΓΑΙ. } Anginæ pecto-  
ΠΙΕΣΑΓΧΑΙ. } ris. de C. Pl. iv.  
ΠΙΛΗΣΙΣ. Confipatio. de C. Pl. ii.

ΠΙΛΟΣ ἡ. Pars floccosa, iv. 10.

ΠΙΛΩΝ. Coarctio. ὁ χειμων πι-  
λοι και καρκινοι (vid.) τας ξι-  
ζας. de C. Pl. iii. 4.

ΠΙΤΤΟΚΑΥΤΕΩ. De actione ligna Abietina comburendi ad extrahendam picem. vid. Desc. ix. 2.

ΠΛΑΓΙΟΚΑΡΠΟΣ. Fructu laterali, vii. 3.

ΠΛΑΓΙΟΚΑΥΛΟΣ. Caule horizontali: opp. ορθοκαυλω, viii. 3.

ΠΛΑΚΟΥΝΤΩΔΗΣ. Placentaceus, iv.

ΠΛΑΚΩΔΗΣ. Schistofus. Geolog. γη υπαργιλος και πλακωδης, ix. 4.

ΠΛΑΣΙΣ. επει εις την πλασιν με-  
τεθεσαν, (quando cœperunt fistulas formare,) συν πλασ-  
ματι, iv. 12.

ΠΛΑΣΜΑ. "the mouth-piece of the fistula." οἱ μετα πλασματος αυλοντες: vid. etiam γλωττα, iv. 12.

ΠΛΕΚΤΑΝΑΙ. Tentacula: πολυποδος πλεκταναι, ix. 14.

ΠΛΙΝΤΡΙΣ. Latericius, figuli-

- nus. γη πλιντεις. de C. Pl. iii.
- ΠΛΟΑΔΕΣ. (νησοι) Infulæ fluitantes, iv. 11.
- ΠΛΟΚΑΜΟΣ. Textilis: Καλαμου fpec. iv. 11.
- ΠΝΕΥΜΑ το. Vapor, gas. εν οινω ζεοντι, ix. 18.
- ΠΝΙΓΗ τα. Calor æstivus, ix. 5.
- ΠΟΑ. 1. Pars herbacea plantæ, ix. 16. 2. Vires vel succi plantarum. τας φυλλωδεις δυναμεις ποας καλουσι, ix. 8.
- ΠΟΑΣΜΟΣ. Sarculatio; actus averruncandi: "weeding." de C. Pl. iii. vid. σκαλισις.
- ΠΟΔΙΑΙΟΣ. vid. ισοποδιαιος.
- ΠΟΛΛΟΥ δια, respectu loci, longo intervallo. de C. Pl. iii.
- ΠΟΛΥΛΔΟΠΟΣ. vid. λοπος, μοβολοπος.
- ΠΟΛΥΜΑΣΧΑΛΟΣ. vid. μασχαλη, iii. 17.
- ΠΟΛΥΝΟΣΤΟΣ. Fæcundus valde, viii. 8.
- ΠΟΛΥΧΟΟΣ. id. de C. Pl. ii.
- ΠΟΝΕΩ. Marcesco, debilis sum. de C. Pl. iii.
- ΠΟΩΔΗΣ. Herbaceus: divisio plantarum, viii. 1.
- ΠΡΑΝΗΣ. Supinus: inferior folii superficies: opp. τω υπτιω, i. 14, 16.
- ΠΡΕΜΝΟΝ. 1. Surculus major; stipes, ii. 1. 2. morbus, seu intumescencia in ramo, i. 13.
- ΠΡΙΟΝΩΔΗΣ. Serratus, Bot. iii. 14.
- ΠΡΙΣΙΣ. Actio ferræ, v. 6.
- ΠΡΙΣΜΑΤΑ τα. Particulæ lignæ ex ferratura: "sawdust," v. 8.
- ΠΡΟΑΠΤΩΤΟΣ. Immature decidens: ερινεα προαπτωτα, iii. 5.
- ΠΡΟΒΟΛΑΙ αι. Primæ germinationes. de C. Pl. v.
- ΠΡΟΔΡΟΜΑΙ αι. Fructus præcox Ficûs. de C. Pl. v.
- ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΙΣ. Præparatio arundinum ad fistulas faciendas.
- ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ. Prævenio; magico sensu. καταδεν και προλαμβανειν, vi. 2.
- ΠΡΟΣΑΓΩ. Applico remedium, ix. 13.
- ΠΡΟΣΑΦΕΥΕΩ. De præparatione ad coquendum: προσαφεψηθεντα εν οξει, (prius infusa et cocta in aceto,) vii. 11.
- ΠΡΟΣΔΕΝΔΡΟΝ. Parasita. Bot. de C. Pl. ii.
- ΠΡΟΣΘΕΤΑ τα. Menfes muliebres, ix. 10.
- ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ Recens: χλωρος και προσφατος. de C. Pl. vi.
- ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ κατα. De cibo idoneo ad fumendum. de C. Pl. vi.
- ΠΡΟΣΦΟΡΟΣ. Conveniens, viii. 6.
- ΠΡΟΣΦΥΣΙΣ. 1. Infertio, i. 18. adhæfio, viii. 2. 2. Receptaculum in Compositis, Bot. vii. 13.

ΠΡΟΤΕΡΕΩ. Præcedo: *πρωτε-  
ρειν διμνην*, de præcocitate  
florum in Ægypto, vi. 7.

ΠΡΟΤΡΙΤΑ. Adv. tertio. de C.  
Pl. iii.

ΠΡΟΩΘΕΟΜΑΙ. Sursum impel-  
lor, iii. 7.

ΠΡΩΡΟΣ. Præcox, vii. 12.

ΠΡΩΡΑ. Bot. Apex vel fasti-  
gium rami, &c. ii.

ΠΤΕΡΝΙΞ. Caulis Cacti, *opun-  
tie* L.

ΠΤΕΡΩΔΗΣ. Pinnatus. Bot. ii.

ΠΤΙΣΣΩ. Tundo, item decor-  
tico, ii. 5.

ΠΤΟΡΘΑΚΑΝΘΟΣ. Ramis spi-  
nosus, vi. 1.

ΠΥΓΩΝ. Cubitus; mensura, iv.  
6.

ΠΥΘΜΗΝ. Corona radice fusi-  
formis. Bot. iv. 12.

ΠΥΚΝΟΣ. De ligno; solidus,  
densus: opp. *μαν*. vid.

ΠΥΡΕΙΑ. } Instrumentum igni

ΠΥΡΕΙΟΝ. } accendendo vi fric-  
tionis: partes sunt, 1. *σχα-  
ρα*, (lignum planum foveâ in  
medio;) 2. *τρυπανον*, (tere-  
bra; pistillum obtusum ex  
ligno duro,) v. 10. N.B. Mos  
adhuc obtinet in India oc-  
cidentalī.

ΠΥΡΗΝ. 1. Bacca, vel drupa,  
Bot. 2. Nucleus in medio  
lapilli, vel calculi. 3. Granum  
in baccis. de C. Pl. ii.

ΠΥΡΩ. Torreo: igni coquo:  
de C. Pl. vi.

ΠΥΡΩΣΙΣ (a *Πυρος*). Panifici-

um. de C. Pl. iv.

ΠΩΡΟΟΜΑΙ. In tophum con-  
vertor: de cortice arboris,  
iv. 18.

## P.

ΠΑΒΔΟΙ οἱ. Venæ minerales,  
*ῥαβδοι μεταλλων*. de C. Pl. iv.

ΠΑΒΔΟΣ Φοινίκος. Spatha, Bot.  
ii. 8.

ΠΑΓΑΔΗΣ. } A *ῥαξ*, acinus:

ΠΑΓΩΔΗΣ. } de fructu Man-  
dragoræ acinis pleno, vi. 3.  
de p. Punicæ. de C. Pl. v.

ΡΑΧΙΣ. Rachis, Bot. nervus  
intermedius folii; pedunculi  
continuatio, iii. 8.

ΡΕΙΝ το. Morbus vitis, ex ni-  
mio succo. de C. Pl. v.

ΡΗΓΜΑΤΑ τα. Fracturæ. Med.  
vii. 11.

ΡΗΤΙΝΗ. } Propr. Terebinthi-

ΡΥΤΙΝΗ. } na fluido statu:  
hinc vox Angl. "resin," de  
concreto, iii. 15.

ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ. Resinosus, ut-  
pote lignum Abietinum.

ΡΙΖΟΤΟΜΙΑ. Anni tempus  
herborifando proprium, ix. 8.

ΡΙΖΟΤΟΜΟΣ. Herbarius, iv. 5.

ΡΙΖΟΦΥΛΛΟΣ. De plantis, fo-  
liis radicalibus. Bot. vii. 10.

ΡΟΑΔΕΣ αἱ. Grana vel semina  
Mali Punici, iv. 11.

ΡΟΑΣ. } Morbus vitis. Syn. *τῆ*

ΡΟΙΑΣ. } *ῥεῖν*. de C. Pl. v.

ΡΟΔΩΝΙΑ. 1. Rosa planta  
2. Rosetum.



ῬΟΠΗ. 1. Inclinator, propensio, iv. 4. 2. Vis infusa, de C. Pl. iv.

ῬΟΠΟΙ? An id. ῥοποι μασχαλίδος. a ῥέπω, iv.

ῬΟΥΣ Succus fruticis. (vid. *Tab. Syst.*) Ῥοός, inspissatus, iii. 18:

ῬΩΔΗΣ. Irriguus, γη ῥωδης. de C. Pl. iii.

ῬΥΠΤΙΚΟΣ. Abstergens; de C. Pl. v.

ῬΥΠΤΟΜΑΙ. Abstergor: τροχισκαί της τρυγος, (vid.) οἷς ῥυπτομεθα, (quorum usus in abstergendis fordibus, ut hodie saponis,) ix. 10.

ῬΥΤΟΝ ἕδωρ. Aqua rivularis: occurrunt etiam 2. ἕδ. ναματιαῖον, "spring-water," 3. ἕδ. ἐκ Διός, "rain-water," ii. 3.

## Σ.

ΣΑΚΚΙΖΟΜΕΝΟΣ. In sacco vel utri fervatus. οἶνος σακκιζόμενος. de C. Pl. vi. N. B. Ασκού mentio fit vinis fervandis apud Homerum, Il. iii. 247. item apud Herod. lib. ii. c. 121. sæpius apud LXX. in V. T. etiam in N. T. Matth. ix. 17. Luc. v. 37, 38.

ΣΑΡΙΣΣΑ. Hasta prælonga, Macedonica. N. B. Altitudo Corni, *fœminæ* L. comparatur ὑψεί της σαρισσης, unde quivis Κρανεῖαν θηλείαν statu natu-

rali investigans longitudinem celebris istius teli assequetur.

ΣΑΡΚΟΡΙΖΟΣ. Radice carnosâ; distinctio inter plantas, vii. 11.

ΣΑΡΚΟΦΥΛΛΟΣ. Crassifolius, *Bot.* "Plantes grasses," *Gall.*

ΣΑΡΞ. In plantis, pars intermedia inter νᾶς et φλέβας. (vid.) Constat laminulis flexilibus in cellulas orbiculares vel ovales dispositis, i. iv. Qui accuratorem hujus rei velit scientiam, consulat *Grewium*, *Malpighium*, *Duhamel*. N. B. Caro fructûs Citri Aurantii, monente illo, nudo oculo vascula exhibet, alibi ope Microscopii ægre conspicienda. L. c. 4. p. 24. Vid. etiam *Hillium* de structura ligni, l. ii. c. 4.

ΣΗΜΕΙΟΝ. Punctum. ἀφ' ἑνός σημείου οἱ μισχοί, iii. 18.

ΣΗΠΩ. In aqua macero, iv. 10.

ΣΗΤΑΝΕΙΟΣ. } Ex voce Dor.  
ΣΑΤΑΝΕΙΟΣ. } σατες, annuus, vii. 4. N. B. Apud Romanos vox fynon. hornus, ab hora.

ΣΙΔΙΟΝ. Fructus Punicæ, *Græc. nati*, L. etiam pl. aquaticæ *Nymphææ* affinis. de C. Pl. v.

ΣΙΝΔΩΝ. Vestis tenuis goffypina, "mullin," æque ac lintea. N. B. Vox ερίον apud *Theophr.* goffypium æque

ac lanam amplectitur. Εριον ἐξ οὐ σινδονες εὐτελείς, "coarse muflins," πολυτελείς, "fine muflins," (vid. Εραιοφορα *Tab. Syst.* p. 15.) iv. 9.

ΣΙΝΟΣ. Detrimentum, injuria. de C. Pl. ii.

ΣΚΑΛΙΑ. Pericarpium Caſti, *opuntiae* L. de C. Pl. v.

ΣΚΑΛΙΣΙΣ. } Sarculatio, "rak-  
ΣΚΑΛΣΙΣ. } ing," *bort.* σκαλι-  
σις καὶ παασμος. de C. Pl. iii.

ΣΚΑΝΔΙΚΩΔΗΣ. vid. Σκανδιξ, *Tab. Syst.* p. 9.

ΣΚΙΝΘΟΣ. Urinator, "a diver," iv. 6.

ΣΚΛΗΡΟΣ. 1. Rigidus; "stiff;" opp. ευκαμπτῶ: de ligno Arbuti, iii. 10. 2. De qualitate vini annosi. Angl. "dry." de C. Pl. vi.

ΣΚΛΙΟΟΜΑΙ. fyn. σκλημι, dureſco, i. ix.

ΣΚΟΛΟΠΩΔΗΣ. Cruciformis, *Bot.* a σκολοψ, i. 16.

ΣΚΥΤΑΛΙΟΝ. Scutica: "a thong whip," iv. 5.

ΣΠΑΘΗ. Palmes fructui inferviens; *Spatha*, *Bot.* ii. 8.

ΣΠΑΘΟΦΥΛΛΟΣ. Folio vaginato, *Bot.* i. 16.

ΣΠΑΡΤΟΣ. Satus, fativus, *Bot.* opp. αργίω, vi. 7.

ΣΠΕΙΡΑ. συστροφὴ τοῦ ξύλου: venæ in ligno in orbem circumactæ ad nodos. v. 3.

ΣΠΕΡΜΑ. Semen: ovo comparatur: ὡς ἔχον ἐν ἑαυτῷ το

ύγρον καὶ θερμον συμφυτον ὡς ἐκλιποντῶν ἀγονον γινεται, i. 18.

ΣΠΙΛΑΣ. adj. γη σπιλας, terra glareosa. de C. Pl. i.

ΣΠΙΝΘΕΡΙΖΩ. Scintillas interurendum emitto, iii. 10.

ΣΠΟΔΙΟΣ. Cinereus de colore. Κοκκυμηλια σποδια, iii. 7. Αμπελος σποδια.

ΣΠΟΡΗΤΟΙ οἱ. Sementes, vel tempora ferendi: Anglice, "feed-time," viii. 3.

ΣΠΟΡΟΙ οἱ. id.

ΣΤΑΘΕΥΩ. Lente coquo: hinc derivata forſan vox Angl. "to stew," vii. 12.

ΣΤΑΜΝΙΣΚΟΣ. Urceolus vinis fervandis: οἶνον ἐσταμνισμενον, ex verb. σταμνισκομαι. de C. Pl. ii.

ΣΤΑΣΙΜΟΝ το. Situs loci. de C. Pl. v.

ΣΤΕΓΝΟΣ. Astringens, densus. de C. Pl. vi.

ΣΤΕΓΩ. Sustineo; fixus sum; opp. τῷ συμμενειν, vi. 8.

ΣΤΕΛΕΦΟΣ? id. cum στελεχος, stipes.

ΣΤΕΛΕΦΟΥΡΟΣ. 1. Cylindrico-caudatus, ut Bos: opp. λοφουρῶ, cristæ-caudato, ut Equus. 2. De spica Phlei L. aliorumque, et Plantaginis, vii. 10.

ΣΤΕΡΕΟΣ. Firmus: dicitur de qualitate uvarum: Anglice, "firm, fleshy." de C. Pl. iii.

- ΣΤΕΡΕΩΜΑ.** Rostrum navis, cum ligneis firmamentis, ad impetum faciendum, vi. 8.
- ΣΤΕΦΑΝΩΜΑΤΙΚΟΣ.** } De  
**ΣΤΕΦΑΝΗΠΛΟΚΟΣ.** } plantis  
**ΣΤΕΦΑΝΩΤΙΚΟΣ.** } ad coronas usitatis; "garland flowers," vi. 7.
- ΣΤΙΑΒΗΔΩΝ.** Splendor; "a glossy polish," vi. 5.
- ΣΤΛΕΓΓΥΣ?** spec. Tritici, Catalogo Specierum inferenda *Tab. Syst.* p. 6. Vox Ægyptiaca? viii. 4.
- ΣΤΟΙΧΕΩ.** Ordinatum, vel in serie (στοιχῶ) dispono, iii. 16.
- ΣΤΡΑΒΗ.** Distortio: hinc ξυλον αστραβες, "frait-grained timber," vi. 2.
- ΣΤΡΑΓΞ.** Gutta: κατα στραγα, guttatim, ix. 19.
- ΣΤΡΕΦΕΙΝ** τα ὑπτια. De versura foliorum in quibusdam arboribus autumnī tempore, sæpius occurrit mentio apud Theophrastum: sic quoque M. T. Varro de Re Rustica, l. i. c. 46. "Admiranda discrimina sunt naturalia, quod ex quibusdam foliis propter eorum *versuram*, quod sit anni tempus, dici possit, ut Olea, et Populus alba, et Salix."
- ΣΤΡΙΦΝΟΣ.** Strigosus, macilentus; hinc *metaph.* de ligno dicitur ξυλον αστραβες, στριφνον, vi. 2.
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ.** Cylindricus, vi. 7.
- ΣΤΡΟΦΙΓΞ.** Cardo: antiquitus ex ligno duro, vi. 7.
- ΣΤΡΥΦΝΟΣ.** Austero-acerbus, astringens: uva πρῶτον ἰδατωδής, μετα ταυτα στρυφνος· εἰτ' ὀξύς· εἰτ' ἐσχατον γλυκύς. de C. Pl. vi.
- ΣΤΥΓΕΣ αἶ.** Venti gelidissimi ex antris montium: αἶς οὐκ ἐστὶ φυλαχασθαι, οὐδ' ἐν τοῖς σρωμασι κατακειμενον. de C. Pl. v.
- ΣΤΥΠΗΤΗΡΙΩΔΗΣ.** Astringens, stypticus. De aquis aluminosis. de C. Pl. ii.
- ΣΥΓΚΛΑΩ.** Confringo, iv. 8.
- ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ.** Judicium ex comparatione. iv. 14.
- ΣΥΖΥΓΙΑ.** Conjunctio: κατα συζυγίαν, de paribus lorum folii pinnati ex opposito, Bot. iii. 15.
- ΣΥΜΜΕΤΡΟΣ.** Sibi accommodatus, gratus.
- ΣΥΜΜΕΤΡΟΟΜΑΙ.** id. Hinc Ang. vox "fymmetry."
- ΣΥΜΠΑΤΕΩ.** Quando multitudo vel exercitus conculcat: opp. καταπατεῖν, viii. 7.
- ΣΥΜΠΕΠΤΩΚΟΣ.** Connivens, Bot. opp. ανεμγμενῶ. de C. Pl. i.
- ΣΥΜΠΙΛΕΟΜΑΙ.** Conspior: σφαιρίον φυλλικον συμπεπιλημενον. τη ῥαχει του φυλλου, iii. 8.



ΣΥΜΦΥΣΙΣ. Generatio novi ligni, ix. 1.

ΣΥΜΦΥΤΟΣ. 1. Innatus: το θερμον συμφυτον, i. 18. 2. Confectus, vulgaris. ἡ ἑλμις (tænia) συμφυτον ἐνίοις ἐδνεσι, ix. 22.

ΣΥΝΑΓΚΕΙΑ. Vallis continuata. de C. Pl. ii.

ΣΥΝΑΙΤΙΑ. Causa insuper. vid. αιτια, ix. 6.

ΣΥΝΑΠΤΩ εις το αυτο. Conglutino, ix. 19.

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΕΥΟΜΑΙ. vid. ξυνανθρωπευομαι.

ΣΥΝΕΚΡΑΙΝΩ. Sensim effluo, iii. 13.

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΣ. Compactus. de C. Pl. iv.

ΣΥΝΕΡΕΦΩ. Una tectum efficio: de tecto frondoso sylvæ, iii. 2.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Continuatio, continuata successio, vi. 7.

ΣΥΝΘΑΛΩ. Comprimendo unire: όταν συνθλωσιν ἑκατέρου κλαδους το ἡμισυ, de unione duorum furculorum post sectionem longitudinalem. de C. Pl.

ΣΥΝΘΕΣΙΣ. } Compositio me-  
ΣΥΝΤΙΘΗΜΙ. } dicamenti: "to make up a prescription," ix. 16.

ΣΥΝΤΑΡΡΟΣ. Ramis implicatis, corbis in modum, vid. ταρρός. de C. Pl. iii.

ΣΥΝΤΗΚΩ. Una marcesco, maceror. de C. Pl. vi.

ΣΥΡΜΑΤΙΤΙΣ. In acervum congestus, undique attractus,

a συρω. Κοπρος συρματιτις, Quisquilix, Scal. vii. 5.

ΣΥΡΡΟΗ δακρυωδης. Coagmentatio refinosa, iv. 6.

ΣΥΣΣΗΠΩ. Una marcesco. de C. Pl. iii.

ΣΥΣΤΑΣΙΣ. 1. Coagulatio: opp. διαλυσει. 2. ἡ πρωτη συστασις, embryo plantæ. de C. Pl. v.

ΣΥΣΤΡΟΦΑΙ αι. Circumvolutiones, v. 6. (vid. Σπειρα.)

ΣΦΑΚΕΛΗ. } Gangræna  
ΣΦΑΚΕΛΙΣΜΟΣ. } in arboribus, iv. 16.

ΣΦΗΚΙΟΝ. Favus Vesparum, iv. 10.

ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ. Cuneiformis. de C. Pl. i.

ΣΦΥΡΑ μεγαλη. "a large wooden mallet," v. 9.

ΣΦΥΡΙΞ. Pedunculus obtusus malleiformis? Bot. vii. 4.

ΣΦΥΡΙΟΝ. dim. Σφυρας. Σφυριον plerumque εκ Κοτινου: sc. ligno præduro, ib.

ΣΧΕΔΙΑ. Navis tumultuarie facta ex lignis vel trabibus, "a raft." Mentio fit σχεδιας ἡ ἐχρησαντο πεντηκοντα ισοις, vi. 9.

ΣΧΕΛΟΜΑ. Pars navis juxta rostrum: το σχελομα και τας επωτιδας, (vid.) v. 8.

ΣΧΗΜΑ. Habitus plantæ, vii. 6.

ΣΧΗΜΑΠΟΙΕΩ. Notas inuro, ix. 4.

ΣΧΙΖΑ ἡ. "A billet of wood,"

ix. 3.

ΣΧΙΣΜΑΤΑ φυλλων. Lobi. Bot.

iii. 11.

ΣΧΟΙΝΙΑ ἡ. Juncetum: "a bed of rushes," iv. 13.

ΣΩΜΑΤΩΣΙΣ. Induratio humidi: reductio in solidum. de C. Pl. vi.

## T.

ΤΑΛΑΡΟΣ. Calathus. N. B.

Antiqui femina Cucumeris, aliorumque id genus, εν ταλαροις (vasibus fictilibus, an corbibus?) durante hyeme, locis apricis, tectis, ferebant: "garden-pots?" de C. Pl. v.

ΤΑΝΕΙΑ. Antenna navis, a τεινω, "the yard of a ship on which the sails are spread," iv. 1. Differt a κεραια, sed quomodo? ambo simul occurrunt.

ΤΑΡΙΧΕΙΑ τα. Radiculæ vel fibrillæ caulinae, Hederæ propriæ: N. B. Succidia Gloss. vet. sed quære: an radices succedanæ? Mallem scribere duplici ε, utpote ex ταρῶν derivatum.

ΤΑΡΡΟΣ. 1. Crates ex ligno textili, unde συνταρῶς implicatus. N. B. Antiquitus ταρσος a τερσω, quia casei super illis impositi exsiccabantur.

2. Implicatio ramorum vel fibrarum radices, ουκ ἐνοχλεῖ τῷ ταρῶν δια την βραχυριζιαν. de C. Pl. iii.

ΤΑΡΡΩΔΗΣ. Implicatus. Ἐρπυλος και Σισυμβριον εχουσι ῥιζας πολλας και ταρῶνδεις, vi. 7.

ΤΕΛΟΣ. Perfectio; εν τελει γενεσθαι. de C. Pl. vi.

ΤΕΡΑΜΝΟΤΗΣ. Mollities.

ΤΕΡΑΜΝΩΝ. Tener; de qualitate Pisorum, &c. post cotionem; τεραμονες vel ατεραμονες, ("they boil hard or soft,") viii. 9.

ΤΕΡΕΤΡΙΩΝ. Pars πυρειας. (vid.) ex duro ligno, sc. Κοτινου, v. 8.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ τα περι τροπας. Dies antiquitus insignes, æque ac Halcyonii, etfi numero impares. de C. Pl. v.

ΤΕΤΑΝΟΕΙΔΗΣ. supr. iv. 7.

ΤΕΤΑΝΟΣ. Rigidus, tensus: de foliis, iii. 18.

ΤΕΤΡΑΞΟΟΣ. Vid. μονοξοος. N. B. Vox ξοος, a ξυω, rado. Εστι γαρ πολυλλοπος ἡ ἑλατη, διο και τας κωπας ξυοντες αφαιρειν πειρωνται καθ' ἑνα και ὁμαλως, ("they work with the grain of the wood,") v. 2.

ΤΕΤΡΙΧΩΜΕΝΟΣ πηλος. Lutum capillis mixtum ad opera cæmentitia, ut apud nos. de C. Pl. i.

ΤΙΘΑΣΙΑ. Manfuefactio, iii. 3.  
 ΤΜΗΤΙΚΟΣ. Acie acuta: dicitur de glacie: ἡ παχὺν τμητικώτερα τῆς χιονος. de C. Pl. v.

ΤΟΡΝΕΙΑ ἡ. Opus tornatile; "carved work, or turnery," v. 8.

ΤΡΑΓΑΩ. Luxurio, *met.* ex libidine hirci: hinc τραγᾶν dicitur de morbo vitis ex nimia luxurie; articulatio; Plin. xvii. 24. "a swelling of the joints." de C. Pl. v.

ΤΡΑΓΗΜΑ. Bellaria; "sweetmeats." N.B. Hinc vox Gallica "dragées."

ΤΡΙΓΜΟΣ. Stridor alarum infecti; "buzzing:" φθιγγονται οἷον τριγμον. de C. Pl. v.

ΤΡΙΓΟΝΕΩ. De triplici metamorphosi insectorum, τριγωνησαντες μεταβάλλουσι. vid. Καμπη.

ΤΡΙΜΜΑΤΑ τα. ῥιζων sc. *Pharm.* "powders of roots in medicine?" ix. 9. 12.

ΤΡΙΟΖΟΣ. Ramis terna ferie, iv. 5.

ΤΡΙΟΡΧΙΣ. Radicibus bulbofis ternis, ix. 9.

ΤΡΙΧΟΦΥΛΛΟΣ. Foliis tenuibus, linearibus, ut Pinûs, &c. iii. 10.

ΤΡΟΠΑΙ αἱ. Solstitia. τρ. εαριναι, τρ. χειμεριναι.

ΤΡΟΧΙΣΚΟΣ. Trochiscus. Ang. "lozenge:" antiquitus radicis medicinalis frustulum ita

appellabatur, ix. 9.

ΤΡΟΧΜΑΛΟΣ. 1. Acervus lapidum: 2. adj. lapideus, calculus plenus, γη τροχμαλος. de C. Pl. iii.

ΤΡΥΓΗ ἡ. Fæx vini, cujus usus vice saponis, ix. 10.

ΤΡΥΠΑΝΟΝ. id. q. Τερετριον. (vid.) v. 10.

ΤΡΩΞΑΝΑ τα, α τρωξ. Radices fibrosæ? furculi juniores semesi a vermibus? de C. Pl. iii.

ΤΥΠΩ εν. Quodammodo: εν τυπω λαβειν, *phras.* ut ita loquar.

ΤΥΦΛΟΣ οφθαλμος. De arbore læso; "blighted;" οφθαλμος enim gemma, i. 13.

ΤΥΧΩΝ. Ordinarius: γη τυχουσα, communis, viii. 7.

## Υ

ΥΓΡΑ ἡ. Tempus pluviale. de C. Pl. iv.

ΥΓΡΑΣΙΑ. Humiditas, succus, iii. 13.

ΥΔΑΡΗΣ. Aquosus: opp. πυκνω, in succis, ix. 1.

ΥΔΑΤΑ τα. Anni tempestas pluviosa in calidis regionibus, ix. Υδατα δερμα πηγνυσι θάτον, optime. de C. Pl. v.

ΥΔΡΕΠΕΠΗΣ? forf. υδρεπεψις. Succus aquosus. de C. Pl. vi.

ΥΛΗ. Materies primaria.

ΥΛΗΜΑ. Frutex, i. 9.



- ὙΔΙΚΟΙ. Foramina. Vasa fibrosa succum haurientia; "sap vessels." de C. Pl. vi.  
 ὙΔΙΣΜΟΣ. Percolatio. ib.  
 ὙΜΕΝΟΣΠΕΡΜΟΣ. Ab ὕμην; cujus semen capsula membranacea tectum. Hymenospermus. *Bot.*  
 ὙΜΕΝΩΔΗΣ. Membranaceus: N. B. Μητρα vasculosa Sambuci ita vocatur, sc. vasculis membranaceis, i. 3.  
 ὙΠΑΡΤΙΑΟΣ. Sub-argillaceus, de solo, ix. 3.  
 ὙΠΑΡΩ. Leviter aro, viii. 11.  
 ὙΠΕΡΠΥΡΟΣ. Calidus valde. de C. Pl. i.  
 ὙΠΕΡΡΙΖΩΝ. Valde radicans. de C. Pl. iii.  
 ὙΠΕΡΤΑΖΩ. } Leviter, et  
 ὙΠΕΡΤΑΖΟΜΑΙ. } superficiem  
 tenuis aro: εαν μὲν ὑπερτάζωνται καὶ κινήσωσι τὴν γῆν, iii. 2.  
 ὙΠΝΟΣ. *met.* Somnus plantarum; hinc dicuntur, καθυδεῖν νυκτός.  
 ὙΠΟΒΑΛΛΩ. Oblique planto: opp. ορθοβάλλειν, ii. 7.  
 ὙΠΟΖΥΓΙΑ. Ex usu antiquitus distinguebantur Boves aratorii a lactariis. Βοῦσι καὶ ἵπποις καὶ τοῖς Ὑποζυγίοις, ("cows, horses, and working cattle,") iv. 4.  
 ὙΠΟΚΑΤΩΡΥΧΙΑ. Sursum, deorsum fossio: "trenching ground." de C. Pl. v.  
 ὙΠΟΚΟΝΙΣΙΣ. Methodus maturandi uvas et cucumeres pulvere superinjecto, ii. 8. de C. Pl. iii.  
 ὙΠΟΚΟΝΙΩ. id. ii. 8.  
 ὙΠΟΛΗΨΙΣ ἢ. Fætura floris? "the setting of blossoms." de C. Pl. v.  
 ὙΠΟΝΕΑΩ. Vid. νεαώ, iii. 2.  
 ὙΠΟΠΤΕΡΟΣ. Volatilis; de odore. de C. Pl. vi.  
 ὙΠΟΠΤΙΣΣΩ. Vid. πτισσω, iv. 10.  
 ὙΠΟΡΕΙΑ. Pars subjacens monti, ix. 1.  
 ὙΠΟΦΕΡΩ. vid. Ὑποληψις.  
 ὙΠΟΦΕΥΓΩ. Devito, quasi ab horreo, ix. 15.  
 ὙΠΟΦΥΣΙΣ. Quod subtus crescit: distinguitur a προσφυσις φλοιου, vi. 3.  
 ὙΠΤΙΑ τα. Superior pars folii: opp. τῷ πρᾶναι, i. 16.  
 ὙΠΤΙΟΝ τεμνω. *Hort.* "to prune with the cut upwards." de C. Pl. v.  
 ὙΠΩΠΙΑ. Cavitates sub oculis: τα ὑπωπια, fugillationes, "a black eye," vulgo, ix. 22.  
 ὙΣΤΕΡΕΩ. De plantis Serotinis: opp. τῷ προτερεῖν, vi. 7.  
 ὙΣΤΑΙΓΞ. 1. Tentaculum in Molluscis. Linn. 2. Cirrus in arboribus, iii. 18.  
 ὙΦΙΣΤΗΜΙ. Subfido; de fluidis. de C. Pl. iv.  
 Φ.  
 ΦΑΙΟΣ. Color: εκ λευκου καὶ μελανος, "grey." de C. Pl. vi.

ΦΑΚΟΣ. Legumen φακου, viii.

5. Αν φακον?

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ. Medicinalis. de C. Pl. iii. Opp. φαρμακωδεις.

ΦΑΡΜΑΚΟΝ εναιμον. Medicamentum stypticum, iv. 8.

ΦΑΡΜΑΚΩΔΗΣ. Venenosus: φαρμακωδεις δυναμεις ασθενεσσειν τοις ειθισμενοις. Ita Poeta, "Effecit potō Mithridates sæpe Veneno, Toxica ne poterint sæva nocere sibi."

ΦΑΥΛΙΑ? τα. Olivæ minutæ inutiles, ii. 3.

ΦΙΑΗΔΕΩ. Sibi placeo: δια το φιληδειν, (voluptatis causa,) ix. 16.

ΦΙΑΟΖΩΟΣ. Vivax: φιλοζωα τα κεφαλορριζα, (quia hyemem durant,) vii. 12.

ΦΛΕΒΕΣ. Apud Theophrastum vasa spiralia. Vide Grewium, ii. c. 4. iii. 3. Hilium de structura ligni, ii. c. 2, 3. ubi multa de lactiferis, resiniferis, et gummosis enumerantur; etiam Malpighii Anat. t. 7. f. 30. Vid. etiam Ives, i. iv.

ΦΛΕΒΙΚΑ τα. Superficies papillosa cutis. de C. Pl. vi.

ΦΛΕΓΜΟΝΗ. Inflammatio: vid. εκπνευσεις φλεγμονων, ix. 10.

ΦΛΟΙΟΣ. Cortex plantæ. 1. φλ. κυριος. 2. φλ. επιπολης. quorum posterior sæpius, ut in Arbutō, et Platano, αυτοματως εκπιπτει. 3. φλ. adsciti-

tius, utpote Φελλος, iv. 18. p.

ΦΟΒΗ. Loculus, capsula minutata; Bot. viii. 3. hinc Angl. "a fob."

ΦΟΡΑ. Proventus, feges, iii. 14.

ΦΡΥΓΓΑΝΟΝ. Ξυλωδες, και μικροφυλλον, vi. 1. Divisio generalis, Δενδρων, Θαμνων, Φρυγανικων, Ποωδων, vi. 1. Φρυγαναι dividuntur in ακανθα (inermia, Bot.) και ακανθωδη, (spinosa:) posteriora etiam in ακανθωδη αφυλλα, φυλλακανθα, (foliis spinosis,) πλορδακανθα, (ramis spinosis,) ib.

ΦΥΛΛΟΝ. Indefinite pro folio et petalo, Bot. Lobi etiam in pinnatis φυλλα vocantur; sed semel observat το όλον, folii pennati, φυλλορριζειν, διοπερ αν τις ειποι το όλον φυλλον ειναι, iii. 12.

ΦΥΛΛΟΣΚΕΠΗΣ. De arbore valde frondosa, adeo ut folis radios arceat. de C. Pl. i.

ΦΥΜΑΤΑ. Tumores, pustulæ, ix. 12.

ΦΥΣΑΙ. id.? An inflatio totius corporis, in pecoribus, "being hōved," ix. 10.

ΦΥΣΙΜΟΣ. Generativus, generando aptus. de C. Pl. iv.

ΦΥΤΕΥΜΑΤΑ τα. Plantæ ex semine: opp. μοσχευμασι.

ΦΩΛΕΥΩΝ. Nidificans: τα φωλευοντα, aves in genere: sed rectius quando plumas exuunt, a φωλεω, quia tunc

temporis latebras quærunt :  
“moulting birds.”

## X.

**ΧΑΡΑΓΜΟΣ.** Serratura folii.

*Bot.* iii. 10.

**ΧΑΡΑΞ.** Sudes, vallum, ii. 1.  
de C. Pl. v.

**ΧΑΥΝΟΣ.** Laxus, porosus, iii. 6.

**ΧΕΙΜΩΣΠΟΡΕΩ.** Hyeme fero.  
de C. Pl. iv.

**ΧΕΛΥΣΜΑ.** Statumen navis gubernaculi ; roborandi gratia.  
*Poll.* v. 8.

**ΧΕΙΡΟΠΑΛΗΘΗΣ.** Manipulus, manipuli instar, ii. 7.

**ΧΛΟΕΡΟΣ.** } Luteo-viridis : fo-

**ΧΛΩΡΟΣ.** } lia Platani vocantur χλωρα, “pea-green.”  
Varietates alibi occurrunt ;  
e.g. 1. ποωδης, “grafs-green ;”  
2. πρασινος, “green as a leek ;” 3. δαφνωδης, “dark-green.”

**ΧΛΩΗ.** Vox generalis, pars herbacea : εκ του κατω κρομμυον εκ του ακρου χλων, vii. 4. viii. 2.

**ΧΝΟΥΣ.** } 1. Pollen. *Bot.* 2.

**ΧΟΥΣ.** } Villi in pericarpio  
Rofæ, vi. 6. 3. Staminum congeries in floribus.

**ΧΝΩΔΗΣ.** De floribus flamineis, apetalis, ut Vitis, Hederæ, &c. viii. 3.

**ΧΟΑ.** Mensura, viii. 3.

**ΧΟΥΧΗ.** Eadem ; ex Concha testacea. Duo cochlearia continet, ix. 6.

**ΧΟΝΔΡΟΣ.** Far, *Phav.* sed rectius Tritici vel Hordei cujusdam massa farinacea. de C. Pl. iv.

**ΧΥΛΕΥΩ.** Viridi herba pascō :  
“to foil cattle.” de C. Pl. ii.

**ΧΥΛΟΣ.** } Succus plantæ ex-  
**ΧΥΜΟΣ.** } pressus. vide οπος, succus sponte fluens, i. 3. sapor, i. 19.

**ΧΥΛΙΣΜΟΣ.** Succu expressio : differt ab οπισμος, ix. 8.

**ΧΥΛΩΩ.** Succo abundo.

**ΧΡΩΜΑΙ.** Coloror : ανδρος χρωμενον ανδικως : opp. ανδρεις λευκους, vii. 9.

## Υ.

**ΥΑΛΤΗΡΙΟΝ.** Instrumentum musicum lyræforme, cui ζυγον (pars curvata instar cornu) proprium, v. 8.

**ΨΕΚΑΔΕΣ αἶ.** Τίνα πλατεα αττα φερομενα μεν φανερα' αλλ' ου διαμενει. ψεκαδες και δροσοι. de C. Pl. iv. όταν ύπουσης ύγροτητος μετα τας ψεκαδας ύποκαυση ό ήλιος. de C. Pl. v. ου γινεται πληθος ύδατος, αλλ', ως επι το πολυ, ψεκας. Pruinæ particulæ glaciales hic per τίνα πλατεα αττα videntur describi, nisi textus sit corruptus.

**ΨΙΛΩΘΡΟΣ.** Calvities : radix Αμπελου αγριας εις ψιλωθρον, (vis depilatoria,) ix. 22.

**ΨΙΝΕΣΘΑΙ.** Αν ψηνεσθαι. Erodi



- vermibus ψηνες vocatis. vid.  
 Tab. Syst. p. 35. N. B. Το  
 ψινεσθαι, morbus Punicæ,  
*Granatæ*, L. iv. 16.
- ΨΥΧΗ. Theoph. Papilio. vid.  
 Metamorphoses Insectorum.  
*Tab. Syst.* p. 34.
- ΨΥΧΡΟΣ. Qualitas lignorum  
 quorundam: opp. θερμῶ. vid.  
 θερμός, Πυρεΐα, v. 4.
- ΨΩΡΑ. Morbus in truncis ar-  
 borum scabiei similis, præci-  
 pue in Ficubus, iv. 16.
- ΨΩΡΙΑΩ. id. de C. Pl. v.

## Ω.

- ΩΛΕΣΙΚΑΡΠΟΣ. Epithetum  
 Homeri Ἰτέα (Salici L.) pro-  
 prium, δια το ταχυ προκατα-  
 βαλλειν προ του τελειως ἀδρυναι,  
 και πεψαι τον καρπον, iii. 2.  
 N. B. Sensum Homeri haud

plane intellexisse videtur  
 Theophrastus, qui verbo hoc  
 immensam substantiæ pap-  
 posæ diffusionem solummodo  
 indicat. Botanicis satis no-  
 tum est flores masculos et  
 fœmineos in Salicibus calyce  
 papposo instructos esse. Na-  
 turæ saltem incongruum est  
*immatura* femina spargere,  
 nisi morbo, vel aëris vitio.  
 Cuivis autem, μετ' απανθησιν  
 Ἰτεας, videre licet aërem to-  
 tum materie papposa reple-  
 tum; amentis sc. utriusque  
 sexûs dilabentibus, et unde-  
 quaque circumfusus.

- ὨΡΑ. Tempus anni; "the  
 season of the year:" ὦρα δια-  
 γελωσα, "the smiling spring."  
 de C. Pl. i.
- ὨΡΑΙΟΣ. Tempestivus: καρποι  
 ὠραιοι, iv. 5.



# CATALOGUS ALPHABETICUS

## PLANTARUM LINNEI

QUÆ APUD THEOPHRASTUM OCCURRUNT.

A.	Tab. Syst. Pag.		
		ALOPECURUS	4.
		Althæa, <i>officinalis</i>	15.
Abies, <i>marina</i>	23.	Amaranthus, <i>Blitum</i>	19.
Acer, <i>campestre</i>	22.	AMOMUM	3.
Aconitum, <i>Lycoctonum</i>	13.	Amomum, <i>Cardamomum</i>	ib.
Acorus, <i>calamus</i>	10.	Amygdalus, <i>communis</i>	12.
Acrosticum, <i>Thelypteris</i>	22.	Amygdalus, <i>Persica</i>	28.
ADIANTUM	ib.	Amyris, <i>Gileadensis</i>	25.
Adiant. <i>Trichomanes</i> .	23.	Anchusa, <i>tinctoria</i>	7.
Ægilops, <i>ovata</i>	21.	Andropogon, <i>Ischæmum</i>	21.
AGARICUS	23.	Andropogon, <i>Nardus</i>	22.
Agrostemma, <i>Flos Jovis</i> <sup>a</sup>	11.	Andryala, <i>integrifolia</i>	17.
AGROSTIS	4.	ANEMONE	13.
Ajuga, <i>Chamæpitys</i>	29.	Anethum, <i>bortense</i> ,	7.
Alchemilla, <i>arvensis</i> <sup>b</sup>	26.	Anethum, <i>fœniculum</i>	8.
ALLIUM: <i>spec. sex</i>	10.	ANTHEMIS	17.
Allium, <i>Cepa</i>	ib.	ANTIRRHINUM	27.
Allium, <i>Moly</i>	ib.	Apium, <i>graveolens</i>	7.
Allium, <i>Porrum</i>	11.	Aquilegia, <i>vulgaris</i> <sup>c</sup>	8.
Allium, <i>Scorodoprasum</i>	ib.	Arbutus, <i>Andrachne</i>	11.

<sup>a</sup> Vid. not. p. 11.

<sup>b</sup> Vid. not. p. 26.

<sup>c</sup> Vid. not. p. 8.



Arbutus, <i>Unedo</i>	12.	Buxus, <i>sempervirens</i>	20.
ARISTOLOCHIA	18.		
Arum, <i>Dracunculus</i>	ib.	C.	
Arum, <i>Colocasia</i>	ib.	Cactus, <i>Opuntia</i>	12.
Arum, <i>maculatum</i>	ib.	Caltha, <i>palustris</i>	17.
Arundo <i>Donax</i> ,	4.	Capparis, <i>spinosa</i>	13.
ARUNDO : <i>spec. septem</i>	ib.	Capficum, <i>frutescens</i>	27.
Artemisia, <i>Abfynthium</i>	17.	Carduus, <i>Acarua</i>	17.
Afclepias, <i>vincetoxicum</i> <sup>a</sup>	7.	CARDUUS : <i>spec. sex</i>	17.
Asparagus, <i>aphyllus</i>	10.	Carduus, <i>Eriophorus</i>	29.
ASPHODELUS	ib.	Carlina, <i>acaulis</i>	18.
Asphodelus, <i>ramofus</i>	ib.	Carpinus, <i>Betulus</i>	19.
Asphodelus, <i>luteus</i>	ib.	Carpinus, <i>Ostrya</i> <sup>e</sup>	20.
Asplenium, <i>Hemionitis</i>	22.	Carthamus, <i>corymbofus</i>	18.
After, <i>Tripolium</i> ?	29.	CAUCALIS	8.
Aftragalus, <i>Tragacantha</i>	16.	CELASTRUS	ib.
ATHAMANTA : <i>spec. duæ</i>	8.	Celtis, <i>Auftralis</i>	22.
Athamanta, <i>Oreofelinum</i>	8.	CENCHRUS	24.
Atractylis, <i>gummifera</i>	16.	Centaurea, <i>Centaurium</i>	17.
ATRIPLEX <sup>b</sup>	21.	Centaurea, <i>Stœbe</i>	18.
Atropa, <i>Mandragoras</i>	8.	Ceratonia, <i>filiqua</i>	21.
Atropa, <i>Belladonna</i> <sup>c</sup>	9.	Cercis, <i>filiquaftum</i>	12.
Avena, <i>fatua</i>	4.	Cerintbe, <i>afpera</i>	8.
		CHAMÆROPS	22.
B.		Chelidonium, <i>majus</i>	14.
Bambufâ, <i>arundinacea</i> <sup>d</sup>	4.	Chenopodium <i>Bon. Henricus</i>	7.
Beta, <i>vulgaris</i>	10.	Chrondrilla, <i>juncea</i>	18.
Betula, <i>alba</i>	20.	Cicer, <i>Arietinum</i>	16.
Betula, <i>Alnus</i>	19.	Cichorium, <i>Intybus</i>	17.
Braffica, <i>oleracea</i>	15.	CISTUS	14.
Braffica, <i>Rapa</i>	ib.	Citrus, <i>Medica</i>	16.
Bubon, <i>Galbanum</i>	10.	Citrus, <i>Aurantium</i>	ib.
Bulbocodium, <i>vernum</i>	ib.	Clematis, <i>Orientalis</i>	13.
Bupleurum, <i>rigidum</i>	26.	Clematis, <i>Vitalba</i> <sup>f</sup>	

<sup>a</sup> Vid. not. p. 7.<sup>b</sup> Vid. omiffa ad finem.<sup>c</sup> Vid. not. p. 9.<sup>d</sup> Vid. not. p. 4.<sup>e</sup> Vid. omiffa ad finem.<sup>f</sup> Vid. not. p. 13.

CNEORUM	5.	D.	
CNICUS	18.	Daphne, <i>Cneorum</i>	11.
Cocos, <i>nucifera</i> ?	22.	Dianthus, <i>Caryophyllus</i>	ib.
Coix, <i>Lacbryma Jobi</i>	19.	Dipsacus, <i>Fullonum</i>	6.
COLUTEA : <i>tres species</i>	16.		
Conium, <i>maculatum</i>	8.	E.	
CONVALLARIA	10.		
Convolvulus, <i>Scammonia</i>	9.	Ebenus, <i>Cretica</i>	15.
Convolvulus, <i>sepium</i>	8.	Echinops, <i>Ritro</i> ?	29.
CONYZA	18.	EQUISETUM	26.
Coriandrum, <i>fativum</i>	8.	ERICA	11.
Cornus, <i>mas</i>	6.	Erigeron, <i>graveolens</i>	17.
Cornus, <i>sanguinea</i>	ib.	Erythronium, <i>Dens Canis</i>	30.
Coronilla, <i>securidaca</i>	16.	ERVUM	16.
Corylus, <i>Avellana</i>	19.	Ervum, <i>Lens</i>	15.
Corylus, <i>Colurna</i>	ib.	Erysimum, <i>officinale</i>	15.
Costus, <i>Arabicus</i>	3.	Euonymus, <i>Europæus</i>	10.
COTULA <sup>a</sup>	17.	EUPHORBIA : <i>spec. tres.</i>	12.
Cratægus, <i>Aria</i>	12.	Euphrasia, <i>odontitis</i>	14.
Cratægus, <i>torminalis</i>	ib.		
Cratægus, <i>Azarola</i>	13.	F.	
Cratægus, <i>Oxyacantha</i>	ib.		
Cratægus, <i>Pyracantha</i>	13.	Fagus, <i>Castanea</i>	19.
Cressa, <i>erratica</i>	9.	Fagus, <i>Sylvatica</i>	20.
CROCUS : <i>spec. duæ</i>	5.	Ferula, <i>communis</i>	8.
Cucumis, <i>Colocynthis</i>	19.	Ferula, <i>Ferulago</i>	ib.
Cucumis, <i>fativus</i>	20.	Ferula, <i>Affafætida</i> <sup>b</sup>	9.
CUCURBITA	ib.	Ficus, <i>Caprificus</i>	21.
Cuminum, <i>cuminum</i>	8.	Ficus, <i>Carica</i>	22.
Cupressus, <i>sempervirens</i>	19.	Ficus, <i>Religiosa</i>	ib.
Cycas, <i>revoluta</i>	22.	Fraxinus, <i>excelsior</i>	3.
Cyclamen, <i>Europæum</i>	8.	Fraxinus, <i>Ornus</i>	ib.
Cyperus, <i>longus</i>	5.	FUCUS : <i>spec. octo</i>	23.
Cyperus, <i>esculentus</i>	ib.	Fumaria, <i>capreolata</i> ?	26.
Cyperus, <i>Papyrus</i>	ib.		
Cytifus, <i>Laburnum</i>	16.		

<sup>a</sup> Vid. not. p. 17.<sup>b</sup> Vid. not. p. 9.

G.		Juniperus, <i>Lycia</i>	21.
Galium, <i>verrucosum</i>	6.	Juniperus, <i>Sabina</i>	ib.
Geropogon, <i>glaber</i> <sup>a</sup> ?	18.	Ixia, <i>bulbocodium</i> ? <sup>d</sup>	10.
GLADIOLUS	5.		
GLYCYRRHIZA	29.		
Gossypium, <i>arborescens</i>	15.	L.	
Guilandina, <i>Bonduc</i>	11.	Lactuca, <i>sativa</i>	17.
Gypsophila, <i>Struthium</i>	12.	Lactuca, <i>sylvestris</i>	ib.
		Laferpitium, <i>latifolium</i>	9.
H.		Laferpitii <i>var. tres</i>	ib.
HEDERA: <i>spec. quatuor</i>	8.	Lathyrus, <i>amphicarpus</i>	15.
Hedera, <i>Helix: spec. tres</i>	7.	Lathyrus, <i>Aphaca</i>	ib.
Heliotropium, <i>Europæum</i>	ib.	Lathyrus, <i>Clymenum</i>	16.
HELLEBORUS: <i>spec. duæ</i>	13.	Lathyrus, <i>sativus</i>	ib.
Heracleum, <i>Panaces</i> <sup>b</sup> ?	9.	Laurus, <i>nobilis</i>	11.
Hesperis, <i>matronalis</i>	15.	Laurus, <i>gracilis</i>	ib.
Hieracium, <i>murorum</i>	18.	Laurus, <i>Cassia</i>	ib.
HIPPURIS ?	27.	Lavandula, <i>spica</i>	14.
Hordeum, <i>vulgare: var. sep-</i>		Lavatera, <i>arborescens</i>	15.
<i>tem</i>	5.	Lemna, <i>trifolca</i>	19.
Hordeum, <i>Zeocriton</i>	ib.	Leontodon, <i>Taraxicum</i>	17.
Hottonia, <i>palustris</i> ? <sup>c</sup>	27.	Leucoium, <i>vernum</i>	10.
Hyacinthus, <i>comosus</i>	11.	Lichen, <i>pulmonarius</i>	23.
HYDNUM	23.	Lilium, <i>album</i>	10.
HYPOCHÆRIS	18.	Linum, <i>usitatissimum</i> ,	8.
		Liquidambar, <i>styraciflua</i>	20.
I.		Lolium <i>temulentum</i>	4.
Iris, <i>Florientina</i>	4.	Lotus, <i>Melilotus</i>	16.
Iris, <i>Sisyrinchium</i>	6.	LUPINUS	15.
Iris, <i>Xiphium</i>	ib.	LYCHNIS	12.
Juglans, <i>Regia</i>	19.	Lycium, <i>Europæum</i> <sup>e</sup>	9.
Juniperus, <i>communis</i>	20.	Lycoperdon, <i>Bovista</i>	23.
Juniperus, <i>Oxycedrus</i>	21.	Lygeum, <i>spartum</i>	5.

<sup>a</sup> Vid. not. p. 18.<sup>b</sup> Vid. not. p. 9.<sup>c</sup> Vid. not. p. 27.<sup>d</sup> Vid. not. p. 10.<sup>e</sup> Vid. not. p. 9.



M.		Nymphæa, <i>Lotus</i>	14.
		Nymphæa, <i>Nelumbo</i>	ib.
Mangifera, <i>Indica</i> <sup>a</sup>	27.	O.	
Marrubium, <i>album</i>	15.	Ocymum, <i>Basilicum</i>	14.
Marrubium, <i>Pseudo-dictamnus</i> <sup>a</sup>	ib.	Olea, <i>Europæa</i>	3.
MATRICARIA <sup>b</sup>	17.	Olea, <i>sylvestris</i>	ib.
Medica, <i>sativa</i>	16.	Ononis, <i>Antiquorum</i>	16.
Medicago, <i>arborea</i>	16.	Onopordum, <i>Acanthium</i>	18.
Melampyrum, <i>arvense</i>	14.	Ophrys, <i>nidus avis</i>	ib.
Melissa, <i>officinalis</i> <sup>c</sup>	14.	ORCHIS	ib.
Melittis, <i>Melissophyllum</i>	14.	Origanum, <i>Ægyptiacum</i>	15.
MENTHA	ib.	Origanum, <i>Dictamnus</i>	14.
Mentha, <i>Pulegium</i>	ib.	Origanum, <i>Majorana</i> : var.	
Menyanthes, <i>trifoliata</i>	8.	<i>duæ</i>	ib.
Menyanthes, <i>Nymphæoides</i> <sup>d</sup> ?	ib.	OROBANCHE	ib.
Mercurialis, <i>perennis</i>	30.	OROBUS	16.
Mespilus, <i>Germanica</i>	13.	Oryza, <i>sativa</i>	10.
MILIUM <sup>e</sup> ?	5.	P.	
Mimosa, <i>Nilotica</i>	21.	Palma, <i>Thebaica</i>	22.
Mimosa, <i>sensitiva</i>	22.	PANICUM	4.
MOMORDICA	20. 27.	Panicum, <i>Italicum</i>	5.
Morus, <i>nigra</i>	ib.	Papaver, <i>Orientale</i>	14.
Myrica, <i>Gale</i>	21.	Parietaria, <i>officinalis</i>	22.
Myrica, <i>Cordifolia</i>	ib.	Peucedanum, <i>officinale</i>	9.
Myrtus, <i>communis</i>	13.	PEZIZA?	23.
N.		PHALLUS	ib.
NARCISSUS	10.	Phaseolus, <i>vulgaris</i>	15.
Narcissus, <i>Pseudo-Narcissus</i>	ib.	Phillyrea, <i>latifolia</i>	4.
Narcissus, <i>Poeticus</i>	ib.	PHLEUM? <sup>g</sup>	
Narcissus, <i>Bulbocodium</i> <sup>f</sup>	ib.		

<sup>a</sup> Vid. omiffa ad finem.<sup>b</sup> Vid. not. p. 17.<sup>c</sup> Vid. not. p. 14.<sup>d</sup> Vid. not. p. 8.<sup>e</sup> Vid. omiffa ad finem, et not. *Μελινος*, p. 5.<sup>f</sup> Vid. not. p. 10.<sup>g</sup> Vid. omiffa ad finem; etiam not. p. 4.

Phœnix, <i>Daëtylifera</i>	22.	Pyrus, <i>sylvestri statu</i>	24.
Phyllanthus, <i>Emblica</i> <sup>a</sup>	27.	Pyrus, <i>Cydonia</i>	13. 24.
Physalis, <i>somnifera</i> <sup>b</sup>	9.		
PICRIS	18.	Q.	
Pinus, <i>Abies</i>	19.	QUERCUS: <i>spec. octo</i>	19.
Pinus, <i>Cembra</i> <sup>c</sup>	20.	Quercus, <i>Prinus</i>	20.
Pinus, <i>Picea</i>	19.	Quercus, <i>Ægilops</i>	19.
Pinus, <i>Pinea</i>	20.		
Pinus, <i>Pinaster</i>	ib.	R.	
Pinus, <i>sylvestris</i>	ib.	Raphanus, <i>sativus: var.</i>	
Pinus, <i>Larix</i> <sup>d</sup>	ib.	<i>quatuor</i>	15.
Piper, <i>nigrum</i>	4.	RHAMMUS: <i>spec. duæ</i>	9.
Pistacia, <i>Terebinthus</i>	21.	Rhamnus, <i>Alaternus</i>	7. 30.
Pisum, <i>sativum</i>	16.	Rhamnus, <i>Paliurus</i> <sup>f</sup>	8.
Pisum, <i>Ocbrus</i>	ib.	Rhamnus, <i>Spina Christi</i>	8.
Plantago, <i>major</i>	6.	Rheum, <i>Rhaponticum</i>	11.
Plantago, <i>Coronopus</i>	ib.	RHIZOPHORA	12.
Plantago, <i>Cynops</i>	ib.	Rhus, <i>Coriaria: spec. duæ</i>	9.
Plantago, <i>Psyllium</i> <sup>e</sup>	ib.	Rhus, <i>Cotinus</i>	8.
Platanus, <i>Orientalis</i>	20.	Ribes, <i>Grossularia</i>	ib.
POA	5.	Ricinus, <i>Palma Christi</i>	19.
Polygonum, <i>Fagopyrum</i>	11. 28.	ROSÆ: <i>var. quatuor</i>	13.
POLYPODIUM	22.	RUBI <i>spec. tres</i>	12.
Populus, <i>nigra</i>	20.	Rubia, <i>tinctorum</i>	6.
Populus, <i>alba</i>	21.	Rubus, <i>Idæus</i>	12.
PRUNUS	13.	Rumex, <i>acetosa</i>	10.
Prunus, <i>Laurocerasus</i>	12.	Rufcus, <i>hypophyllum</i>	21.
Prunus, <i>Padus</i>	13.	Rufcus, <i>aculeatus</i>	ib.
Prunus, <i>Cerasus</i>	12.	Ruta, <i>graveolens</i>	12.
Prunus, <i>Mabaleb</i>	ib.		
PTERIS	22.	S.	
Punica, <i>granata</i>	13.	Saccharum, <i>Ravennæ</i> <sup>g</sup>	
Pyrus, <i>communis</i>	12.	Salicornia, <i>fruticosa</i>	3.
Pyrus, <i>sylvestri statu</i>	ib.		
Pyrus, <i>malus</i>	13.		

<sup>a</sup> Myrobalanus Bauh.<sup>b</sup> Vid. not. l. p. 9.<sup>c</sup> Vid. not. p. 20.<sup>d</sup> Vid. not. p. 20. item Cat. Alph. p. 59.<sup>e</sup> Vid. not. p. 6.<sup>f</sup> Vid. not. p. 8.<sup>g</sup> Vid. omiſſa ad finem.

SALIX : <i>spec. tres</i>	21.	T.	
Salix, <i>viminialis</i>	24.	Taxus, <i>baccata</i>	21.
Salvia, <i>horminum</i>	4.	Teucrium, <i>Chamædrys</i>	15.
Salvia, <i>bortenfis</i>	ib.	THAPSIA	7.
Salvia, <i>officinalis</i>	3.	Thapsia, <i>Asclepium</i>	ib.
Salvia, <i>Sclarea</i>	24.	THYMBRA	14.
Sambucus, <i>nigra</i>	7.	Thymus, <i>vulgaris</i>	ib.
Santolina, <i>Rosmarinifolia</i>	16.	Thymus, <i>serpyllum</i>	ib.
Satureia, <i>bortenfis</i>	14.	Thymus, <i>masticina</i> ?	26.
Satureia, <i>Thymbra</i> <sup>a</sup>	ib.	Thuja, <i>aphylla</i>	19.
SATYRIUM <sup>b</sup>	18.	Tilia, <i>Europæa</i>	14.
Scandix, <i>Pecten</i>	9.	Tordylium, <i>officinale</i>	9.
SCHCENUS : <i>spec. tres</i>	6.	TORMENTILLA	13.
Scilla, <i>unifolia</i>	10.	Tragopogon, <i>Orientale</i>	18.
SCILLA : <i>spec. duæ</i>	11.	Trapa, <i>natans</i>	7.
SCIRPUS	6.	Tribulus, <i>terrestris</i>	12.
Scolymus, <i>Hispanicus</i>	18.	Trifolium, <i>officinale</i>	16.
Secale, <i>Cereale</i>	4.	TRITICUM : <i>var. octo.</i>	6.
SELINUM	9.	Triticum, <i>monococcum</i>	4.
Selinum, <i>palustre</i> <sup>c</sup>	7.	Triticum, <i>Spelta</i>	6.
Sempervivum, <i>arboreum</i>	12.	TUBER	23.
Serapias, <i>Helleborine</i>	18.	Typha, <i>latifolia</i>	20.
Serratula, <i>arvensis</i>	17.		
Sesamum, <i>Orientale</i>	15.	U.	
Sinapi, <i>nigrum</i>	ib.	ULEX	29.
SISYMBRIUM	7.	Ulmus, <i>campestris</i>	9.
Sisymbrium, <i>Nasturtium</i>	15.	Ulmus, <i>montanus</i>	ib.
Smilax, <i>aspera</i>	21.	Ulva, <i>Lactuca</i>	23.
Smyrnum, <i>olusatrum</i>	8.		
SOLANUM : <i>spec. tres</i>	9.	V.	
Sonchus, <i>asper</i> <sup>d</sup>	17.	Vaccinium, <i>Vitis Idæa</i>	24.
Sonchus, <i>oleraceus</i>	18.	VERBASCUM	7.
Sorbus, <i>domestica</i>	13.	Veronica, <i>Chamædrys</i>	4.
SPARGANIUM	19.		

<sup>a</sup> Vid. not. p. 14.<sup>b</sup> Vid. not. p. 18.<sup>c</sup> Vid. not. p. 7.<sup>d</sup> Vid. not. p. 17.



Viburnum, <i>Opulus</i>	7.	Vitex, <i>agnus castus</i>	14.
Viburnum, <i>Lantana</i> <sup>a</sup>	11.	Vitis, <i>vinifera</i> : <i>var. sex</i>	7.
Vicia, <i>cracca</i>	15.		
Vicia, <i>Faba</i>	16.		
VIOLA : <i>var. duæ</i>	17.		Z.
Viscum, <i>album</i>	21.	Zostera, <i>marina</i>	23.

<sup>c</sup> Vid. not. Διαφνη αγγελια. p. 11.

## CORRIGENDA ET OMISSA.

## CATALOGUS ALPHABETICUS.

Αιγιρος. *Diæc.*

1. Αιγίλωψ. *Triandr.*

2. Αιγίλωψ. *gram. Polygamia.*

Ἄλιμον, το. *Polygamia, lege Monandr.*

Απατη. *Class. incert. lege Syngenes.*

Syn. Αφακης.

Βαλανος. *Class. incert. lege Decandr.*

Βλιτον. *Polygam. lege Monæc.*

Δενδρον τιγρινον. *Class. incert.*

Δρυς ποντια. *Crypt.*

Ελατηριον. *Class. incert.*

Ελειολειμωνια. *Class. incert.*

Ελειοχευρος. *Class. incert. lege Syngen.*

Ἐλξινη. *Class. incert.*

Ἐσπερις. *Tetradyn.*

Θησειον. *Class. incert. lege Enneandr.*

Ιξινη. *Class. incert. lege Syngenes.*

Ἴπποφειως. *Tetradyn.*

Κυδωνιος. *Icosandr.*

Λακαρα. *Icosandr.*

Λειμωδωρον. *Class. incert.*

Λιβανον. *Class. incert. lege Diæc.*

Λιμνωδες τι. *Class. incert.*

Μυα? an error textûs? id.

Μυδιον? id.

Ναρτη. vid. Ναρδος. *Polygam.*

Οινοθηρα. *Hexandr.*

Οινορανθης? de C. Pl. vi. *Class. incert.*

Οξυακαρπα. iii. 6. an pro Οξυακανθα?

Οσπρις. vid. Δρυς.

Παιωνια. *Polyandr. syn. Γλυκυσιδης.*

Πιλος. *Class. incert.*

1. Στρουθιος. *Icosandr.*

2. Στρουθιος. *Class. incert.*

## TAB. SYSTEMATICA.

Σαρι το. *Saccharum, Ravennæ, Fl.*

*Græc. Triandr. Vid. Cat. Alph. p. 65.*

Στελεφουρος. *Triandr. Gramen Phleum.*

*Sed textus corruptus. Vid. Cat.*

*Alph. p. 70.*

Ορτυξ *Tetrandr. syn. Αρνογλωσσου.*

Ευηπατον. *Pentandr. syn. Σπρυχνου.*

Ανδραφαξις. } *Inter Pentandr. et Poly-*

Ατραφαξις. } *gam. occurrit. Incertum*

*videtur an Chenopodium vel Atri-*

*plex.*

Σχοινος, Καλαμος. *Hexandr.*

Οχνη. *Icosandr.*

Ψευδο-Δικταμνος, lege *Marrubium*

*Pseudo-dictamnus*

Κεντηρια. *Syngenes. syn. Ατρακτυλιδος.*

Οσρυα. *Carpinus, Ostrya.*

Κεγχρος, *Cenchrus, Polygam. nisi for-*  
*san Milium vel Panicum.*

Πιλος inter *Fungos, ut affinis Σφαιρις.*

Δαφνη ποντια. *Tab. Syst. p. 37. infe-*  
*renda.*

Θυμον λιθοειδης. *Tab. Syst. p. 37. infe-*  
*rend.*

## ERRATA TYPOGRAPHICA.

### CATAL. ALPHABETICUS.

Pag.

14. l. 21. *lege* comparantur  
18. l. antepenult. *lege* πλατυφυλλος  
24. l. 2. *lege* κυκλῆδον  
32. l. 27. *lege* solstitio  
35. l. 13. *lege* fluviorum  
55. l. 9. *lege* Polygonum

### TAB. SYSTEMATICA ET LEX.

Pag.

11. not. b. *lege* frequentissimus  
19. col. 2. l. ult. *lege* trifulca  
43. col. 2. l. 8. *lege* Αντιδιηρημενος  
48. col. 1. l. 30. *lege* Gymnospermus  
50. col. 1. l. 11. *lege* Διευρυνω  
63. col. 2. l. 6. *lege* δικελλα

















